


ハイキュービア[®] 10%皮下注セット

5g/50mL・10g/100mL・20g/200mL

ハイキュービア 10%皮下注セットによる
治療を受けられる患者さんへ

20枚/冊




ハイキュービア® 10%皮下注セット による治療を受けられる患者さんへ

ハイキュービアは、免疫グロブリンを皮下へ投与するためのお薬であり、「ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え、以下HY)」と「人免疫グロブリンG(以下IG)」のセットになっています。HYは皮下組織の成分を一時的に分解する作用があるため、事前に投与することにより、一度にたくさんのIGを投与することができます。

このため、必ず先に①HYを投与し、約10分以内に同じ部位へ②IGの投与を開始してください。また、HYとIGを混合しないでください。

約10分以内に同じ部位へ


HYを投与 ⇒ IGを投与



注意が必要な副作用とその症状

国内外で行われた臨床試験や海外での製造販売後の調査では、注射部位からお薬が漏れたり、注射部位の痛みや赤い発疹など(注入部位反応)が報告されています。海外では、HYとIGの投与の順番や投与の方法の違い(例えばIGを先に投与してしまったり、HYとIGを混ぜて投与してしまった、等)が報告されており、これによる注入部位反応の可能性あります。


● 漏れ



● 痛み



● 紅斑(赤い発疹)



自宅などでご自身で投与するときは

「ハイキュービア® 投与マニュアル」を確認し、

適切な投与方法を遵守してください。投与中や投与後に皮膚やからだに異変を感じた場合、直ちに医師に連絡してください。



緊急連絡先(受診先の医療機関)

医療機関名：

電話番号：

主治医：



武田薬品工業株式会社

数量が少なくなりましたら
記載されている資材No.(1-5-6722)を
弊社MRにご連絡ください。



武田薬品工業株式会社