

シダキュアを飲む^の みなさんとおうちの方へ^{かた}

監修：日本医科大学大学院医学研究科 頭頸部・感覚器科学分野 教授 大久保 公裕 先生



もくじ

- はじめに 2
- シダキュアってななに 3
- シダキュアを飲む^の量^{りょう} 5
- シダキュアの飲み方^の^{かた} 7
- 飲む^のときに気^きをつけること 9
- 飲んだあと、特に、気^{とく}をつけてほしいこと 11
- 保護^ほ者^ごの方^{しゃ}へ^{かた} 13

はじめに

この冊子は、シダキュア スギ花粉舌下錠（以下、シダキュア）
を飲むみなさんとおうちの方に向けて、シダキュアを飲む
ときに知っていてほしいことを解説しております。

この冊子を読んで、シダキュアを飲むときに、守ること、
伝えることをよく理解しましょう。



まも

守ってね

.....

シダキュアを飲むときの
やくそく
約束ごと



つた

伝えてね

.....

おうちの人やお医者さんに
つた
伝えてほしいこと

シダキュアってなあに

 シダキュアは、^{からだ}体を^{かふん}スギ花粉に^{つよ}強くさせて、
^{かふん}スギ花粉症の^{しょうじょう}症状を出にくくする^{くすり}お薬だよ。

^{かふん}スギ花粉症の^{しょう}人^{ひと}



^{からだ}体に入ると^{はい}



シダキュアを^の飲むと



^{からだ}体を^{すこ}少しづつ
^{かふん}スギ花粉に
なると






シダキュアを毎日正しく飲むと、スギ花粉が
飛んでいる季節に効果が現れるよ。



くしゃみ、鼻水、
鼻づまりが
よくなる



涙目、
目のかゆみが
よくなる



鼻や目の症状がよくなることで

夜、ぐっすり
ねむれる



集中できる



外で楽しく遊べたり、
体育やスポーツができる

シダキュアを飲む量



1日1回、1個だよ。

さいしょの1週目は黄緑色のしるしがあるお薬、
2週目からは青色のしるしがあるお薬を飲んでね。

さいしょの1週目

シダキュア 2,000JAU錠



黄緑色のしるし

___ 月 ___ 日 ~ ___ 月 ___ 日 に飲む

2週目から

シダキュア 5,000JAU錠



青色のしるし

___ 月 ___ 日 から飲む




- おうちの人がいるところで飲^{ひと}んでください。

できれば、朝^{あさ}や昼間^{ひるま}に飲^のむようにしましょう。

まいにちの^の 毎日飲^{じかん}む時間・タイミング

ぼく・わたしは、_____の^のに飲^のみます




- 飲^のむ前^{まえ}と、飲^のんだ後^{あと}の2時間^{じかん}は、次^{つぎ}のこ^{まも}を守^{まも}ってください。

お風呂^{ふろ}に入^{はい}らない



はげ^{はげ}しい運動^{うんどう}(思^{おも}い切り走^きる、
た^{からだ}くさん体^{うご}を動か^{うご}かすなど)をしない



飲^のんだ後^{あと}、これら^{ちが}のこ^{おも}をするときに、いつもと違^{ちが}うなと思^{おも}ったら、
すぐにおうちの人^{ひと}に伝^{つた}えてください。

保護者の方へ

15～16ページの「シダキュアの服用方法」「服用について
医師に相談すべきとき」をご参照ください。

- お医^{いしや}者^{くすり}さんから「お薬^{だいじょうぶ}をやめても大丈夫^い」と言われるまで
毎日^{まいにち}飲^のみ続^{つづ}けましょう。

シダキュアの飲み方

1日1回1個




シダキュアは、舌の下に置くお薬

飲むまえ

① 切りはなす

メシン目で折る



切りはなす

② はがす

「はがす」のところから



④ 舌の下に置く

飲むとき



お薬がすぐに溶ける

そのまま待つ



1分間つばを飲まない

飲んだあと


⑤ 5分間は

うがいをしない




だよ。おうちの人^{ひと}がいるところで飲^のんでね。

③お薬^{くすり}を出^だす



した
下から押す

つめをたてずに
ゆび
指のはらをつかって




かわ
乾いた指^{ゆび}で取り出^としてください



つばを飲^のみ込^こむ




お薬^{くすり}が欠^かけたり、割^われたりした場合は、
それらも一緒^{いっしょ}に舌^{した}の下^{した}に置^おいてください



の
飲^のまない



た
食^たべない



の 飲むときに気をつけること



の かた ま ちが ひと つた
飲み方を間違えたら、おうちの人に伝えてね。




まちが おお
間違っ多
の 飲んでしまった




ぶん ま
1分待たずに、
の 飲み込んでしまった



の わす
飲み忘れてしまった



ほか ひと
他の人にあげては
いけません




にち
1日
かい
1回
こ
1個
1日1回1個を
の 飲みましょう



こんなときは、シダキュアを飲む前^のに
おうちの人^{ひと}やお医者さん^{いしゃ}に伝^{つた}えてね。

ゼーゼー、ヒューヒューいうとき※



ぜんそく ほっさ しょうじょう
※喘息の発作や症状があるとき

くち なか あか
口の中が赤くなっていたり、
きず
傷があるとき



か ぜ
風邪をひいているときや
たいちよう わる
体調が悪いとき



は ちりよう は
歯の治療をしたり、歯のことで、
き
気になることがあるとき



保護者の方へ 16ページの「服用について医師に相談すべきとき」をご参照ください。

の 飲んだあと、特に、気をつけてほしいこと



つた

伝えてね

シダキュアを飲んで、いつもと違うな、

シダキュアを飲んだあと、こんなことがおきるかもしれません。

くち なか
口の中



- くち なか
・口の中がはれる
- くち なか
・口の中がかゆくなる
- くち なか
・口の中がいつもと
ちが かん
違うと感じる

のど



- ・のどがかゆくなる
- ・のどがいつもと
ちが かん
違うと感じる

みみ
耳



- みみ
・耳がかゆくなる

こんなときは、特に気をつけてください。

- 飲んだあと30分間
- 飲み始めの頃
- スギ花粉が飛んでいる時期

おも ひと つた
と思ったら、おうちの人に伝えてね。

こんなときは、すぐにおうちの人や
お医者さんに伝えてください！

ひふ



- 顔や体がかゆい (かお からだ)
- 顔や体にポツポツができています (かお からだ)
- 顔や体が赤い (かお からだ あか)

のど
むね



- 声がよく出ない (こえ で)
- のどがかゆい
- くしゃみが出る (で)
- せきが出る (で)

おなか



- おなかが痛い (いた)
- 気持ちが悪い (き も わる)

そのほか



- まわりが、見えにくい (み)
- くらくらする
- ふらふらする

保護者の方へ

シダキュアの服用方法や注意点について、より詳しく紹介して治療を始める前には是非ご一読いただき、お子さんが毎日正しく

スギ花粉症とは

スギ花粉症は、鼻や目のアレルギー症状を引き起こすほか、そのつらい症状が日常生活にも影響を及ぼします。

スギ花粉症は、スギ花粉が原因となって、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどアレルギー症状をおこす病気で、日本人の約5分の2がスギ花粉症であるといわれています※。

また、スギ花粉症は一度発症すると自然に治ることが少なく、近年では発症年齢が低年齢化しているといわれています。

さらに、スギ花粉症のつらい症状は、日常生活のさまざまな場面で影響を及ぼし、QOL(生活の質)が低下することがわかっています※。

- ・外出への支障
- ・勉強への支障
- ・睡眠障害
- ・いろいろな感
- ・疲労
- ・思考力の低下

※ 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会 鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会編・鼻アレルギー診療ガイドライン2024年版(改訂第10版) 金原出版, 2024

シダキュアとは

シダキュアは、スギ花粉を原料とするエキスから作られたアレルギー免疫療法薬で、スギ花粉によるアレルギー症状を和らげます。

シダキュアは、スギ花粉症のアレルギー免疫療法のお薬で、スギ花粉を原料とするエキスから作られています。少量から服用することによって体を慣らし、スギ花粉によるアレルギー症状(スギ花粉症症状)を和らげます。

シダキュアは、1週目に服用する2,000JAU錠と2週目以降に服用する5,000JAU錠の2種類があります。

なお、シダキュアを初めて服用するときは、医療機関で服用します。2回目以降は毎日自宅で服用します。

います。
服用できるようお役立てください。

シダキュアなどのアレルゲン免疫療法は、症状を和らげるほか、根本的な体質改善が期待できます。

スギ花粉症の治療法には、主に薬物療法とアレルゲン免疫療法があります。薬物療法は、症状をおこす物質（ヒスタミンなど）の働きや鼻の中の炎症をおさえて自覚症状を和らげます。アレルゲン免疫療法は、体をアレルゲンに慣らし、根本的な体質改善が期待できます。

シダキュアでは次のような効果が期待できます。

- ・くしゃみ、鼻水、鼻づまりの改善
- ・涙目、目のかゆみの改善
- ・アレルギー治療薬の減量
- ・QOL（生活の質）の改善

治療はスギ花粉が飛んでいない時期に開始し、数年にわたり継続します。

シダキュアはスギ花粉が飛んでいる時期は、治療を新たに開始することはできません。

スギ花粉症の「アレルゲン」は「スギ花粉」であり、スギ花粉が飛んでいる時期はアレルゲンに対する体の反応性が過敏になっています。そのため、スギ花粉が飛んでいない時期に治療を開始します。治療開始時期については、医師と相談の上、決定します。

体を少しずつアレルゲン（スギ花粉）に慣らすことから、数年にわたり継続して服用します（3年以上推奨）。そのため、定期的な受診が重要です。

正しく服用を継続することで、初めてのスギ花粉飛散シーズンから効果が期待され、長期間継続することで最大の効果を発揮します。

正しくシダキュアによる治療が行われると、治療を開始後初めてのスギ花粉飛散シーズンから効果が期待されます。

また、年単位で正しく治療が継続されると、アレルギー症状を治したり、治療終了後も長年にわたり症状をおさえる等最大の効果が得られると考えられています。症状が完全におさえられない場合でも、症状を和らげ、アレルギー治療薬の使用量を減らすことが期待できます。

保護者の方へ

シダキュアの服用方法や注意点について、より詳しく紹介して治療を始める前には是非ご一読いただき、お子さんが毎日正しく

シダキュアの服用方法

1日1回1錠、舌の下にお薬を置き、1分間保持した後、飲み込みます。その後5分間はうがいや飲食はしないでください。

服用直前に乾いた指で、ブリスターシートから取り出してください。

すぐに舌の下にお薬を置き、1分間保持した後、飲み込んでください。

舌の下に置くとすぐに溶けてなくなりますが、唾液は1分間舌の下に保持してください。

飲み込んだ後5分間は、うがい・飲食をしないでください。

シダキュアは舌の下から体の中へ取り込まれます。効果が現れるためには、舌の下にお薬を置き、1分間保持した後飲み込むこと、その後5分間は、うがいや飲食はしないことが重要です。

なお、小さなお子さん等では、舌の下に1分間保持できているのかも確認してください。

シダキュア服用時に1分間で溶けない場合は、溶けるまで舌下に保持した後、飲み込んでください。錠剤のまま飲み込まないでください。

家族の居る場所や日中(朝や昼間)の服用が推奨されます。

アレルギーの原因となるアレルゲン(スギ花粉)を服用することから、シダキュア服用後にアレルギー反応がおこるおそれがあります。そのため、家族の居る場所や日中(朝や昼間)の服用が推奨されます。

特に小さなお子さんは、保護者等の管理下で服用することが推奨されます。

服用前※、及び服用後2時間は、激しい運動、入浴等を避けてください。また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナフィラキシー等の副作用の発現に注意してください。

血行が促され、シダキュアの体内への吸収が増すことなどにより、アナフィラキシー等の副作用が発現するおそれがあります。そのため、服用前、及び服用後2時間は、激しい運動、入浴等を避けるようにしてください。また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナフィラキシー等の副作用の発現に注意してください。

なお、成人の場合には、服用前、及び服用後2時間は、アルコール摂取も避け、服用後2時間以降にもアナフィラキシー等の副作用の発現に注意してください。

※服用前にこれらを行った場合には、十分に落ち着いてから服用してください。
(副作用については17～18ページ「副作用について」をご参照ください)

います。
服用できるようお役立てください。

シダキュアの保管

**室温で、お子さんの手の届かないところに保管してください。
また、他の人に使用させないでください。**

シートをはがさず、室温で、お子さんの手の届かないところに保管してください。
また、他の人に使用させないでください。

服用について医師に相談すべきとき

次のような症状があるときは、シダキュアを服用する前に医師に相談してください。

- ・喘息発作や症状が激しいとき
（喘息症状が悪化するおそれがあります）
- ・風邪をひいているときや体調が悪いとき
（副作用発現のおそれがあります）
- ・口の中に傷や炎症があるとき
- ・抜歯など口の中の手術や治療を行ったとき
（シダキュアの体内への吸収が増し、副作用が発現するおそれや、シダキュアが傷や炎症部位に刺激を与えるおそれがあります）

小さなお子さん等では、自分で症状や口の中の状態を判断できない場合があります。
その場合は、保護者等が確認した上で医師に相談してください。

**お子さんの成長や活動状況、治療の経過によって対応が異なる可能性があります。
以下の項目について、事前に医師に対応方法等を確認しておくとういでしょう。**

- ・予防接種を行うとき
- ・歯が生えかわるとき
- ・服用前、服用後2時間に体育の授業やスポーツ(部活)などがあるとき
- ・旅行等普段と異なる環境になるとき

なお、治療開始時に他に服用している薬があるときは、事前に医師にお伝えください。
他院で、新たな薬を処方される際には、シダキュアによる治療を行っていることを医師にお伝えください。

保護者の方へ

シダキュアの服用方法や注意点について、より詳しく紹介して治療を始める前には是非ご一読いただき、お子さんが毎日正しく

正しく服用できなかったときの対応

誤って多く服用してしまった場合、1分間保持せずに飲み込んでしまった場合、服用し忘れた場合は、次のように対応してください。

・誤って多く服用してしまったとき

直ちに吐き出し、うがいをしてください。

翌日、改めて前日の用量を服用してください。

・1分間保持せず、飲み込んでしまったとき

その日は再度服用しないでください。

翌日、改めて前日の用量を服用してください。

・服用し忘れたとき

その日のうちに気がついた場合、その日の用量を服用してください。

翌日に気がついた場合、前日の用量を服用してください。

服用したか不確かな場合は、その日は服用しないでください。

いずれの場合も決してその日の分より多くを服用しないでください。

異常が認められた場合、直ちに医療機関を受診してください。

副作用について

服用後少なくとも30分間、服用開始初期、スギ花粉が飛散している時期は特に副作用の発現に注意してください。

主な副作用は、投与部位である口の中の一般的なアレルギー反応に基づく腫れやかゆみなど局所の症状です。

国内の臨床試験で多くみられた副作用は以下の通りです。

- ・口の中の浮腫^{ふしゅう}、かゆみ、不快感
- ・喉^{のど}の刺激感、不快感
- ・耳のかゆみ など

います。
服用できるようお役にてください。

まれに重大な副作用として、全身性の強いアレルギー反応(ショック、アナフィラキシー等)が発現するおそれがあります。

アナフィラキシーで早期にみられる症状

皮膚の症状

蕁麻疹、そう痒感、紅斑・皮膚の発赤などの全身的な皮膚症状
(医薬品の投与数分から通常は30分以内に、初発症状のことが多い)

消化器の症状

胃痛、吐き気、嘔吐、下痢など

眼の症状

視覚異常、視野の狭窄など



呼吸器の症状

声がかれる、鼻がつまる、くしゃみ、喉のそう痒感、胸のしめつけ感、咳、呼吸困難、呼吸の音がゼーゼー・ヒューヒューする、チアノーゼなど

循環器の症状

頻脈、不整脈、血圧低下(ふらつきやめまい)など

神経の症状

不安、恐怖感、意識の混濁など



上記のような症状が現れた場合、直ちに医療機関を受診してください。

※小さなお子さん等、症状が判断できない場合は、保護者等が確認した上で、直ちに医療機関を受診してください。

特に緊急性が高い症状

循環器の症状

- ・ 頻脈
- ・ 不整脈
- ・ 血圧低下



神経の症状

- ・ 意識の混濁



呼吸器の症状

- ・ 声がかれる ・ 喉のそう痒感
- ・ 胸のしめつけ感 ・ 咳 ・ 呼吸困難
- ・ 呼吸の音がゼーゼー・ヒューヒューする ・ チアノーゼ

消化器の症状

- ・ 持続する胃痛
- ・ 持続する嘔吐



特に上記のような症状が1つでもあてはまる場合、救急車を要請するなど、迅速な対応が必要です。ご家族も注意してください。

スギ花粉飛散期の注意

服用後の体調の変化に注意し、スギ花粉症の症状がひどい場合の対応については、あらかじめ医師に確認しておいてください。

スギ花粉が飛散する時期は、シダキュア服用後に体調の変化がおこるおそれがありますので注意してください。

スギ花粉症の症状がひどい場合、医師の指示に従い、アレルギー治療薬などを使用してもかまいません。症状やお薬の使用状況を日誌などにまとめ、受診時に医師に確認してもらいましょう。

シダキュアによる治療中も、スギ花粉を回避する生活を心がけましょう。

このほかのシダキュアに関する不明点は、医師、薬剤師にご相談ください。
また、患者さん向け小冊子「シダキュアを服用される患者さんへ」もご覧ください。

医薬品リスク管理計画 (RMP)

本資料は医薬品リスク管理計画に
基づき作成された資料です

※ご不明な点があれば、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先（病医院・薬局名）



鳥居薬品株式会社
東京都中央区日本橋本町3-4-1

2024年9月作成
CDC TE003D