

**ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「ニプロ」
ウステキヌマブ BS 点滴静注 130mg「ニプロ」
に係る医薬品リスク管理計画書**

ニプロ株式会社

(別紙様式2)

ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「ニプロ」、
ウステキヌマブ BS 点滴静注 130mg「ニプロ」に係る
医薬品リスク管理計画書 (RMP) の概要

販売名	ウステキヌマブ BS 皮下注45mg シリンジ「ニプロ」 ウステキヌマブ BS 点滴静注130mg「ニプロ」	有効成分	ウステキヌマブ (遺伝子組換え) [ウステキヌマブ後続4]
製造販売業者	ニプロ株式会社	薬効分類	乾癬：873999 クローン病：87239
提出年月日		令和8年9月3日	

1.1. 安全性検討事項		
【重要な特定されたリスク】	【重要な潜在的リスク】	【重要な不足情報】
重篤な過敏反応	悪性腫瘍	なし
重篤な感染症	心血管系事象	
結核	膿疱性乾癬・乾癬性紅皮症の悪化及び新規発現	
間質性肺炎	免疫原性	
1.2. 有効性に関する検討事項		
なし		

↓上記に基づく安全性監視のための活動

2. 医薬品安全性監視計画の概要
通常の医薬品安全性監視活動
追加の医薬品安全性監視活動
なし
3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要
なし

↓上記に基づくリスク最小化のための活動

4. リスク最小化計画の概要
通常のリスク最小化活動
追加のリスク最小化活動
医療従事者向け資材の作成と提供 [適正使用ガイド (適応症：クローン病)]
患者向け資材の作成と提供 [ウステキヌマブ BS「ニプロ」による治療について (適応症：クローン病)]
適正使用に関する納入前の確実な情報提供 (クローン病)

各項目の内容は RMP の本文でご確認下さい。

(別紙様式 1)

医薬品リスク管理計画書

会社名：ニプロ株式会社

品目の概要											
承認年月日	①2025年12月22日 ②2026年9月2日	薬効分類	乾癬：873999 クローン病：87239								
再審査期間	なし	承認番号	①30700AMX00272000 ②30800AMX00321000								
国際誕生日	2024年4月11日										
販売名	①ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」 ②ウステキヌマブBS点滴静注130mg「ニプロ」										
有効成分	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）〔ウステキヌマブ後続4〕										
含量及び剤形	①1シリンジ0.5mL中ウステキヌマブ（遺伝子組換え）〔ウステキヌマブ後続4〕45mgを含有する注射剤（プレフィルドシリンジ） ②1バイアル26mL中ウステキヌマブ（遺伝子組換え）〔ウステキヌマブ後続4〕130mgを含有する注射剤										
用法及び用量	①ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」 〈尋常性乾癬、乾癬性関節炎〉 通常、成人にはウステキヌマブ（遺伝子組換え）〔ウステキヌマブ後続4〕として1回45mgを皮下投与する。初回投与及びその4週後に投与し、以降12週間隔で投与する。 ただし、効果不十分な場合には1回90mgを投与することができる。 〈クローン病〉 ウステキヌマブ（遺伝子組換え）の点滴静注製剤を投与8週後に、通常、成人にはウステキヌマブ（遺伝子組換え）〔ウステキヌマブ後続4〕として90mgを皮下投与し、以降は12週間隔で90mgを皮下投与する。なお、効果が減弱した場合には、投与間隔を8週間に短縮できる。 ②ウステキヌマブBS点滴静注130mg「ニプロ」 通常、成人にはウステキヌマブ（遺伝子組換え）〔ウステキヌマブ後続4〕として、導入療法の初回に、以下に示す用量を単回点滴静注する。 <table><tr><th>患者体重</th><th>投与量</th></tr><tr><td>55kg以下</td><td>260mg</td></tr><tr><td>55kgを超える85kg以下</td><td>390mg</td></tr><tr><td>85kgを超える</td><td>520mg</td></tr></table>			患者体重	投与量	55kg以下	260mg	55kgを超える85kg以下	390mg	85kgを超える	520mg
患者体重	投与量										
55kg以下	260mg										
55kgを超える85kg以下	390mg										
85kgを超える	520mg										

効能又は効果	①ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」 ○既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、乾癬性関節炎 ○中等症から重症の活動期クローン病の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ②ウステキヌマブBS点滴静注130mg「ニプロ」 ○中等症から重症の活動期クローン病の導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
承認条件	医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
備考	・販売開始日から4年を目途に、評価結果を踏まえてRMPの策定に係る承認条件解除の可否について機構に相談する。 ①ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」 ・2026年8月10日：「クローン病の維持療法」の効能・効果で承認事項一部変更承認を取得 ②ウステキヌマブBS点滴静注130mg「ニプロ」 ・2026年9月2日：「クローン病の導入療法」の効能・効果で製造販売承認を取得

変更の履歴
前回提出日 <u>2026年8月12日</u>
変更内容の概要： ・「品目の概要」の更新
変更理由： ・ウステキヌマブBS点滴静注130mg「ニプロ」の製造販売承認取得のため

1. 医薬品リスク管理計画の概要

1. 1 安全性検討事項

重要な特定されたリスク	
重篤な過敏反応	
	重要な特定されたリスクとした理由： 以下の理由により、先行バイオ医薬品（ステラール）の医薬品リスク管理計画書（RMP）で重要な特定されたリスクとして挙げられている。 - モノクローナル抗体治療により、治療薬に対する抗体が発現することがあり、抗体が発現した患者では、過敏反応が発現しやすくなる可能性がある。 - 先行バイオ医薬品において、乾癬性関節炎患者を対象とした主要な臨床試験においては重篤な過敏反応は認められなかったものの、尋常性乾癬患者を対象とした主要な臨床試験で発現が認められている。 - 先行バイオ医薬品のクローン病患者を対象とした臨床試験において、重篤な過敏反応の発現が認められている。 - 先行バイオ医薬品の国内製造販売後において、先行バイオ医薬品との因果関係が否定できない重篤な過敏反応が報告されている。 - 重篤な過敏反応の発現割合は低いが、先行バイオ医薬品の臨床試験において発現が認められており、先行バイオ医薬品との因果関係が否定できない事象が報告されている。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常、の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常、の医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 - 通常、のリスク最小化活動として、電子添文の「副作用」の項及び患者向医薬品ガイドにアナフィラキシーに関する注意事項を記載し、注意喚起する。 - 追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 - 医療従事者向け資材の作成と提供〔適正使用ガイド（適応症：クローン病）〕 - 患者向け資材の作成と提供〔ウステキヌマブBS「ニプロ」による治療について（適応症：クローン病）〕 - 適正使用に関する納入前の確実な情報提供（クローン病） 【選択理由】 医療関係者向け適正使用資材において、本剤を使用する医療関係者に確実に情報提供し、適正使用に関する理解を促す。また、患者向け適正使用資材においても、具体的な症状とともに過敏反応に関する情報を記載し、注意喚起を図り、副作用等の被害を最小限にする。

重篤な感染症	
	重要な特定されたリスクとした理由： 以下の理由により、先行バイオ医薬品（ステララー）の医薬品リスク管理計画書（RMP）で重要な特定されたリスクとして挙げられている。 - 先行バイオ医薬品の尋常性乾癬患者と乾癬性関節炎患者を対象とした主要な臨床試験において、重篤な感染症の発現が認められている。 - 先行バイオ医薬品のクローン病患者を対象とした臨床試験において、重篤な感染症の発現が認められている。 - 作用機序から先行バイオ医薬品が感染症を引き起こす可能性は否定できず、先行バイオ医薬品で、国内製造販売後において先行バイオ医薬品との因果関係が否定できない重篤な感染症が報告されている。 本剤はIL-12/23の作用を選択的に抑制する薬剤であり、免疫抑制作用により感染症発現のリスクがある。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常の医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 - 通常のリスク最小化活動として、電子添文の「警告」、「禁忌」、「重要な基本的注意」、「特定の背景を有する患者に関する注意」、「副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに感染症に関する注意事項を記載し、注意喚起する。 - 追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 - 医療従事者向け資材の作成と提供〔適正使用ガイド（適応症：クローン病）〕 - 患者向け資材の作成と提供〔ウステキヌマブBS「ニプロ」による治療について（適応症：クローン病）〕 - 適正使用に関する納入前の確実な情報提供（クローン病） 【選択理由】 医療関係者向け適正使用資材において、本剤を使用する医療関係者に確実に情報提供し、適正使用に関する理解を促す。また、患者向け適正使用資材においても、具体的な症状とともに感染症に関する情報を記載し、注意喚起を図り、副作用等の被害を最小限にする。

結核	
	重要な特定されたリスクとした理由： 本剤はIL-12/23の作用を選択的に抑制する薬剤であり、免疫抑制作用により結核の発現または再活性化が起こる可能性がある。 先行バイオ医薬品の乾癬、クローン病患者を対象とした臨床試験において、日本人集団で活動性結核は認められていないが、国内製造販売後において、先行バイオ医薬品との因果関係が否定できない活動性結核が報告されており、先行バイオ医薬品（ステララ）の医薬品リスク管理計画書（RMP）で重要な特定されたリスクとして挙げられている。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常の医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・ 通常のリスク最小化活動として、電子添文の「警告」、「禁忌」、「重要な基本的注意」、「特定の背景を有する患者に関する注意」及び「副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに結核に関する注意事項を記載し、注意喚起する。 ・ 追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 1. 医療従事者向け資材の作成と提供〔適正使用ガイド（適応症：クローン病）〕 2. 患者向け資材の作成と提供〔ウステキヌマブBS「ニプロ」による治療について（適応症：クローン病）〕 3. 適正使用に関する納入前の確実な情報提供（クローン病） 【選択理由】 医療関係者向け適正使用資材において、本剤を使用する医療関係者に確実に情報提供し、適正使用に関する理解を促す。また、患者向け適正使用資材においても、具体的な症状とともに結核に関する情報を記載し、注意喚起を図り、副作用等の被害を最小限にする。

間質性肺炎	
	重要な特定されたリスクとした理由： 先行バイオ医薬品の国内製造販売後において、因果関係の否定できない間質性肺炎が報告されていることから、先行バイオ医薬品（ステラーラ）の医薬品リスク管理計画（RMP）で重要な特定されたリスクとして挙げられている。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常 医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常 医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・ 通常 医薬品リスク最小化活動として、電子添文の「副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに記載し、注意喚起する。 ・ 追加 医薬品リスク最小化活動として、以下を実施する。 1. 医療従事者向け資材の作成と提供〔適正使用ガイド（適応症：クローン病）〕 2. 患者向け資材の作成と提供〔ウステキヌマブBS「ニプロ」による治療について（適応症：クローン病）〕 3. 適正使用に関する納入前の確実な情報提供（クローン病） 【選択理由】 医療関係者向け適正使用資材において、本剤を使用する医療関係者に確実に情報提供し、適正使用に関する理解を促す。また、患者向け適正使用資材においても、具体的な症状とともに間質性肺炎に関する情報を記載し、注意喚起を図り、副作用等の被害を最小限にする。

重要な潜在的リスク	
悪性腫瘍	
	重要な潜在的リスクとした理由： 以下の理由により、先行バイオ医薬品（ステラーラ）の医薬品リスク管理計画書（RMP）で重要な潜在的リスクとして挙げられている。 - 先行バイオ医薬品の尋常性乾癬患者と乾癬性関節炎患者を対象とした主要な臨床試験において、悪性腫瘍の発現が認められている。 - 先行バイオ医薬品の国内製造販売後において、悪性腫瘍が報告されている。 - 先行バイオ医薬品のクローン病患者を対象とした臨床試験において、悪性腫瘍の発現が認められている。 - 先行バイオ医薬品との関連性は明確ではないが悪性腫瘍が報告されており、先行バイオ医薬品の免疫抑制作用により悪性腫瘍の発現リスクを増大させる可能性がある。 本剤は選択的な免疫抑制作用を有し、悪性腫瘍の発現リスクを増大させる可能性がある。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常 of 医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常 of 医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 - 通常 of リスク最小化活動として、電子添文の「警告」、「重要な基本的注意」、「特定の背景を有する患者に関する注意」、「その他の注意」の項及び患者向医薬品ガイドに悪性腫瘍に関する注意事項を記載して注意喚起する。 - 追加 of リスク最小化活動として、以下を実施する。 - 医療従事者向け資材の作成と提供〔適正使用ガイド（適応症：クローン病）〕 - 患者向け資材の作成と提供〔ウステキヌマブBS「ニプロ」による治療について（適応症：クローン病）〕 - 適正使用に関する納入前の確実な情報提供（クローン病） 【選択理由】 医療関係者向け適正使用資材において、本剤を使用する医療関係者に確実に情報提供し、適正使用に関する理解を促す。また、患者向け適正使用資材においても、悪性腫瘍に関する情報を記載し、注意喚起を図る。

心血管系事象	
	重要な潜在的リスクとした理由： 以下の理由により、先行バイオ医薬品（ステラール）の医薬品リスク管理計画書（RMP）で重要な潜在的リスクとして挙げられている。 ● 重度乾癬患者は、乾癬を罹患していない、あるいは軽度乾癬患者に比して、肥満、糖尿病、高血圧のような心血管疾患を発症するリスクとなる疾患を合併する傾向が高いことが報告されている¹⁾。 ● 先行バイオ医薬品の尋常性乾癬患者と乾癬性関節炎患者を対象とした主要な臨床試験において、主要心血管イベント（MACE）に該当する心血管系事象の発現が認められている。 ● 先行バイオ医薬品のクローン病患者を対象とした臨床試験において、MACEに該当する心血管系事象の発現が認められている。 ● 先行バイオ医薬品の国内製造販売後において、心不全、心筋梗塞、脳卒中などの心血管系事象が報告されている。 1) Neimann AL, Shin DB, Wang X, Margolis DJ, Troxel AB, Gelfand JM. Prevalence of cardiovascular risk factors in patients with psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2006;55(5):829-835.
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常の医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 リスク最小化活動は実施しない。 【選択理由】 心血管系事象に対して、現状、特記すべき注意喚起内容は認められないため、リスク最小化活動は実施しない。今後、注意喚起すべき新たな知見が得られた場合は、電子添文及び患者向医薬品ガイドによる情報提供を検討する。

膿疱性乾癬・乾癬性紅皮症の悪化及び新規発現	
	重要な潜在的リスクとした理由： 以下の理由により、先行バイオ医薬品（ステラーラ）の医薬品リスク管理計画書（RMP）で重要な潜在的リスクとして挙げられている。 - 先行バイオ医薬品の尋常性乾癬患者と乾癬性関節炎患者を対象とした主要な臨床試験において、膿疱性乾癬・乾癬性紅皮症の発現が認められており、国内製造販売後において、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症を含む乾癬関連の事象が報告されている。 - 先行バイオ医薬品のクローン病患者を対象とした臨床試験において、膿疱性乾癬の発現が認められている。 - 先行バイオ医薬品において、臨床試験における膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症の発現割合はプラセボ又は対照群と同程度であるが、他の生物学的製剤の乾癬に対する治療においても膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症の逆説的な悪化や新規発現が報告されており、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症は事象の重大性が高い。 TNF α 阻害剤などの生物学的製剤の乾癬に対する治療において、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症の逆説的な悪化や新規発現が報告されている²⁾。 2) Wollina, U. et al. Tumor necrosis factor-alpha inhibitor-induced psoriasis or psoriasiform exanthemata: first 120 cases from the literature including a series of six new patients. Am. J. Clin. Dermatol. 2008;9(1):1-14.
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常の医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常のリスク最小化活動として、電子添文の「副作用」の項に膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症を記載し、注意喚起する。 【選択理由】 電子添文に記載し、医療従事者に対して適正使用への理解を促す。

免疫原性	
	重要な潜在的リスクとした理由： 本剤は生物学的製剤であり外来タンパク質を注射投与することで、免疫反応の原因となる可能性がある。 以下の理由により、先行バイオ医薬品（ステラーラ）の医薬品リスク管理計画書（RMP）で重要な潜在的リスクとして挙げられている。 - 先行バイオ医薬品の乾癬患者を対象とした国内臨床試験において、ウステキヌマブ投与により72週目までに抗ウステキヌマブ抗体陽性である患者が認められている。 - 先行バイオ医薬品のクローン病患者を対象とした臨床試験において、約1年間の投与により抗ウステキヌマブ抗体陽性である患者が認められている。 - 抗ウステキヌマブ抗体の産生と注射部位反応等の発現に関連は認められていないが、先行バイオ医薬品の臨床試験で一定の割合で抗ウステキヌマブ抗体が認められている。 本剤の海外第3相臨床試験において、28週目までの抗薬物抗体陽性は、本剤で249例中33例（13.3%）、52週目までの抗薬物抗体陽性は、本剤で249例中41例（16.5%）であった（ステラーラ+本剤で122例中48例〔39.3%〕）。切替え後に発現した抗薬物抗体の発現率は同程度であった（28週目から52週目までの抗薬物抗体陽性：本剤+本剤で234例中13例〔5.6%〕、ステラーラ+本剤で118例中6例〔5.1%〕）。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常、の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 本剤の海外臨床試験において、新たな安全性上の懸念は認められていないことから、通常、の医薬品安全性監視活動により情報収集を行う。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 通常、のリスク最小化活動として、電子添文の「その他の注意」の項に記載し、注意喚起する。 【選択理由】 電子添文に記載し、医療従事者に対して適正使用への理解を促す。

重要な不足情報
なし

1. 2 有効性に関する検討事項

なし

2. 医薬品安全性監視計画の概要

通常 of 医薬品安全性監視活動
通常 of 医薬品安全性監視活動 of 概要： 副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全対策 of 検討 （及び実行）並びに定期的な評価（承認日から1年ごと）
追加 of 医薬品安全性監視活動
なし

3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要

なし

4. リスク最小化計画の概要

通常のリスク最小化活動	
通常のリスク最小化活動の概要： 電子添文及び患者向医薬品ガイドによる情報提供	
追加のリスク最小化活動	
医療従事者向け資材の作成と提供〔適正使用ガイド（適応症：クローン病）〕	
	【安全性検討事項】 重篤な過敏反応、重篤な感染症、結核、間質性肺炎、悪性腫瘍 【目的】 安全性検討事項について注意喚起し、医薬品の適正使用を医療従事者に対して周知する。 【具体的な方法】 納入施設に対し、医薬情報担当者が配布、説明し、資材の活用を依頼する。 【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】 医薬品リスク管理計画に関する評価報告書提出時に、内容の更新が必要か検討する。
患者向け資材の作成と提供〔ウステキヌマブBS「ニプロ」による治療について（適応症：クローン病）〕	
	【安全性検討事項】 重篤な過敏反応、重篤な感染症、結核、間質性肺炎、悪性腫瘍 【目的】 本剤の副作用の早期発見につながる自覚症状について患者に情報提供する。 【具体的な方法】 納入施設に対し、医薬情報担当者が配布、説明し、資材の活用を依頼する。 【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】 医薬品リスク管理計画に関する評価報告書提出時に、内容の更新が必要か検討する。
適正使用に関する納入前の確実な情報提供	
	【安全性検討事項】 重篤な過敏反応、重篤な感染症、結核、間質性肺炎、悪性腫瘍 【目的】 本剤の適正使用を促進し、安全性を確保するため。 【具体的な方法】 初回納入施設に対して本剤の安全性プロファイルや副作用発現時の対応について情報提供を行う。 【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】

	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書提出時に、情報提供の実施方法等について検討する。
--	---

5. 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧

5. 1 医薬品安全性監視計画の一覧

通常の医薬品安全性監視活動				
副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全対策の検討（及び実行）並びに定期的な評価（承認日から1年ごと）				
追加の医薬品安全性監視活動				
追加の医薬品安全性監視活動の名称	節目となる症例数 ／目標症例数	節目となる 予定の時期	実施状況	報告書の 作成予定日
なし	-	-	-	-

5. 2 有効性に関する調査・試験の計画の一覧

有効性に関する調査・試験の名称	節目となる症例数 ／目標症例数	節目となる 予定の時期	実施状況	報告書の 作成予定日
なし	-	-	-	-

5. 3 リスク最小化計画の一覧

通常のリスク最小化活動		
電子添文及び患者向医薬品ガイドによる情報提供		
追加のリスク最小化活動		
追加のリスク最小化活動の名称	節目となる 予定の時期	実施状況
医療従事者向け資材の作成と提供 〔適正使用ガイド（適応症：クローン病）〕	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書提出時	実施中
患者向け資材の作成と提供〔ウステキヌマブBS「ニプロ」による治療について（適応症：クローン病）〕	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書提出時	実施中
適正使用に関する納入前の確実な情報提供（クローン病）	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書提出時	実施中