

オンスイクご使用のポイント

詳しい使い方や注意点については、取扱説明書を必ずお読みください。

医薬品リスク管理計画
(RMP)

1 注射の前にラベルを確認

オンスイクは、**週に1回**投与するインスリンのお薬です
注射の前に**ラベルの表示を確認**してください
オンスイクと他のお薬を間違えないようにご注意ください

週1回投与

この表示は、用法を示し、
「**1週間に1回**投与するお薬」で
あることをあらわしています。

製品名が「オンスイク®注ミリオペン®」で
あることを確認してください。

オンスイク®注ミリオペン®
総量1500単位



1目盛 5単位

この表示は、単位合わせダイヤルの**1目盛が5単位**に
相当することをあらわしています。

2 1クリック (1目盛) が5単位

オンスイクの単位設定ボタン (注入ボタン) を回すと1クリック
(1目盛) 毎に「カチッ」と音がし、**1クリック (1目盛) が5単位**に
相当します

投与量を間違えないために、音だけで判断せず
必ず**ダイヤル表示を確認**しながら単位数を合わせてください

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 (一般の方・患者様向け)
0120-245-970※1 / 078-242-3499※2

<当社製品に関するお問い合わせ> 受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30※3

<当社注入器に関するお問い合わせ> 受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00

※1 通話料は無料です。携帯電話からでもご利用いただけます。尚、IP電話からはフリーダイヤルをご利用できない場合があります。


※2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、このお電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。

※3 祝祭日および当社休日を除きます。

日本イーライリリー株式会社

3 投与量

血中インスリン濃度を早く安定させるため
通常、**初回に限り3倍用量**で投与しますが、
患者さんの状態により変更する場合があります



※投与量は効果や体調に応じて調整されます。必ず主治医の指示に従ってください。

4 保管方法

使用開始前、使用開始後ともに**冷蔵庫 (2～8℃)** に保管し、
凍結させないでください
高温や直射日光を避けてください

5 低血糖の対処法

オンスイクの副作用として**低血糖があらわれる**ことがあります
低血糖の症状があらわれたら、**すぐに糖分をとってください**
症状が良くならない場合や、糖分を口からとることができない
場合には、**すぐに医療機関に連絡して処置を受けてください**