RMP

監修 東京都立駒込病院
臨床研究・治験センター/呼吸器内科 加藤 晃史 先生

# ベージニオ®錠を服用される患者さんへ

## ベージニオ®錠の服用中に「間質性肺疾患*」があらわれることがあります。

以下のような症状が見られた場合には、

**服用を中止し、速やかに**

治療を受けている医療機関に連絡してください。

- ☐ 階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる
- ☐ 空咳（痰のない咳）が出る
- ☐ 発熱する など

*間質性肺炎・肺臓炎とよばれることがあります

● 間質性肺疾患（かんしつせいはいしっかん）は、
急に重篤化して死亡に至る可能性があるため、
**早期発見**と**早期治療**が大切です

● 症状が見られた場合には、
ベージニオの**服用を中止し、速やかに**
治療を受けている医療機関（あるいは指示された緊急時の連絡先）に連絡してください

| 緊急時の連絡先 | | |
|---|---|---|
| | 通常時 | 夜間・休日 |
| ● 医療機関名 | | |
| ● 診療科名 | | |
| ● 担当医名 | | |
| ● 電話番号 | | |

## ご家族または介護されている方へ

上記医療機関を受診できない場合は、

✓ 救急対応が可能な医療機関を受診してください

✓ 受診先の医師などには、間質性肺疾患を起こす可能性のある薬剤（ベージニオ）を服用中の旨お伝えください

本リーフレットの内容は動画でもご覧いただけます。
アクセスはこちら ▶▶▶

**ベージニオに関するお問い合わせ**

ベージニオ相談窓口
日本イーライリリー株式会社

フリーダイヤル 0120-526-062
（365日年中無休/時間9:00-21:00）

Lilly
A MEDICINE COMPANY

日本イーライリリー株式会社

ABE-N004(R4)
2025年6月作成