

**ルムジェブ<sup>®</sup>注**  
**ミリオペン<sup>®</sup>/ミリオペン<sup>®</sup>HDを**  
**ご使用の患者さんへ**



**医療従事者の皆様へ**

ルムジェブ<sup>®</sup>注ミリオペン<sup>®</sup>/ミリオペン<sup>®</sup>HDを  
使用される患者さんにお渡してください。

*Lilly*

# ルムジェブ® 注ミリオペン®/ミリオペン®HDを ご使用の患者さんへ

## ！ 注射のタイミングをご確認ください

※ ルムジェブは従来の超速効型インスリンよりすみやかに効果があらわれるため、注射のタイミングが異なります。主治医から指示された内容を勝手に変更したり、誤った使い方をしないように注意しましょう。

### 食事開始時に注射する場合

食事開始前の2分以内に注射し、注射後すみやかに食事を開始してください。

### 主治医の判断により 食事開始後に注射する場合

食事開始から20分以内に注射してください。なお、食事開始後の注射は主治医と相談し、その指導の下で行ってください。

注射後すみやかに  
食事を開始してください

※ 食事開始後に注射する場合は、食事が終わっていてもいなくても、食事開始から20分以内に注射してください

-2分

食事開始

20分



## ！ 使用する製剤をご確認ください

ルムジェブ®注ミリオペン® (1単位刻み)


本体正面	注入ボタン	
		紺

ルムジェブ®注ミリオペン®HD (0.5単位刻み)

本体正面	注入ボタン	
		薄 だいたい



## 注射のタイミングが適切でない場合、 思わぬ低血糖の恐れがあります



## 低血糖の症状を感じたら、 すぐに主治医にご相談ください

- お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、手足のふるえなどの症状があらわれた場合は、すぐに糖分を含む食品をとってください。
- 低血糖をくりかえさないようにするため、低血糖が起きた場合は、**すぐに主治医に相談しましょう。**



### 糖分のとり方

- ブドウ糖
- ブドウ糖を含む飲み物: ジュース、清涼飲料水など
- 砂糖: 角砂糖など\*



※ α-グルコシダーゼ阻害薬 [アカルボース、ボグリボース (配合剤を含む)、ミグリトール] を服用している場合には、必ずブドウ糖を摂取してください。

## Lilly Answers

日本イーライリリー 医薬情報問合せ窓口 リリーアンサーズ  
(一般の方・患者様向け)

0120-245-970<sup>※1</sup>

### 〈当社製品に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30<sup>※2</sup>

### 〈当社注入器に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※2 祝祭日及び当社休日を除きます。

## Lilly Answers

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 リリーアンサーズ  
(一般の方・患者様向け)

0120-245-970<sup>※1</sup>

### 〈当社製品に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30<sup>※2</sup>

### 〈当社注入器に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※2 祝祭日及び当社休日を除きます。