

オンボー®を使用される患者さんへ

治療中の注意点とその症状

下記のような症状がでたり、少しでも体調がおかしいと感じたら、すぐに医師、薬剤師または看護師にご相談ください。

注射当日

● 重篤な過敏症(アナフィラキシーなど)

薬剤の投与後、30分以内に起こることが多いですが、数時間経ってからあらわれることもあります。かゆみ、じんましんなどのアレルギー症状と似た症状の他、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、心臓の動きがいつもより早く感じる、意識が薄れてくる、などの症状があります。

「息苦しさ」や「顔面や手足の蒼白、頻脈、冷や汗などのショック症状」などがでた時は、躊躇せずにすぐ医療従事者に知らせてください。



注射後(治療期間中)

● 重篤な感染症

過去に治療した結核がふたたび悪化したり、肺炎やその他の感染症が重篤化することがあります。

熱、咳、のどの痛みなど風邪のような症状や、息切れ、息苦しさが続くなどの症状がある場合には、すぐに医師にご相談ください。



● 肝障害

治療中は、肝機能の数値の上昇が見られることがあります。これらは自分でわかりにくいため、血液検査で確認します。

定期的に受診し、血液検査を受けてください。

その他、気になる症状があらわれた場合には、医師、薬剤師、または看護師に連絡してください。

医師または薬剤師への連絡先