

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

適正使用のお願い

生物由来製品 ワクチン・トキソイド混合製剤
劇 薬 日本薬局方 生物学的製剤基準
処方箋医薬品 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
販 売 名 トリビック

2018年1月

一般財団法人 阪大微生物病研究会
田辺三菱製薬株式会社

《接種後の注意点》

- ・失神に備えて、接種後の移動の際には医療従事者あるいは保護者等が腕を持つなどして付き添うようにしてください。
- ・失神し倒れることも想定されるため、接種後30分程度は体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて院内で待機していただくようご指導をお願いいたします。

注射による痛み、恐怖、興奮などに引き続く血管迷走神経反射が原因で、予防接種後に失神が発現することがあります。失神による転倒の結果として、骨折などの二次被害を来す可能性があるため、特に10歳以上の方に接種する際には、失神に注意しながら接種する必要があるとされています¹⁾。

本剤をご使用の際は、上記接種後の注意点をご確認のうえ、下記の内容を踏まえ、失神による転倒を回避する対策を実施していただきますようお願い申し上げます。

《失神について》

予防接種後の失神について、一般的に以下のようなことが知られています。

- 機 序：痛み、恐怖、興奮などに引き続く血管迷走神経反射が原因といわれています¹⁾。
- 好 発 年 齢：10歳代での発現が過半数を占めます²⁾。
- 注意すべき対象：注射への恐怖心が強い人等があげられます¹⁾。
- 好 発 時 間：接種直後あるいは15分以内での発現が多くを占めますが、それ以降の発現もみられます¹⁾。
- 処 置：下肢を軽く挙上し安静臥床させ、必要に応じて輸液や酸素投与を行います¹⁾。

1) 日本小児科学会予防接種感染対策委員会声明：予防接種後の失神に対する注意点について（2010年9月）
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/saisin_100927.pdf

2) CDC. Syncope after vaccination - United States, January 2005-July 2007. *MMWR Morb Mortal Rep* 2008; 57:457-460

本剤の適正使用にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

製造販売元
一般財団法人 **阪大微生物病研究会**
香川県観音寺市瀬戸町四丁目1番70号

販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪府中央区道修町3-2-10

お問い合わせ先
田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター
専用ダイヤル 0120-753-280
(弊社営業日の9:00~17:30)

17-019

2018年1月作成