

パリンジック®皮下注 2.5mg パリンジック®皮下注 10mg パリンジック®皮下注 20mg

調剤上の留意点(薬剤師用確認書)

パリンジック®皮下注(以下、本剤)は、「本剤投与開始前にアナフィラキシーの徴候・症状、それらの症状が発現した場合の対処方法等を患者に指導し、患者が理解したことを確認した上で本剤の投与を開始すること。本剤による治療中は自己注射可能なアドレナリン注射剤を常時携帯するよう、患者に指導すること。」とされています。調剤の際に下記をご確認いただけますようお願い申し上げます。

本剤の処方に対し

- ☐ 患者または観察者(家族等)が本剤の自己注射トレーニングを受けていること

アナフィラキシーなどの過敏症反応に対し

患者本人について

- ☐ 医療機関からアドレナリン注射剤の処方を受けていること
- ☐ 医療機関からアナフィラキシーの徴候・症状及びそれが認められたときの対処方法の説明を受け、アドレナリン注射剤の適切な投与について指導されていること
- ☐ アドレナリン注射剤及び患者カードを常に携帯していること
- ☐ アドレナリン注射剤が同時に処方されていない場合、患者が使用期限内のアドレナリン注射剤を携帯していること

観察者について

- ☐ 観察者が同行している(同行していない場合には下記について観察者が理解していることを患者本人に確認)
- ☐ 医師から観察するようにと指導された期間、投与後少なくとも1時間は患者の傍らにあり、アナフィラキシーの徴候及び症状を認識し緊急の医療支援を求めることが可能であること
- ☐ アドレナリン注射剤を適切に投与できるよう指導されていること