

エフメノ[®]カプセル100mg

F-meno[®] capsules 100mg

服用時に注意いただきたいこと

エフメノ[®]カプセル 100mg を服用中に副作用があらわれる可能性があります。
特に注意する副作用は、血栓症と乳がんです。

血栓症

(血管に血のかたまりができて詰まってしまう病気です。心筋梗塞や脳梗塞、肺塞栓症が含まれます。)

- 次の人は症状が悪化するおそれがあるため、この薬の治療が受けられません。医師または薬剤師に相談してください。
 - ・ 血栓塞栓症や重度の血栓性静脈炎のある人、または過去にこれらの病気になったことがある人
 - ・ 脳出血のある人
- 次のような症状があらわれた場合、血栓症の疑いがあります。ただちに飲むのをやめて医師または薬剤師に相談してください。
ふくらはぎの痛み・腫れ、手足のしびれ、鋭い胸の痛み、突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み、激しい頭痛、脱力、まひ、めまい、失神、目のかすみ、舌のもつれ、しゃべりにくいなど
- 長時間同じ姿勢でいたり、身体を動かせない状態でいると、血液の流れが悪くなり、血栓症のリスクが高くなります。定期的に体を動かし、こまめに水分補給をしてください。

乳がん

- 乳がんの疑いがある人、または過去になったことがある人は、症状が悪化するおそれがあるため、この薬の治療が受けられません。医師または薬剤師に相談してください。
- 乳房にしこりのある人、乳房レントゲン像に異常がある人は、乳がんの疑いがないか医師の診断を受けてください。また、一般的に乳がんになった人が血縁にいる人では、乳がんを発症する可能性が高いと言われているので、医師に相談してください。
- 卵胞ホルモン剤とこのお薬を併用した場合、その期間が長くなるにしたがって乳がんになる危険性が高くなるとの報告があります。
- 定期的に乳房検診を受けてください。

その他注意すべきこと

- この薬を中止すると、不安や気分の変化などがあらわれることがあります。医師から使用をやめるよう指示があり中止した際は、不安や気分の変化などに気を付けてください。
- 眠気やめまいがあらわれることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には気を付けてください。

※その他、気になることがあれば、医師または薬剤師にご相談ください。



富士製薬工業株式会社