

「ブリリント[®]錠」を 服用される患者さまへ

監修:

上尾中央総合病院 心臓血管センター特任副院長
一色 高明 先生






ブリリント[®]錠は、 血栓をできにくくするための お薬です。



虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症など）の患者さんは、心臓に血液を送り、酸素と栄養素を届けるための太い血管（冠動脈）が、血のかたまり（血栓）によって狭くなったり、詰まりやすくなっています。そのため、PCI（経皮的冠動脈インターベンション）治療によって血管の中にステントという金属を入れて、血管の狭くなっているところを広げる治療をします。

しかし、いったんこのような病気を起こした患者さんは、血栓ができやすい状態にあるため、再び血栓ができて血管が詰まってしまう危険性が高くなっています。そのため、ブリリント[®]錠を服用して、血管の中で血栓ができやすくなっている状態を改善し、血液の流れをスムーズにします。



- **ブリリント[®]錠は、**
同じような作用があるアスピリンというお薬と一緒に処方されます。
そのため、より血栓はできにくくなりますが、出血するおそれもありますので、
2、3ページの「服用中、特に気をつけて欲しいこと」をよく読んで、出血にご注意ください。



ブリリント®錠の服用中は、 「出血」に気をつけてください。



ブリリント®錠などの抗血小板剤を服用している間は、出血しやすくなり、出血した場合は血が止まりにくくなります。

次のような症状があらわれた場合には、速やかに医師にお話してください。

● 重大な出血時にあらわれる主な症状

頭蓋内（ずがいない）の出血や、消化器系の出血などの重大な出血が起こることがあります。以下のような症状があらわれたときは、頭や体の中で出血が起こっている可能性があります。



激しい頭痛、手や足のマヒ、
ろれつが回らない



血痰、吐血



血尿、血便

● 予期せぬ出血



転倒や事故などによるケガで
出血してなかなか止まらない

● よく起こる出血



鼻血や歯茎からの出血

ブリリント[®]錠の服用中に「出血」したときは、**応急処置**をしてください。また、出血を避けるために日々の行動に注意してください。

出血時の応急処置

≫ 鼻血が出たとき



≫ 下を向いて、
鼻をつまんで
ください

≫ 外傷で出血したとき



出血している
傷口を手・指や
ハンカチなどで
強く押さえて
ください

出血を避けるために



≫ ケガや事故に
注意し慎重に
行動しましょう



≫ 転倒に
注意しましょう



≫ ヒゲ剃りはカミソリより
電気シェーバーを
使いましょう



≫ 歯を磨くときは
柔らかめの
歯ブラシを
使いましょう



≫ 鼻は
やさしく
かみましょう



▶ ブリリンタ[®]錠の服用中に、
徐脈性不整脈がおこり、**めまい**、
場合によっては**意識を失う**ことがあります。

ブリリンタ[®]錠を服用中、脈が遅くなる、めまい、立ちくらみ、意識を失う等の徐脈性不整脈の症状があらわれることがあります。

これらの症状があらわれた場合は、速やかに医師までご相談ください。



▶ **息切れ**を感じた際は、
すぐに医療機関を受診してください。

ブリリンタ[®]錠を服用中、息切れを始めとする呼吸困難を感じる場合があります。症状があらわれた場合、ご自身の判断で服用中止や、お薬の減量などはせず、必ず医師までご相談ください。

このような症状は概ね改善されることが報告されていますが、息切れがあらわれたとき、息切れがつづくとき、息切れの症状が悪くなったときは、速やかに医師にお伝えください。



他の診療科では、 ブリリント®錠を服用していることを 伝えてください。

拔牙、手術などの際に血が止まりにくくなったり、他の薬との飲みあわせにより作用の強さが変わったりする場合があるので、他の病院・診療科を受診する場合は、ブリリント®錠を服用していることを医師にお話してください。

！ 歯の治療や拔牙をするとき



！ 新しい薬を処方されたとき



！ 他の医療機関を受診するとき



！ 手術を必要とするとき



服用中、いつもと違う症状に気がいたら、
ただちに医師または
薬剤師にお伝えください。


症状が変わったり、不安になった場合は、
医師または薬剤師に相談しましょう。症状
が軽くなったように感じて、医師の指示
がある間は服用しましょう。

ご自身の判断でお薬を飲むのをやめたり、
お薬の量を減らしたりせず、医師の指示
する期間、きちんと服用を続けましょう。



お薬は飲み忘れのないように、
毎日、決められた量・回数をきちんと続けて服用しましょう。

☒ 服用方法



必ず1日2回
服用してください

☒ 飲み忘れたら？



ブリリンタ®錠を飲み忘れたときは、
次の服用タイミングに
通常どおり1回分を飲んでください。

1度に2回分を飲まないように
してください。

