

オータイロ服用の際にご注意いただきたい副作用

次のような症状がある場合は、すぐに医師にご連絡ください。

間質性肺疾患の疑い

- 息切れ、息苦しさ
- 乾いた咳が続く
- 胸の違和感
- 発熱

■間質性肺疾患を疑う症状がみられたら、すぐに医師に連絡または受診してください。

軽度に見える兆候や症状であっても、治療せずに放置すると急速に悪化する可能性があります。

重大な副作用を最小限におさえるために、医師による副作用の早期評価と管理が不可欠です。

中枢神経系の副作用の疑い

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> めまいが続く、繰り返す | <input type="checkbox"/> めまいで立っていられない |
| <input type="checkbox"/> ふらついてまっすぐ歩けない | <input type="checkbox"/> 手足の動きがぎこちない |
| <input type="checkbox"/> ろれつがまわらない | <input type="checkbox"/> もの忘れがひどい |
| <input type="checkbox"/> 自分のいる場所や時間、
人の名前がわからなくなる | <input type="checkbox"/> 気分の落ち込み |
| <input type="checkbox"/> 家族や周囲の人から、普段と様子が違うと
いわれるようになった | |

■自動車の運転や危険を伴う機械の操作に気をつけてください。

これらの症状がある場合は、医師の指示に従い、症状が治まるまで自動車の運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。

骨折の疑い

- 関節の痛み
- 骨や骨の周囲の痛み
- 骨の変形
- 関節を曲げにくい
- 手足が動かしにくくなる

■骨折の既往歴や骨折のリスクが高まるような身体の状態や病気があれば、オータイロを服用する前に医師にお知らせください。

緊急連絡先(受診先の医療機関)

医療機関名:

電話番号:

担当医師名: