

## ニシスタゴン<sup>®</sup>カプセル 50mg・150mg を 服用される患者様およびご家族の方へ

このお薬は全身に作用し、体に蓄積した「シスチン」を取り除くお薬です。腎性シスチン症の治療に用います。

### 腎性シスチン症とは？

腎性シスチン症は、全身に「シスチン」が蓄積する遺伝性の病気です。このお薬を服用することで、全身に蓄積している「シスチン」を取り除きます。

### このお薬の使い方

- 1日4回服用するお薬です。
- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。  
なお、カプセルが飲み込みにくい方は、医師にお伝えください。
- 指示された時間に飲むのを忘れてしまったら、1回とばして次の指示された時間から飲んでください。
- あなたに合った服用量を確認するために医師が血液検査を行うことがあります。
- このお薬は毎日継続して服用することで病気の悪化を遅らせます。自己判断で使用をやめたり、量を変更したりせず、医師・薬剤師の指示に従ってください。

## 服用にあたってのご注意

- このお薬は、高脂肪食や高タンパク食を食べた後に服用した時には、食事を食べなかった時に比べて、血液の中の薬の量が少なくなるとの報告がありますので、注意してください。
- このお薬は、食道ではなく気管に入って、のどに詰まり、息ができなくなる危険性があります。食べ物などが飲み込みにくい患者、高齢者や小児の方が服用する際には、注意してください。
- 医師の指示により、カプセルをはずして、中の粉を直接服用する場合は、必ず、服用の直前にカプセルをはずしてください。残った粉は次の時以降に服用せず、お薬をもらった病院または薬局に返却をしてください。
- カプセルの中の粉を酸性の飲み物（オレンジジュースなど）にいれると、飲み物と粉が混ざらないことや、粉が固まったりすることがありますので避けてください。

## 女性の方へ

- 妊娠または妊娠の可能性のある場合  
動物実験で、催奇形性の報告があります。このお薬を服用する前に現在の妊娠の有無、または、妊娠する予定について医師に申し出てください。
- 授乳中の場合  
授乳を中止してください。動物実験で本剤を投与された動物の子の生存率が低下したとの報告があります。

下記のような症状が現れた際には、  
医師又は薬剤師に相談してください。

- 高熱(38℃以上)、目のじゅうけつ、くちびるのただれ、のどの痛み、皮ふの広い範囲が赤くなる
- 頭痛、吐き気、かすみ目、物が二重に(二つに)見える
- 皮膚が裂ける、赤くもりあがった発疹、内出血しやすい、血管が多く透ける、関節が痛い、関節が動きすぎる、脱臼しやすい
- 意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、物忘れ、けいれん、ふらつき
- 胃のもたれ、食欲低下、胸やけ、吐き気、胃が痛い、空腹時にみぞおちが痛い、便が黒くなる、吐血
- 発熱、発疹、関節の痛み、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛むくみ、尿量が少なくなる

様

年 月 日 ~ 年 月 日

あなたの服用個数は

	1 日			
	1 回目 時 分	2 回目 時 分	3 回目 時 分	4 回目 時 分
50mg カプセル				
150mg カプセル				

医師または薬剤師の連絡先

ヴィアトリス製薬株式会社

