

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ファイザー」 をお飲みになるこどもの患者さんと保護者の方へ

このお薬は^{けつとう ち}血糖値を下げる^{とうにようびょうちりょうやく}糖尿病治療薬です

このお薬をのむときに気をつけること

- お医者さんまたは薬剤師^{やくざいし}さんの指示^{しじ}どおりにのみましょう
◇このお薬は指示どおりにのみ続けることが大切です。
◇のみ^{のみ}忘れた場合は、次のお薬をのむ時間^{つづ}に1回分をのみ^{たいせつ}ましょう。
決して2回分を一度にのんではいけません。
- ^{ていけつとう}低血糖^{ちゅうい}に注意^{ちゅうい}しましょう
◇急にひどくお腹がすいた感じや力のぬけた感じがしたり、気持ちが悪くなったり、冷や汗、手足のふるえなどがおこったりしたら、血糖値が低くなりすぎているので、すぐに砂糖やブドウ糖をとりましょう。
砂糖とブドウ糖のどちらをとったらよいかは、あらかじめお医者さんまたは薬剤師さんに聞きましょう。
- ◇高いところにいるときや、自転車に乗っているときに低血糖になると、事故^{じこ}につながる危険^{きけん}があります。
- ^{にゅうさん}乳酸アシドーシスをおこさないように注意^{ちゅうい}しましょう
◇熱^{あつ}や下痢^{げり}、嘔吐^{おうと}、食欲^{じよくよく}がなく食事がとれない状態^{じょうたい}（シックデイ）のときは、このお薬をのむのをいったんやめて、お医者さんまたは薬剤師さんに相談^{さうだん}しましょう。
- ◇^{だつすいしょうじょう}脱水症状^{ていすい}がおこらないよう、適度^{てきど}に水分をとりましょう。

<保護者の方へ>

◇低血糖について

- ・おもて面のような症状がみられたり、「ボーッとしている、うとうとしている、ろれつが回らない」などの様子が気づいたときは、すぐに砂糖やブドウ糖をとらせてください。
- ・ α -グルコシダーゼ阻害薬（アカルボース、ボグリボース、ミグリトール）と呼ばれるお薬をのんでいる場合には、砂糖ではなく必ずブドウ糖をとる必要があります。あらかじめ医師または薬剤師に確認してください。
- ・砂糖やブドウ糖をとれば通常5分以内に症状は改善しますが、よくなるいときや「意識がなくなる、けいれんをおこす」などの場合はすぐに医師にご相談ください。

◇乳酸アシドーシスについて

- ・乳酸アシドーシスは、まれにおこる重大な副作用です。
- ・吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状、けん怠感、筋肉痛、過呼吸（深く大きな呼吸）などの症状があらわれたら、すぐに医師にご相談ください。
- ・腎臓、肝臓、心臓、肺に病気のある方、透析を受けている方、感染症にかかっている方、乳酸アシドーシスをおこしたことがある方は医師に申し出てください。
- ・脱水状態のときには、このお薬をのませないでください。また、脱水をおこさないように水分を適度にとらせてください。
- ・発熱、下痢、嘔吐、食欲がなく食事がとれない状態（シックデイ）のときには、脱水により乳酸アシドーシスをおこしやすくなります。このお薬をいったんやめて、医師または薬剤師にご相談ください。
- ・食事をとれなかったときののみ方については、医師または薬剤師にご相談ください。

◇その他の注意

- ・このお薬をのんでいる間は定期的な血糖値・尿糖検査、腎機能、肝機能の検査が行われます。
- ・手術やヨード造影剤を使用する検査や治療を受けるとき、他のお薬を処方してもらったときや薬局で買うときは、このお薬をのんでいることを、医師または薬剤師にお伝えください。

この他にも気になる症状があらわれた場合には、
医師または薬剤師にご相談ください。



ファイザー株式会社



Mylan



読みやすさを追求した書体