

お子さまと保護者の方へ

新型コロナワクチン コミナティを

接種されるお子さまと保護者の方へ



お母さん、お父さん、おうちのひとと一緒に

この説明書を読んで、ワクチンのことを知っておきましょう。
保護者の方へ：保護者の方もお子さまと一緒に5～11歳のお子さま向けページ
(2～6ページおよび裏表紙)をご確認ください。

対象年齢	生後6か月～11歳
対象ワクチン (以下、本ワクチン)	・コミナティ筋注5～11歳用(1価:起源株) (以下、起源株対応ワクチン(5～11歳用))
	・コミナティ筋注5～11歳用(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5) (以下、オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン(5～11歳用))
	・コミナティ筋注6か月～4歳用(1価:起源株) (以下、起源株対応ワクチン(6か月～4歳用))

「起源株」、「オリジナル株」、「従来株」は同一のものを指しています。

こちらのご案内は生後6か月～11歳の方へ向けた起源株対応ワクチンおよびオミクロン株(BA.4-5)対応ワクチンの情報をまとめています。本ワクチンの接種については各自治体からの案内もご確認ください。

また、本ワクチン以外の新型コロナワクチン(コミナティ)に関する情報は、別の冊子を作成しています(12歳以上の方を対象とするワクチンも含まれます)。

必要な場合には、P.23に掲載した情報提供サイトをご確認ください。

※:5～11歳のお子さまを対象とした情報はオレンジ色を、生後6か月～4歳のお子さまを対象とした情報は栗色を基調として作成し、色調で対象年齢を判別できるようにしております。



【5～11歳のみなさんへ】 新型^{しん}コロナワクチン^{がた}ってどんなワクチン[?]?


どうして^{しん}新型^{がた}コロナワクチン^うを受ける^のの[?]?

新型^{しん}コロナワクチン^{がた}を受ける^うことで、ウイルス^{から}が体^{からだ}にはい^{しん}ってき^{がた}ても新型^{しん}コロナ^{しょうじょう}の症状^でが出^しにく^りくなります。

新型^{しん}コロナワクチン^{がた}には^きどんな^め効き目[?]がある^のの[?]?

もともと^{わたし}私^{から}たちの体^{からだ}には、ウイルス^{てき}がはい^{つき}ってき^つたとき^にに、^{てき}どんな^{つぎ}敵^{つぎ}かをおぼ^{つぎ}えてお^{つぎ}いて、次^{つぎ}にはい^{つぎ}ってき^{つぎ}たら、
すぐ^{つぎ}にた^{つぎ}たか^{つぎ}うこと^{つぎ}ができる^{つぎ}仕組^{つぎ}み^{つぎ}が^{つぎ}あり^{つぎ}ます。新型^{しん}コロナワクチン^{がた}は^{しん}この^{しん}仕組^{しん}み^{しん}を利用^りした^りもの^りです。
ワクチン^{しん}には^{しん}ウイルス^{しん}の^{しん}情報^{しん}が^{しん}はい^{しん}って^{しん}いま^{しん}す。その^{しん}情報^{しん}を使^{しん}って、私^{わたし}たちの^{わたし}体^{からだ}は^{わたし}最初^{さい}から^しウイルス^{さい}が^しど^しん^しな^し敵^しか^しを知^しって^しいて、
すぐ^{てき}にた^したか^しうこと^しができる^し仕組^しみ^しを^し準備^しする^しこと^しが^しでき^します。この^し仕組^しみ^しによ^しって、
ウイルス^{から}が体^{からだ}にはい^{しん}ってき^{しょうじょう}ても新型^{しん}コロナ^での症状^{しん}が出^しにく^しくなります。十分^{じゅう}な^{ぶん}仕組^しみ^しが^しでき^しる^しま^しで^しには、
2回^{かい}目の^めワクチン^うを受^{しゅう}けて^{かん}て^いから^ど1～2週^{しゅう}間^{かん}程^{てい}度^どか^かり^かります。

ウイルス^しは^し次第^{だい}に^す姿^がを^かえ^かる^かこと^かが^かあり^かます(変^{へん}異^いとい^います)が、^{へん}変^い異^いした^{しん}ウイルス^{しょうじょう}の^{しん}情報^{しん}が^しはい^しった^しワクチン^うを受^{しゅう}けて^{かん}て^いで、^し同^じじ^じょう^じに^した^した^しか^しう^し仕組^しみ^しを^し準備^しする^しこと^しが^しでき^します。




【5～11歳のみなさんへ】

新型^{しん}コロナワクチン^{がた}ってどんなワクチン？

新型^{しん}コロナワクチン^{がた}はいつ^う受けるの？

5歳以上のみなさんは、1回目のワクチンを受けた後、日にちを通常3週間（3週間を超えた場合はできる限り速やかに）あけて、2回目のワクチンを受けます。3回目以降は、前回ワクチンを受けた日から少なくとも3か月あけて、次のワクチンを受けます。1、2回目のワクチン接種では、起源株対応ワクチン（5～11歳用）またはオミクロン株（BA.4-5）対応ワクチン（5～11歳用）の接種を受けることができます。3回目以降のワクチン接種では、オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチン（5～11歳用）の接種を受けることができます*。

なお、オミクロン株（XBB.1.5）対応のワクチンにつきましては、「**コ**ミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ**【**コ**】**ミナティ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）**】**」をご確認ください。



*：2023年3月31日をもって、起源株対応ワクチン（5～11歳用）による追加免疫接種（3回目以降のワクチン接種）は終了しました。

【5～11歳のみなさんへ】 新型^{しん}コロナ^{がた}ワクチン^{がた}ってどんなワクチン？

新型^{しん}コロナ^{がた}ワクチン^{がた}を受けるとき、どんなこと^きに気^きをつければいいの？

受^うける前^{まえ}に気^きをつけること

体^{たい}温^{おん}が37.5℃以上あるときは、通^{つう}常^{じょう}ワクチン^を受^うけることはできません。

い^いつも^もと体^{からだ}の調^{ちょう}子^しが^がち^ちが^がう^うと思^{おも}ったら、お母^{かあ}さん、お父^{おと}さん、周^{まわ}りの大^{おとな}人^{ひと}の^{つた}人に^に伝^{つた}えま^ましょう。



受^うけた後^{あと}に守^{まも}ってほ^ほしいこと

しばらくはすわって
ゆ^まっくり待^{まち}つ



ワクチン^を受^うけた後^{あと}はす^すぐに^に帰^{かえ}らず^ずに、イ^いス^すに^にす^すわ^わって^てしば^ばらく^くは^はゆ^まっくり^ま待^{まち}ちま^ましょう。
何^{なに}か^き気^きにな^なるこ^こと^とが^があ^あれば、お母^{かあ}さん、お父^{おと}さん、周^{まわ}りの大^{おとな}人^{ひと}の^{つた}人に^に伝^{つた}えま^ましょう。

注^{ちゅう}射^{しゃ}した部^ぶ分^{ぶん}は
さ^さわ^わら^らない



さ^さわ^わつ^つたり^りこ^こす^すつ^つたり^りし^しないよ^よう^うに^にし^しま^ましょう。お^おふ^ふろ^ろには^はい^いつ^つても^もい^いい^いで^です^すが、ワ^わク^くチ^ちン^んを^を注^{ちゅう}射^{しゃ}した部^ぶ分^{ぶん}は^はゴ^ごシ^しゴ^ごシ^し洗^{あら}わ^わないよ^よう^うに^にし^しま^ましょう。

ゆ^まっくり過^すご^ごす



ワクチン^を受^うけた日^ひは^はい^いつ^つも^もど^どおり^りに^に過^すご^ごし^しても^も大^{だい}丈^{じょう}夫^ぶで^です^すが、は^はげ^げしい^い運^{うん}動^{どう}は^はや^やめ^めま^ましょう。
い^いつ^つも^もと体^{からだ}の調^{ちょう}子^しが^がち^ちが^がう^うと思^{おも}ったら、お母^{かあ}さん、お父^{おと}さん、周^{まわ}りの大^{おとな}人^{ひと}の^{つた}人に^に伝^{つた}えま^ましょう。

ワクチン^を受^うけた後^{あと}、手^て足^{あし}の先^{さき}が^がピ^ぴリ^りする、手^て足^{あし}に^に力^{ちから}が^がは^はい^いら^らない^いとい^いつ^つた^たこ^こと^とが^があ^あれば、お母^{かあ}さん、お父^{おと}さん、周^{まわ}りの大^{おとな}人^{ひと}の^{つた}人に^にす^すぐ^ぐに^に知^ちら^らせ^せるこ^こと^とが^が大^{だい}切^{せつ}です。

5ペ^ぺージ^じと6ペ^ぺージ^じにも^も気^きをつ^つけ^けて^てほ^ほしいこ^こと^とが^が書^かいて^てあ^あり^りま^ます。こ^この^のペ^ぺージ^じとあ^あわ^わせて^て読^よん^んで^でお^おき^きま^ましょう。

【5～11歳のみなさんへ】 ワクチンを受けた後に出るかもしれない症状

ワクチンを受けると時々、痛みやだるさや熱のような症状が出る場合があります。
また、重い症状が出ることもあります。

受けた後に出るかもしれない重い症状

どのくらいの人にこのような症状が出るかはわかりませんが、重い症状が出る
場合があります。重い症状は、ワクチンを受けた後すぐに出るものと、すぐには出ない
ものがあります。

● すぐに出るもの (アナフィラキシーといいます)

- ひふのかゆみ、赤み、赤いぶつぶつ など
- おなかの痛み、吐き気、気持ちが悪い など
- 目がみえにくい
- せき、のどのかゆみ、息がしにくい など
- ふらふらする、体に力がはまらない など

症状が出る場合、**受けた後30分以内が多い**といわれていて、**受けてすぐ**に出ることも
あります。注射した後はすぐには帰らずに、ワクチンを受けた病院などでしばらくゆっくり
しましょう。

● すぐには出ないもの (心筋炎、心膜炎といいます)

- むねがズキズキする・ドキドキする、手足や顔がぷっくりする、
体が重い・だるい、息がしにくい、ゼーゼーする、ハアハアする

【5～11歳のみなさんへ】 ワクチンを受けた後に出るかもしれない症状

受けた後に出るかもしれない症状

ワクチンを受けた人の20人に1人以上に、次のような症状が出るといわれています。

- ワクチンを注射した部分の痛み、赤み、はれ
- 頭が痛い
- げり(おなかがごろごろする)
- 体が痛い
- 体が重い・だるい、寒気がする(ゾクゾクする)、熱が出る

「ワクチンを注射した部分の痛み」が出る場合、
ワクチンを受けた日に痛みが出て、その痛みは2日間くらい続くことが多いといわれています。
そのほかの症状も、数日でよくなるといわれています。



5ページと6ページに書いてあるような症状が出たら、
すぐに周りの大人の人に知らせましょう。
ほかにも、体の調子に何か気になることがあったら、お母さん、
お父さん、周りの大人の人にすぐに知らせることが大切です。


生後6ヵ月～4歳のお子さまの保護者の方へ

接種回数とスケジュール

生後6ヵ月～4歳のお子さまは初回免疫として新型コロナワクチンを**3回接種する必要があります**。

1回目の接種後、通常3週間の間隔で2回目の接種を、その後少なくとも8週間経過した後、3回目の接種を受ける必要があります。1回目の接種から3週間、2回目の接種から8週間を超えた場合には、できる限り速やかに次回の接種を受けるようにしてください。4回目以降は、前回ワクチンを受けた日から少なくとも3ヵ月あけて、次回のワクチンを受けます。初回免疫(1、2、3回目)および追加免疫(4回目以降)のワクチン接種では、起源株対応ワクチン(6ヵ月～4歳用)*の接種を受けることができます。

なお、追加免疫接種(4回目以降のワクチン接種)につきましては、「**コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ[コミナティ筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)]**」をご確認ください。



※:起源株対応ワクチン(6ヵ月～4歳用)による追加免疫接種(4回目以降のワクチン接種)については承認されてはいますが、国および地方自治体による新型コロナウイルスワクチン接種事業の対象外です。

生後6ヵ月～4歳のお子さまの保護者の方へ

安全性(副反応)について

ワクチン接種後(特に、接種直後～数日間)はお子さまの体調に注意しましょう。
下記のような症状や、いつもと違う体調の変化や異常があれば、接種を受けた医療機関等の施設の医師、看護師またはかかりつけ医へ相談してください。

起こるかもしれない重い症状 (頻度不明)

● ショック、アナフィラキシー

【症状の発現状況、時期、持続期間など】

ワクチン接種直後から、時には5分以内、通常30分以内に以下の症状があらわれた場合、ショック、アナフィラキシーの疑いがあります。

- 皮膚症状:皮膚のかゆみ、じんま疹、紅斑、皮膚の発赤 など
- 消化器症状:腹痛、吐き気 など
- 視覚症状:視覚の異常
- 呼吸器症状:声のかすれ、くしゃみ、せき、のどのかゆみ、息苦しい など
- ショック症状:蒼白、意識混濁 など

生後6ヵ月～4歳のお子さまの保護者の方へ

本ワクチンの接種を受けた後しばらくの間は、接種を受けた医療機関等の施設でお待ちいただき、これらの症状が認められた場合には、**ただちに**、接種会場となる医療機関等の施設の医師、看護師等に伝えてください。

● 心筋炎、心膜炎

【症状の発現状況、時期、持続期間など】

ワクチン接種後に以下の症状があらわれた場合、心筋炎、心膜炎の疑いがあります。

- 症状**: 胸の痛み、動悸、むくみ、息苦しい、息切れ、呼吸が荒い、呼吸が速い

これらの症状が認められた場合には、**速やかに**医師の診察を受けてください。

起こるかもしれない体の症状 (接種を受けた方の5%以上に起こったもの)

生後6ヵ月～4歳のお子さまは、ワクチンを受けた後、次のような症状が出るといわれています。5～11歳のお子さまとは症状の訴え方が異なりますので、ご注意ください。

- 注射した部位の痛み、腫れ、発赤・紅斑
- 眠気、頭痛、イライラ
- 食欲衰退、下痢、嘔吐
- 筋肉痛
- 疲労、発熱、悪寒

【症状の発現状況、時期、持続期間など】

注射した部位の痛みの多くは接種当日にあらわれ、持続期間は約1日でした。

その他の症状の多くは接種翌日～5日ほどであらわれ、持続期間は約2日でした。

これらの症状は、通常、数日以内に治まります。なお、病気治療中の方で解熱消炎鎮痛剤などを使用される場合は、かかりつけ医・薬剤師に服用についてご相談ください。また、ひどい痛み・腫れ、高熱など重い症状と思われる場合は、医師の診察を受けてください。

【年齢共通】お子さまのワクチン接種に関して 保護者の方へお伝えしたいこと

新型コロナワクチンについて

新型コロナワクチン(コミナティ)は特例承認*されたものです。また、新型コロナウイルス感染症の予防や副反応について得られている情報は限られています。本ワクチンの接種を受ける前に、接種医等から本ワクチンの説明を受けてください。

※:特例承認とは外国で本ワクチンが既に対象となる疾患の予防に用いられていることを条件に、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれのある病気のまん延等を防止するための緊急の使用が必要な医薬品について、厚生労働大臣が、専門家の意見を聴いた上で通常の承認の要件を満たさない場合でも承認が可能となる制度です。

本ワクチンの接種事業について

- ☑ 本ワクチンの接種は国および地方自治体による新型コロナウイルスワクチン接種事業の一環として行われます。
- ☑ 本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。
- ☑ 本ワクチンは生後6か月以上11歳以下の方が対象です。
- ☑ 本ワクチンの接種に際し、接種対象者またその保護者は、予診の際に本ワクチンの有効性・安全性、本ワクチン接種後の副反応および予防接種健康被害救済制度について説明を受けた後に、接種の実施について文書(予診票)による同意が必要となります。
- ☑ 本ワクチンの接種会場となる医療機関等の施設、必要となる持ち物、その他の詳しい情報については、お住まいの各自治体からの案内をご確認ください。また、ご不明な点があれば、お住まいの各自治体へお問い合わせください。

[年齢共通] お子さまのワクチン接種に関して 保護者の方へお伝えしたいこと

本ワクチン接種にあたっての注意点

5～11歳のお子さまと、**生後6ヵ月～4歳**のお子さまでは、**接種回数やスケジュールなどが異なりますので、ご注意ください。**

(各年齢ごとの接種回数とスケジュールは3ページ、7ページに記載しておりますので、併せてご確認ください。)

		5～11歳	生後6ヵ月～4歳
初回免疫	接種回数	1・2回目	1・2・3回目
	接種するワクチン	<ul style="list-style-type: none"> 起源株対応ワクチン(5～11歳用) または オミクロン株(BA.4-5) 対応ワクチン(5～11歳用) 	<ul style="list-style-type: none"> 起源株対応ワクチン(6ヵ月～4歳用)
	接種スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 1回目の接種後、通常3週間の間隔で(3週間を超えた場合はできる限り速やかに)2回目の接種を受けてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 1回目の接種後、通常3週間の間隔で(3週間を超えた場合はできる限り速やかに)2回目の接種を受けてください。 2回目の接種後、少なくとも8週間経過した後(8週間を超えた場合はできる限り速やかに)3回目の接種を受けてください。
追加免疫	接種回数	3回目以降	4回目以降
	接種するワクチン	<ul style="list-style-type: none"> オミクロン株(BA.4-5) 対応ワクチン(5～11歳用) 	<ul style="list-style-type: none"> 起源株対応ワクチン(6ヵ月～4歳用)*
	接種スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 前回の接種から少なくとも3ヵ月経過した後に、次回の接種を受けることができます。 	<ul style="list-style-type: none"> 前回の接種から少なくとも3ヵ月経過した後に、次回の接種を受けることができます。

※：起源株対応ワクチン(6ヵ月～4歳用)による追加免疫接種(4回目以降のワクチン接種)については承認されてはいますが、国および地方自治体による新型コロナウイルスワクチン接種事業の対象外です。
なお、追加免疫接種(4回目以降のワクチン接種)につきましては、「コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ[コミナティ筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)]」をご確認ください。

- 定められた接種間隔を超えた場合には、できる限り速やかに次回の接種を受けてください。
- 原則として、1回目に接種したワクチンと同じワクチンを2回目も接種してください。生後6ヵ月～4歳の方は、同じワクチンを3回目も接種してください(例：1回目に起源株対応ワクチン(5～11歳用)を接種した場合は、2回目も起源株対応ワクチン(5～11歳用)を接種)。
- 1回の接種における有効成分の含量は、5～11歳のお子さまは12歳以上の方の3分の1、生後6ヵ月～4歳のお子さまは12歳以上の方の10分の1です。
- 過去に他社の新型コロナワクチンを接種した方が、追加免疫として本ワクチンを接種した際の有効性・安全性はわかっていません。

【年齢共通】お子さまのワクチン接種に関して 保護者の方へお伝えしたいこと

本ワクチンの接種が受けられないお子さま

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。

該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- ① 明らかに発熱している方
- ② 重い急性疾患にかかっている方
- ③ 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往歴のある方
- ④ 上記以外で、予防接種を受けることが不適當な状態にある方

本ワクチンの接種にあたって注意が必要となるお子さま

下記にあてはまる方は、本ワクチンの接種について注意が必要です。

該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- ① 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
- ② 過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ③ 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
- ④ 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た方
- ⑤ 過去にけいれんを起こしたことがある方
- ⑥ 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
- ⑦ 腎機能障害のある方
- ⑧ 肝機能障害のある方

生後6ヵ月未満の方に対する有効性・安全性はわかりません。

【年齢共通】お子さまのワクチン接種に関して 保護者の方へお伝えしたいこと

保護者の方のワクチン接種のご検討のお願い

- 新型コロナワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症予防効果が臨床試験で確認されています。
- ワクチン接種後においても、基本的な感染予防対策※を必要に応じて行うことを、お子さまへもお伝えください。

※：具体例は本資料の裏表紙に記載していますので、ご確認ください。

保護者の同意について

お子さまの本ワクチン接種に際しては、**保護者の方の同意・立ち会いが必要です。予診票に必要事項を記載のうえ、ワクチン接種に対する同意書へのサイン**をお願いします。

なお、本ワクチンと**他の定期接種のワクチンとの接種間隔**などについては**医師へご相談**ください。小児の予防接種記録は母子健康手帳で管理しているため、接種の際には**母子健康手帳の持参**をお願いします。

【年齢共通】お子さまのワクチン接種に関して 保護者の方へお伝えしたいこと

本ワクチン接種の前に気をつけること

下記の点へのご対応をお願いします。

- お子さまに基礎疾患があるなど本ワクチン接種についての疑問や不安があったら、接種医やかかりつけ医に納得がいくまで質問する
- 体温測定やその他、お子さまの体調に変化がないかどうか確認する
- アレルギー疾患や他の医薬品でアレルギー反応の経験がある、食物アレルギーがある場合は、「何」に対して「どのような」症状が出たのかを伝える
- お子さまが普段から注射針や痛みに対して不安感が強いかどうかを伝える
- お子さまが今回のワクチン接種に不安を覚えていたり緊張しているかどうかを伝える

立ち会いに際してのお願い

適宜、お子さまへ声掛けを行い、お子さまが注射針をみないようにするなど、不安や緊張を和らげるような対応をお願いします。

[年齢共通] お子さまのワクチン接種に関して 保護者の方へお伝えしたいこと

本ワクチン接種の後に気をつけること

本ワクチン接種後(特に、接種直後～数日間)はお子さまの体調に変化がないか注意してください。5～9ページや、下記に示す症状や訴えがないか、お子さまの様子を観察をお願いします。

本ワクチン接種直後の注意点

- 血管迷走神経反射による失神があらわれる場合があります。以前に、採血やワクチン接種の時に気分が悪くなったことのあるお子さまは要注意です。冷や汗をかく、落ち着きがなくなる、ムカムカする、寒気がする、顔色が悪くなる、目の前が真っ白または真っ黒になる、聞こえづらくなる、意識が朦朧とする・なくなるなどの症状が出ていないか、お子さまの様子を観察をお願いします。症状が認められた場合には、慌てずに、頭などを打たないように体を支え、**お子さまの体を横にして**安静にしてください。
- 「アナフィラキシー」は、**ワクチン接種直後から、時には5分以内、通常30分以内**にあらわれることがあります。何かあった場合にすぐに対応できるよう、医療機関等の施設内にお子さまと一緒にいて、お子さまの様子を観察をお願いします。
- 「アナフィラキシー」の可能性のある症状(8ページ参照)が認められる、またはお子さまからそのような症状の訴えがあった場合は、**速やかに医師や看護師等に伝えて診察を受けて**ください。

本ワクチン接種を受けた後の注意点

- 本ワクチン接種後に以下の症状があらわれた場合、心筋炎、心膜炎の疑いがあります。

心筋炎・心膜炎の症状

胸の痛み、動悸、むくみ、倦怠感、息苦しい、息切れ、呼吸が荒い、呼吸が速い

これらの症状がお子さまに認められる、またはお子さまからこれらの症状の訴えがあった場合には、**速やかに医師の診察を受けて**ください。

- 本ワクチン接種後に以下の症状があらわれた場合、ギラン・バレー症候群の疑いがあります。

ギラン・バレー症候群の症状

歩行時につまずく、階段を昇れない、手足(特に足)に力が入らない、物がつかみにくい、手足がしびれる、手足の感覚が鈍くなる、顔の筋肉が麻痺する、食べ物や飲み込みにくい、呼吸が苦しいなど

これらの症状がお子さまに認められる、またはお子さまからこれらの症状の訴えがあった場合には、**ただちに医師等にご相談**ください。

本ワクチン接種を受けた後の過ごし方

- 本ワクチン接種後も基本的な感染予防対策(マスク着用、密集、密接および密閉の回避、手洗いや咳エチケット等)を必要に応じて行ってください。ただし、過度な対策がかえってお子さまの心身の健康を損ねることがないように配慮してください。
- 注射した部位は清潔に保つようにしましょう。
- 接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部位はこすらないようにしましょう。ただし、ワクチンを接種した当日を含め、ワクチン接種後に体調が悪い時は、入浴を控えることも検討してください。
- 接種当日の激しい運動は控えましょう。

よくある質問

ワクチンの効果と仕組み

Q1. ワクチンの効果はどのくらいありますか？

A1

本ワクチンは、5～11歳の小児において、起源株・オミクロン株(BA.4-5)に対し、中和抗体価の上昇や発症予防効果が確認されています。

また、生後6ヵ月～4歳の乳幼児においても、起源株に対して、中和抗体価の上昇や発症予防効果が確認されています。

本ワクチンの臨床試験は継続中であり、最新情報は、厚生労働省新型コロナワクチンQ&A(<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>)や日本小児科学会のホームページ(<https://www.jpeds.or.jp/>)をご確認ください。

Q2. オミクロン株対応ワクチンとは何ですか？

A2

本資料にて紹介しているオミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン(5～11歳用)は、ヒトへの感染に関わるタンパク質のメッセンジャーRNA(mRNA)が2種類含まれており、起源株・オミクロン株(BA.4-5)に対する一定の発症予防効果が確認されています。

Q3. なぜ生後6ヵ月～4歳の初回免疫では、3回の接種が必要なのですか？

A3

生後6ヵ月～4歳の乳幼児に対する本ワクチンの3回目の接種から1ヵ月後の新型コロナウイルスに対する中和抗体価は、16～25歳へのワクチン接種と同様という試験結果より、合計3回接種の用法で薬事承認がなされています。

中和抗体: ウイルスの感染力または毒素の活性を中和できる抗体

よくある質問

ワクチンの安全性と副反応

Q4. ウイルスのタンパク質を作る基になる遺伝情報を体に投与すると、将来の身体への異変は心配ありませんか？

A4

メッセンジャーRNA (mRNA) は、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていきます。また、mRNAは、人の遺伝情報 (DNA) に組み込まれるものではありません。体の中で、DNAからmRNAが作られる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行で、逆にmRNAからはDNAは作られません。こうしたことから、mRNAを注射することで、その情報が長期に残ったり、遺伝情報に取り込まれることはないと考えられています。

Q5. ワクチンの副反応の心配はありますか？

A5

ワクチンの接種によって、副反応が起きることがあります。気になる症状、いつもと違う体調の変化が認められた場合には、速やかに医師等にご相談ください。万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種健康被害救済制度がございますので、お住まいの各自治体にご相談ください。

Q6. ワクチン接種を受ける前や受けた後に気をつけることは？

A6

接種を受ける前

原則としてワクチン接種は体調が良い時に受けましょう。いつもと様子や体調が違う、何となく調子が悪いという時、また、医薬品でアレルギー反応の経験のある方、食物アレルギーやアレルギー疾患のある方、予防接種そのものに対して緊張する方、注射針や痛みに対して不安がある方は必ず医師に相談しましょう。

接種を受けた後

まれにワクチン接種に対する緊張や痛みをきっかけに気を失う(失神する)ことがあります。ワクチン接種後は背もたれのある椅子にしばらく座るなどして休みましょう。特に緊張の強いお子さま、以前に採血やワクチン接種の際に気分が悪くなったことのあるお子さまは、事前に接種医にご相談ください。

また、ワクチンの接種により**ショック**や**アナフィラキシー**などの重いアレルギー反応が起きることがあります。他の医薬品でアレルギー反応の経験のある方や、食物アレルギーやアレルギー疾患のある方は接種に際して慎重な観察が必要です。医師に相談の上、しばらくの間は接種を受けた医療機関等の施設内にいるようにしましょう。医療機関等の施設内にいることですぐに対応できます。

なお、接種後に**心筋炎**や**心膜炎**があらわれることがあります。心筋炎、心膜炎が疑われる症状(胸の痛み、動悸、むくみ、息苦しい、息切れ、呼吸が荒い、呼吸が速い)が認められる場合には、速やかに医師の診察を受けてください。

よくある質問

Q7. 新型コロナウイルスmRNAワクチン接種後に報告されているギラン・バレー症候群では、どのような症状が認められますか？ また、症状を認めた場合は、どうすればいいですか？

A7

ギラン・バレー症候群では、歩行時につまずく、階段を昇れない、手足（特に足）に力が入らない、物がつかみにくい、手足がしびれる、手足の感覚が鈍くなる、顔の筋肉が麻痺する、食べ物が飲み込みにくい、呼吸が苦しいなどの症状があらわれます。

ギラン・バレー症候群は、初期には軽症と考えられても急速に悪化することがあります。ギラン・バレー症候群が疑われる症状が認められた場合には、早い段階で医師等に相談するようにしてください。その際、本ワクチンを接種したことやいつ接種したのかなどを伝えるようにしてください。

Q8. ワクチン接種後に発熱しました。どのように対応したらいいのでしょうか？

A8

ワクチン接種後の発熱に対しては、日本小児科学会より、成人の場合と同様に発熱の程度に応じて解熱消炎鎮痛剤を使用できることが示されています。ただし、小児には推奨されない解熱消炎鎮痛剤もありますので注意してください。ご不安な場合は都道府県の相談窓口や、かかりつけ医にご相談ください。

ワクチンの接種対象

Q9. 本ワクチンの追加免疫の接種はどのような人が対象ですか？

A9

追加免疫の接種の対象者や実施時期については、各自治体からの案内をご確認ください。

5～11歳のお子さま

追加免疫のためのワクチン接種では、オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン(5～11歳用)の接種を受けることができます(2023年3月31日をもって、起源株対応ワクチン(5～11歳用)による追加免疫接種は終了しました)。

2回目の接種から少なくとも3ヵ月経過した後に、追加免疫としての3回目の接種を受けることができます。以降の追加免疫のためのワクチン接種についても、前回の接種から少なくとも3ヵ月経過した後に、次の接種を受けることができます。

生後6ヵ月～4歳のお子さま

起源株対応ワクチン(6ヵ月～4歳用)による追加免疫接種(4回目以降のワクチン接種)については承認されていますが、国および地方自治体による新型コロナウイルスワクチン接種事業の対象外です。

なお、追加免疫接種(4回目以降のワクチン接種)につきましては、「コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ[コミナティ筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)]」をご確認ください。

よくある質問

Q10. 過去に他のワクチンや医薬品、食品、化粧品に対してアレルギー反応があったのですが、本ワクチンを接種しても問題ないですか？

A10 予診票にアレルギーの情報(何に対してどのような症状が出たのか)をできる限り記載の上、事前にかかりつけ医に相談するか、もしくは接種当日、医師にご相談ください。

Q11. 生後6ヵ月未満でも本ワクチンを接種できますか？

A11 本ワクチンの接種対象は生後6ヵ月以上の方です。なお、生後6ヵ月未満の方に対する有効性・安全性はわかりません。

Q12. 過去に熱性けいれんを起こしたことがあったのですが、本ワクチンを接種しても問題ないですか？

A12 本ワクチンは、熱性けいれんを起こしたことのある方は接種要注意者になります。事前にかかりつけ医に相談するか、もしくは接種当日、医師にご相談ください。

接種を受ける方法

Q13. 次回のワクチン接種前に誕生日を迎えました。どのワクチンを接種すればいいのでしょうか？

A13 **5~11歳** のお子さま

1回目の接種時に11歳であったお子さまは、2回目の接種までに12歳になった場合であっても、2回目も5~11歳用のワクチンを接種します。
3回目以降の接種では、接種時の年齢に基づき、接種するワクチンが決まります。接種前に12歳になった場合は、12歳以上用のワクチンを接種します。

生後6ヵ月~4歳 のお子さま

1回目の接種時に4歳であったお子さまは、合計3回の接種までに5歳になった場合でも、2回目、3回目も生後6ヵ月~4歳用のワクチンを接種します。
4回目以降の接種では、接種時の年齢に基づき、接種するワクチンが決まります。接種前に5歳になった場合は、5~11歳用のワクチンを接種します。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(18版)より抜粋(<https://www.mhlw.go.jp/content/001025483.pdf>)
こちらの情報は更新される可能性があります。
23ページに記載の二次元コードより最新の内容をご確認ください。

よくある質問

Q14. 本ワクチン接種の1回目と2回目の間隔が、3週間以上空いてしまった場合は、どのようにすればいいですか？

A14 できる限り速やかに2回目の接種を受けてください。

Q15. 生後6ヵ月～4歳で、本ワクチン接種の2回目と3回目の間隔が、8週間以上空いてしまった場合は、どのようにすればいいですか？

A15 できる限り速やかに3回目の接種を受けてください。

Q16. 生後6ヵ月～4歳で、2回目接種から8週間経過する前に3回目の接種を受けてもいいですか？

A16 生後6ヵ月～4歳のお子さまは、2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に、3回目の接種を受けてください。

Q17. 1回目と2回目以降で異なる新型コロナワクチンを接種しても問題ないですか？

A17 1回目と2回目以降の接種では、原則として同一のワクチンを接種する必要があります。ただし、以下の要件を満たす場合に限り、異なるワクチンを接種することは可能です。

- 1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたこと等により、医師が医学的見地から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難であると判断した場合
- 国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の転居等により、1回目と2回目で同一のワクチンを接種することが困難な場合

1回目と異なるワクチンを2回目以降に接種する場合、1回目と2回目以降の接種の間隔は、諸外国の対応状況等を踏まえ、27日以上の間隔をおくこととされています。ご不安な場合は、事前に都道府県の相談窓口やかかりつけ医などにご相談ください。

よくある質問

Q18. 新型コロナワクチンと、他のワクチンの接種を同時に受けることはできますか？

A18

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。インフルエンザワクチン以外のワクチンとの同時接種はできません。互いに、片方のワクチン接種を受けてから2週間後に接種を受けることができます。特にお子さまは、定期接種で他のワクチン接種を受けることもありますのでご注意ください。なお、創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものに関しては、例外として2週間を空けずに接種することが可能です。

その他

Q19. ワクチン接種時に必要なものはありますか？

A19

お子さまのワクチン接種では、原則、保護者の同伴が必要となります。また、お子さまの接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、接種当日は可能な限り、母子健康手帳の持参をお願いします。特に小さいお子さまは不安から怖がって接種を拒んだり、泣いたりすることが予想されます。可能であれば気を紛らわすようなお気に入りのおもちゃや絵本などの持参をお願いします。

Q20. 新型コロナワクチンの接種を受ければ、感染予防対策はしなくていいですか？

A20

本ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症を予防するものです。本ワクチン接種後も基本的な感染予防対策(マスク着用、密集、密接および密閉の回避、手洗いや咳エチケット等)を必要に応じて行なってください。ただし、過度な対策がかえってお子さまの心身の健康を損ねることがないように配慮してください。厚生労働省のマスク着用の考え方(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html)では、就学前のお子さまについて、2歳未満のお子さまのマスク着用は推奨されていません。2歳以上の就学前のお子さまについても、マスクの着用は一律には求められておりません。マスクを着用する場合は、お子さまの体調に十分注意した上で着用してください。

よくある質問

Q21. 小児や乳幼児で、ワクチンを接種する部位は変わりますか？

A21 1歳未満のお子さまは、太もも外側に接種します。1～2歳のお子さまは、太もも外側もしくは肩(三角筋)に接種します。3歳以上のお子さまは、肩(三角筋)に接種します。ただし、明らかに筋肉量が少ない場合などは、年齢に関係なく太もも外側に接種することもあります。

Q22. 新型コロナウイルス感染症や新型コロナワクチンの接種に関するお知らせを確認するには、どのようにすればいいですか？

A22 厚生労働省のホームページ(<https://www.mhlw.go.jp/>)に新型コロナウイルスやワクチンについての情報が公表されています。

Q23. 接種したワクチンの有効期限はどのように確認できますか？

A23 本ワクチンの有効期限は、「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト」にて公開しています。下記の二次元コードよりアクセスし、接種券に記載されている「製造番号」(=ロットNo)ごとの有効期限をご参照ください。



起源株対応ワクチン
(5～11歳用)



オミクロン株(BA.4-5)
対応ワクチン(5～11歳用)



起源株対応ワクチン
(6ヵ月～4歳用)

本ワクチンに関するさらなる情報について

ワクチン接種の考え方について

新型コロナウイルスは変異を繰り返しており、それに伴い重症化率やワクチンの予防効果などにも変化が生じています。小児における最新情報は、厚生労働省新型コロナワクチンQ&Aや日本小児科学会のホームページをご確認ください。

厚生労働省新型コロナワクチンQ&A:<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>
日本小児科学会:<https://www.jpeds.or.jp/>

情報提供サイトのご案内

本ワクチンに関する情報について、「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト」にて公開しております。

同サイトでは、12歳以上の方に関する情報をまとめた「コミナティを接種される方とそのご家族へ」もご覧いただくことができます。



左の二次元コードもしくは
下記URLよりアクセスし、ご参照ください。

<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp>

起源株対応ワクチンおよびオミクロン株(BA.4-5) 対応ワクチンに関する情報について(本資材)



[https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/files/
5_11_コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ.pdf](https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/files/5_11_コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ.pdf)

※:起源株対応ワクチンおよびオミクロン株(BA.4-5)対応ワクチンについての情報が記載されています

オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチンに関する情報について



[https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/files/
5_11_omi_xbb15_コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ.pdf](https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/files/5_11_omi_xbb15_コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ.pdf)

※:オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチンについての情報が記載されています

ワクチンを受けた後も守ってほしいこと



新型コロナワクチンを受けることで、ウイルスが体にはいってきても

絶対にウイルスが体にはいってこなくなるというわけではありません。

絶対にウイルスが体にはいってこなくなるというわけではありません。

ワクチンを受けた後も、必要に応じて、以下の点を心がけながら過ごすことが大切です。

3つの密(みつ)に注意

人と人との距離が近い(みっせつ)



人がたくさんいる場所
(みっしゅう)



出入り口や窓が
閉まった場所
(みっぺい)

新型コロナにかからない・うつさないためにできること

手洗い・うがい



マスクを着ける



体調が悪いときは
外出・登校しない

BIONTECH

Pfizer

製造販売元：ファイザー株式会社

新型コロナワクチン コミナティは、ビオンテック独自のmRNA技術を基にビオンテックとファイザーにより共同開発された修飾ヌクレオシドmRNAワクチンです。