

乳がん治療薬

イブランス錠25mg・125mgを
服用される患者さんにご家族の皆様へ

かんしつせいはいしっかん
本剤の服用中に「間質性肺疾患」があらわれ、死亡に至った症例が報告されています。以下のような症状があらわれた場合は、速やかに医師又は治療を受けている病院や薬局に相談してください。

間質性肺疾患の主な症状

- 階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる
- から咳(痰のでない咳)
- 発熱 など



重症化を防ぐためには、早期発見がとても大切です。

次に該当する方は、慎重に治療を進める必要があります。本剤による治療を始める前に医師又は薬剤師に伝えてください。

- 間質性肺疾患がある人、又は過去に間質性肺疾患になったことがある人

本剤を服用される患者さんの治療をサポートするウェブサイトをご参照ください。



「イブランス®.jp」
<https://ibrance.jp>

本剤に関する患者さんにご家族の皆様向けとして「患者向医薬品ガイド」が下記に掲載されております。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ
<https://www.pmda.go.jp/index.html>

患者向医薬品ガイド
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/guide-for-patients/0001.html>

緊急連絡先

医 療 機 関 名	
科 名	
担 当 医 名	
電 話 番 号	