

# メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「VTRS」 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「VTRS」 をお飲みになるこどもの患者さんと保護者の方へ

このお薬は<sup>けっとう ち</sup>血糖値を下げる<sup>とうにようびょうちりょうやく</sup>糖尿病治療薬です

## このお薬をのむときに気をつけること

- お医者さんまたは薬剤師さんの指示どおりにのみましょう
  - ◇このお薬は指示どおりにのみ続けることが大切です。
  - ◇のみ忘れた場合は、次のお薬をのむ時間に1回分をのみましょう。決して2回分を一度にのんではいけません。
- <sup>ていけっとう ちゅうい</sup>低血糖に注意しましょう
  - ◇急にひどくお腹がすいた感じや力のぬけた感じがしたり、気持ちが悪くなったり、冷や汗、手足のふるえなどがおこったりしたら、血糖値が低くなりすぎているので、すぐに砂糖やブドウ糖をとりましょう。  
砂糖とブドウ糖のどちらをとったらよいかは、あらかじめお医者さんまたは薬剤師さんに聞きましょう。
  - ◇高いところにいるときや、自転車に乗っているときに低血糖になると、事故につながる危険があります。
- <sup>にゅうさん</sup>乳酸アシドーシスをおこさないように注意しましょう
  - ◇熱や下痢、嘔吐、食欲がなく食事がとれない状態（シックデイ）のときは、このお薬をのむのをいったんやめて、お医者さんまたは薬剤師さんに相談しましょう。
  - ◇<sup>だっすいしょうじょう</sup>脱水症状がおこらないよう、<sup>てんきど</sup>適度に水分をとりましょう。

## <保護者の方へ>

### ◇低血糖について

- ・おもて面のような症状がみられたり、「ボーッとしている、うとうとしている、ろれつが回らない」などの様子が気づいたときは、すぐに砂糖やブドウ糖をとらせてください。
- ・ $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬（アカルボース、ボグリボース、ミグリトール）と呼ばれるお薬をのんでいる場合には、砂糖ではなく必ずブドウ糖をとる必要があります。あらかじめ医師または薬剤師に確認してください。
- ・砂糖やブドウ糖をとれば通常5分以内に症状は改善しますが、よくなるときの「意識がなくなる、けいれんをおこす」などの場合はすぐに医師にご相談ください。

### ◇乳酸アシドーシスについて

- ・乳酸アシドーシスは、まれにおこる重大な副作用です。
- ・吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状、けん怠感、筋肉痛、過呼吸（深く大きな呼吸）などの症状があらわれたら、すぐに医師にご相談ください。
- ・腎臓、肝臓、心臓、肺に病気のある方、透析を受けている方、感染症にかかっている方、乳酸アシドーシスをおこしたことがある方は医師に申し出てください。
- ・脱水状態のときには、このお薬をのませないでください。また、脱水をおこさないように水分を適度にとらせてください。
- ・発熱、下痢、嘔吐、食欲がなく食事がとれない状態（シックデイ）のときには、脱水により乳酸アシドーシスをおこしやすくなります。このお薬をいったんやめて、医師または薬剤師にご相談ください。
- ・食事をとれなかったときののみ方については、医師または薬剤師にご相談ください。

### ◇その他の注意

- ・このお薬をのんでいる間は定期的な血糖値・尿糖検査、腎機能、肝機能の検査が行われます。
- ・手術やヨード造影剤を使用する検査や治療を受けるとき、他のお薬を処方してもらったときや薬局で買うときは、このお薬をのんでいることを、医師または薬剤師にお伝えください。

この他にも気になる症状があらわれた場合には、  
医師または薬剤師にご相談ください。



**VIATRIS**

ヴィアトリス製薬株式会社

RMP

わかる  
ポイント

読みやすさを追求した書体