



ソリクア®配合注ソロスター®をご使用の際は、投与量及び投与方法に注意し、患者さんへ使い方をご指導ください。

ソリクア®配合注ソロスター®は、

持効型溶解インスリン製剤[インスリン グラルギン(ランタス®注)]と
GLP-1受容体作動薬[リキシセナチド(リクスミア®皮下注)]を
1単位:1μgの比率で**1本に配合した注射剤**です。



持効型溶解
インスリン製剤

インスリン
グラルギン
100単位/mL



GLP-1受容体
作動薬

リキシセナチド

ソリクア®配合注
ソロスター®

インスリン グラルギン
100単位/mL

リキシセナチド

1

ドーズ

=

1

単位

+

1

μg

1日
最大用量

20

ドーズ

=

20

単位

+

20

μg

- 投与前に取扱説明書をご確認ください。
- 基礎インスリン製剤やGLP-1受容体作動薬からの切替え時における投与量の間違い、他の注射用糖尿病治療薬との取り違い等により低血糖、高血糖、胃腸障害等の副作用が生じる可能性があります。
- 基礎インスリン製剤やGLP-1受容体作動薬からの切替えの際には、添付文書の「用法及び用量」、「用法及び用量に関連する注意」、及び「重要な基本的注意」等をご確認の上、前治療で使用していたこれらの製剤の投与を中止してください。
- 毎回投与前に、必ず薬剤名を確認するよう、患者さんへのご指導をお願いいたします。

■ サポートのご案内

サノフィ 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル

操作方法を24時間365日サポート

オペチコール24
0120-49-7010
ヨウ ナレ 線

操作方法に関するお問い合わせに、24時間、お電話で対応しています。