

ソリクア®配合注ソロスター®を  
はじめてお使いになる患者さんへ

医薬品リスク管理計画  
(RMP)

本資料は医薬品リスク管理計画に  
基づき作成された資料です

ソリクア®配合注ソロスター®は、  
持効型溶解インスリン製剤(ランタス®注)と  
GLP-1受容体作動薬(リクスミア®皮下注)の有効成分を  
1本に配合した注射剤です。



持効型溶解  
インスリン製剤  
ランタス®注



■  
■



GLP-1受容体  
作動薬

リクスミア®  
皮下注

ソリクア®配合注ソロスター®    ランタス®注    リクスミア®皮下注  
① ドーズ    =    ① 単位    +    ① μg



医師や薬剤師に指示された用法・用量をきちんと守って正しく使いましょう。

▶ 投与のタイミング



朝食前  
1時間以内

▶ 投与量



1日1回

ドーズです


▶ 中止するお薬

▶ 継続するお薬



他の糖尿病注射剤とのお取り間違えにご注意ください。

## ソリクア®配合注ソロスター®の特徴



ペン本体は **グレー**、注入ボタンは **マゼンタ** です。

使用する前に必ず、  
「ソリクア®配合注ソロスター®」であることを確認しましょう。



使い方は「取扱説明書」を  
ご参照ください。

サノフィ 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル

操作方法を24時間365日サポート

**オペチコール24**  
☎ 0120-49-7010  
ヨクナレ糖

デバイスの操作方法に関するご質問に、  
専任のスタッフが24時間365日、いつでもサポートします。  
わからないことや困ったことがある場合は、ご連絡ください。

治療についてのお問い合わせ先  
(医療機関名等記入欄)