

患者又は保護者(代諾者)さまへのお願い

- このカードを常に携帯してください。
- 医師、歯科医師、薬剤師には、本剤を服用していることを必ずお伝えください。
- 本剤と市販薬を含む他の医薬品や食品・サプリメントと併用したときに血中濃度が上昇し、不整脈(動悸、めまい、ふらつき等)等の副作用のリスクが高くなります。このようなときには、ただちに担当医師、薬剤師に相談してください。

2026年6月作成

サデルガ[®]カプセル

エリグルスタット酒石酸塩

RMP(小児)

Cerdelga[®]

患者又は保護者(代諾者)さまへ

サデルガカプセルを処方されている医療機関以外を受診される場合、または薬局でお薬を購入する場合には、必ずこのカードを提示してください。

識別番号	
CYP2D6 表現型	☐ EM ☐ IM ☐ PM ☐ URM ☐ 判別不能
体重	☐ 50kg以上 ☐ 25kg以上50kg未満 ☐ 15kg以上25kg未満
投与量	☐ 100mg×2回/日 ☐ 100mg×1回/日 ☐ 50mg×2回/日 ☐ 50mg×1回/日 ☐ 25mg×1回/日
病院名 / 診療科	病院 科
担当医師名	
担当医師連絡先	

上記欄につきましては、医療機関でご記入後、患者さまにお渡してください。

サノフィ株式会社

PV.CERD.RMP.26.017

医師・歯科医師・薬剤師の先生方へ

- 本患者さまは、サデルガカプセルを服用しています。
- CYP2D6の表現型、肝機能障害の程度、CYP2D6又はCYP3A阻害作用を有する薬剤との併用状況によっては、本剤の血中濃度が高値となるおそれがあります。
- 本患者さまについて、これらの情報及び最新の「併用禁忌」、「併用注意」の薬剤を確認の上、適正な処方をお願いします。
- 最新の「併用禁忌」、「併用注意」の薬剤につきましては、電子化された添付文書等でご確認ください。