

医薬品リスク管理計画  
(RMP)

本資料は医薬品リスク管理計画に  
基づき作成された資料です



カプレルサ錠を服用される患者さんへ

お問い合わせ先

サノフィ株式会社

くすり相談室

月～金 9:00～17:00 (祝日・会社休日を除く)

〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

フリーダイヤル 0120-109-905



# カプレルサの主な副作用

カプレルサを服用すると、  
次のような副作用が高い頻度で認められています

副作用の種類	頻度
皮膚症状※	87.8%
下痢	48.2%
高血圧	28.6%
悪心	24.1%
疲労	20.0%

国内及び海外の臨床試験における甲状腺髄様がん患者245例の集計結果  
※発疹、ざ瘡（ニキビ）、皮膚乾燥、皮膚炎、そう痒症など

副作用でつらいと感じたときは、  
無理せず早めに担当医や看護師に連絡しましょう

特に注意が必要な副作用として、かんしつせいはいしっかん間質性肺疾患、心電図QT間隔延長、心臓障害、高血圧、  
高血圧クリーゼ、下痢、眼障害、皮膚症状、動脈解離などがあります。

# 特に注意が必要な副作用①

かんしつせいはいしっかん  
【間質性肺疾患】

## 主な症状

息切れ、呼吸困難、せき、発熱 など

間質性肺疾患は早期発見・早期治療がとても重要です。上記の症状がある場合は、すぐに担当医に連絡してください。

治療では、酸素補給やステロイドの投与などが行われます。



# 特に注意が必要な副作用②

## 【心電図QT間隔延長\*<sup>1</sup>】

### 【心臓障害】

#### 主な症状

不整脈、めまい、ふらつき、  
胸部不快感、息切れ、呼吸困難、  
全身倦怠感、下腿浮腫<sup>けんたいふしゅ</sup> など



## 【高血圧】

### 【高血圧クリーゼ\*<sup>2</sup>】

#### 主な症状

血圧上昇 など



上記の症状がある場合は、すぐに担当医に連絡してください。  
治療では、降圧剤の投与などが行われます。

\*1 心電図QT間隔延長：心電図上のQT時間が延長すること

\*2 高血圧クリーゼ：著しい高血圧により生命が危険にさらされ、早急な降圧療法が必要な病態の総称

## 特に注意が必要な副作用③

### げり 【下痢】

#### 主な症状

排便回数の増加、腹痛、軟便、水様便 など

重篤じゅうとくな不整脈を引き起こすおそれがあるので、のどが渇く、体がだるい、脱力感、めまい、皮膚の乾燥などの脱水を伴う重度の下痢がみられた場合には、すぐに担当医に連絡してください。治療が必要な場合、補液や下痢止めの投与などが行われます。



### 【眼障害】

#### 主な症状

霧がかかったように見える、かすむ、物の形が見えにくい など



上記の症状がある場合は、すぐに担当医に連絡してください。

# 特に注意が必要な副作用④

## ひふ 【皮膚症状】

### 主な症状

ほっしん  
発疹、皮膚乾燥、ざ瘡<sup>\*1</sup>、皮膚の  
赤みやしびれ、光線過敏症<sup>\*2</sup> など

日光のあたる部分に発疹や水ぶくれができる、皮膚の色素沈着、ニキビのような発疹、吹出もの、体が赤くなる、顔が赤くなる、皮膚の潰瘍<sup>かいよう</sup>などの重度の皮膚症状がみられた場合には、すぐに担当医に連絡してください。

治療では、ステロイドなどが使用されます。光線過敏症の予防のため、日光を遮る衣服を着用する、あるいは日焼け止めを使用するなど、直接、日光を浴びないようにしてください。

\*1 ざ瘡：ニキビ

\*2 光線過敏症：日光などの光線にあたることによって発生・悪化する皮膚疾患の総称



上記の症状がある場合は、すぐに担当医に連絡してください。

# 特に注意が必要な副作用⑤

## 【動脈解離】

### 主な症状

激しい胸の痛み、激しい背中  
の痛み、激しい腹痛 など

上記の症状がある場合は、すぐに担当医に  
連絡してください。



## カプレルサ服用の注意点

副作用でつらいときは、無理せず担当医や  
看護師に連絡しましょう

他の医療機関を受診する場合や、薬局で薬を購入する場合は、カプレルサを服用していることを医師や薬剤師に伝えましょう。

カプレルサの服用中も定期的に通院し、血液検査や画像検査でがんの状態を確認する必要があります。





医療機関名

医師名

連絡先等

製造販売

**サノフィ株式会社**

〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

PV.CAPR.RMP.24.029

2024年5月改訂