

医療機関名	
担当医師名	
連絡先	

### 副作用の確認

- 目の見え方に問題はないですか？
- 手足の爪や皮ふに問題はないですか？
- 口内炎はできていませんか？
- 下痢はないですか？

## 医薬品リスク管理計画 (RMP)

本資料はRMPの一環として位置付けられた資料です  
(その他適正使用情報を含む)

# バルバーサ®を服用する 患者さんにご家族の方へ

## 治療中の注意事項

- バルバーサ®以外のお薬・サプリを服用する必要がある場合は、担当医にお伝えください。
- 男性と妊娠する可能性のある女性は、最後の服用から1カ月経つまで適切な避妊を行ってください。

## もくじ

- バルバーサ®とは? .....4
- バルバーサ®の服用方法 .....6
- 服用時の注意点 .....7
- バルバーサ®の副作用 .....8
  - 目にあらわれる副作用への対策 **RMP** .....10
  - アムスラーグリッド検査 **RMP** .....12
  - 高リン血症への対策 **RMP** .....14
  - 爪にあらわれる副作用への対策 **RMP** .....16
  - 皮ふにあらわれる副作用への対策 **RMP** .....18
  - 口にあらわれる副作用への対策 .....20
- Q&A .....22


本資料は、医薬品リスク管理計画に基づく内容を含む資料であり、追加のリスク最小化活動に基づく内容に該当する箇所にマークを付与しています。

# バルバーサ®とは？


ステージ4の患者さんが、  
薬物治療で効果がみられなかった場合に、  
バルバーサ®の対象になります。

## ステージ4

### 筋層浸潤性がん




### 転移性がん



バルバーサ®は、遺伝子検査によって<sup>エフジーエフアール</sup>FGFR遺伝子に異常の  
みられた患者さんに使用される分子標的薬です。

がん細胞にFGFR遺伝子異常があると、  
がんが増殖していきます。

バルバーサ®はFGFRに作用して  
がん細胞の増殖を抑える分子標的薬です。



# バルバーサ®の 服用方法

## 服用方法



担当医に指示された  
用量と時間を守って  
**1日1回**服用してください。



錠剤は**噛まずに**  
飲み込んでください。

バルバーサ®は、1日1回、  
8mg（1錠4mg×2錠）を服用します。  
なお、患者さんの状態に合わせて、  
服用量は変更されることがあります。

# 服用時の注意点

バルバーサ®は錠剤のお薬です。  
副作用の状況などから、  
担当医が服用量を決めますので、  
錠数を間違えないように注意しましょう。

1日1回



服用量は途中で変更されることがあります。  
担当医の指示した服用量か、しっかり確認してから服用  
しましょう。

必ず包装(PTPシート)から取り出して服用してください。

# バルバーサ<sup>®</sup>の 副作用

## 目にあられる副作用

→10ページ

視力の低下、ドライアイ(目の乾燥)などがみられます。定期的なチェックや、日常生活における対策によって、症状の悪化を防ぐことが大事です。



## 高リン血症

→14ページ

定期的に血液検査を行うことで状態を確認します。血液検査の結果によっては、薬物療法や食事療法を行うことがあります。



なにか些細な変化でも、気になることがあれば担当医にご相談ください。

## 爪・皮ふにあられる副作用

→16ページ

爪がはがれたり、爪の色が変わったり、手足が赤くはれたりします。



## その他の副作用

→20ページ

口内炎や口の乾燥、下痢などがみられることがあります。日常生活における対策を行い、お薬が処方されることもあります。



# 目にあられる副作用 への対策

## 定期的なチェック


アムスラーグリッド検査  
について→12ページ

バルバーサ®による治療中は、網膜はく離と角膜障害が起こっていないか調べるために、定期的なチェック(目安:3週間に1回)が必要です。

## よくあられる症状

これらの症状があれば、  
担当医に連絡してください。

- 目の乾燥
- 見えにくい
- かすむ
- ゆがんで見える




## 日常生活での注意点、ご家族のケア

目に負担をかけないことが大切です。  
ドライアイなどの症状が出た場合には、保湿用の目薬(人工涙液)  
が処方されることもあります。



人工涙液を点眼しましょう




日光に当たることは極力避け  
外出する時はサングラスを  
着用しましょう

# アムスラーグリッド検査

3週間に1回は  
チェックしましょう


目に異常がないかを早めに発見するために、  
右のような「アムスラーグリッド」を用いて確認します。  
3週間に1回はチェックする習慣をつけましょう。




- 眼鏡、コンタクトレンズは着けたままチェックします。
- 片目ずつチェックします。
- 30cm離して右のアムスラーグリッドを見ましょう。

チェックをしたら治療日誌に記載して、次の日付を確認しましょう。


## アムスラーグリッド




このように見えたら、担当医に相談しましょう。



ゆがんで見える



ぼやけた部分がある



欠けて見える

# 高リン血症 への対策

## 高リン血症とは？

ミネラルの1種であるリンが、血液中で多い状態です。  
自覚症状がないため、定期的に血液検査で血液中のリンを  
確認します。

血液検査の結果や副作用の状況をみながら、担当医が  
バルバーサ®の服用量を調節します。  
リンの吸収を抑える薬が処方される  
こともあります。



## 高リン血症の続発症

血液中のリンが多いと、別の病気を起こす場合があります。以下  
のような症状があった場合は、担当医に連絡してください。



体がかゆい



湿疹、出血



目がごろごろする  
物が見づらい



動悸、冷や汗  
(不整脈)

# 爪にあらわれる 副作用への対策

## 爪によくあらわれる症状


爪がはがれたり、色が変わったり、爪の生え際に炎症が起きたりします。

気になった症状があれば、担当医に相談しましょう。

### 日常生活での注意点、ご家族のケア



爪は泡で優しく洗う



水仕事時にはゴム手袋を着用する※



爪を深く切らない




ゆったりした靴・靴下をはく

※摩擦を避けるため内側に綿の手袋を着用しましょう。

### 副作用があらわれたときのケア

#### ● 爪の周りが腫れたときのテーピング(スパイラル法)


爪の周りが腫れることを爪囲炎そういえんといいます。爪が皮ふに食い込んでしまっている場合は、圧力を分散させるためにテーピングが必要です。



① 腫れている方の皮ふにテープを貼ります。



② 爪の横の皮ふが爪から離れるようにテープを引っ張ります。



③ 血流が悪くならないようにテープをらせん状に巻きつけます。

**テープを引っ張ったまま貼るのがポイントです。**

※担当医か皮膚科医から指示があった場合のみテーピングを行ってください。

# 皮ふにあらわれる 副作用への対策

## 皮ふによくあらわれる症状

手や足がしびれ、赤くなったり水ぶくれができたりします。また、皮ふの乾燥、脱毛などもみられます。気になった症状があれば、担当医に相談しましょう。

### 日常生活での注意点、ご家族のケア



皮ふを保湿する



入浴・シャワーはぬるま湯で短時間に済ませる



日光を避ける



適度に座って足に負担がかからないようにする

### 保湿剤の塗り方と外用薬の塗り方の違い


#### ● 保湿剤の塗り方 (塗擦<sup>とさつ</sup>)



色々な方向に伸ばしましょう

皮ふに塗り広げて、なじませることで保湿効果が高くなります。皮ふがしっとりするまで保湿剤を塗りましょう。

#### ● 外用薬の塗り方 (塗布<sup>とふ</sup>)



外用薬は患部に十分な量を塗る必要があります。塗り広げるのではなく、皮ふに乗せるイメージで外用しましょう。塗る量の目安は皮ふがてかる程度です。

※塗り方は担当医または皮膚科医の指示に従ってください。

# 口にあらわれる副作用 への対策

## よくあらわれる症状

口内炎や口の乾燥などがみられることもあります。  
日常的に注意することで、症状の悪化を予防することができます。  
その他にも気になる症状があれば、担当医に相談しましょう。

### 日常生活での注意点、ご家族のケア

#### 歯ブラシ

柄がストレート  
毛先が柔らかい



毎食後、就寝前の歯みがき



辛いもの、酸っぱいもの、熱いもの、硬いものなど  
刺激の強いものを口にしない

# Q & A


## Q 飲み忘れた場合

A



飲み忘れに気づいたのが  
6時間**以内**  
→当日中に服用してください  
日をまたぐ場合は服用せずに、  
次の日に1日分服用してください

飲み忘れに気づいたのが  
6時間**以降**  
→**次の日**に1日分服用してください  
(2日分の用量を服用しないでください)  
気づいたのが当日中であっても、  
その日は服用しないでください



飲み忘れた次の日に服用する際は  
2日分をまとめて  
**服用しないでください**



**2日以上**飲み忘れてしまった場合は  
ただちに**担当医に連絡**してください

## Q 多く服用してしまった場合


A



ただちに担当医に  
連絡してください

## Q その他

A



服用後に嘔吐しても  
**追加で服用しないでください**