

オプスミット[®]小児用分散錠1mg オプスミット[®]小児用分散錠2.5mg を服用される方および保護者の方へ

オプスミット[®]小児用分散錠1mg、オプスミット[®]小児用分散錠2.5mgは、肺動脈性肺高血圧症という病気を治療するための薬です。この薬は、肺動脈の緊張を和らげることにより肺動脈圧を下げ血液を流れやすくする働きがあります。しかし、人によっては目的の効果以外の望ましくない作用(副作用)があらわれることがあります。

適切な治療を受けていただくために、下記の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

－ 注意事項 －

主治医や薬剤師の指示をしっかりと守って服用して下さい。

この薬について、次の事項を必ずお守りください

- 妊婦は服用できません。
- この薬は肝臓の機能を損なうことがありますので、服用前に肝臓の検査を受けてください。
服用中も定期的に肝臓の検査が行われることがあります。
- この薬は貧血を起こすことがありますので、服用前に血液検査を受けてください。
服用中も定期的に血液検査が行われることがあります。
- この薬の効果が減弱する可能性があるため、セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む食品を避けてください。
- この薬には併用してはいけない薬や、併用を注意すべき薬があります。市販薬含め、他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- **服用方法**
この薬を飲むときには、手を十分に洗った後、乾燥させてから、薬を取り出してください。
スプーンまたは小さなコップを使って、必ず錠剤を少量の水に分散させてから服用してください。分散させた後すぐに飲まなかった場合は、その薬は飲まずに新しいものを準備してください。(裏面もお読みください)

スプーンを使う場合:

スプーンに少量の水と錠剤を入れてください。水の量は錠剤全体を覆うくらいが適切です。少量のヨーグルトと混ぜて飲んでも構いません。スプーン上で分散させたら直ちに服用してください。服用後、同じスプーンに少量の水(もしくはヨーグルト)を入れて飲んでください。全ての薬を飲んだことを確認してください。スプーンを使うときは、水の代わりにオレンジジュース、リンゴジュース、スキムミルクで服用することもできます。

コップを使う場合:

少量(10mL～最大100mL)の水を入れたコップに錠剤を入れて、スプーンなどで分散させてから直ちに服用してください。服用後、さらにコップに少量の水を加え、同じスプーンなどで攪拌してから飲んでください。コップに残っている薬がないことを確認してください。

● 飲み忘れた場合の対応

飲み忘れた分を補おうとせず、2回分を一度に飲むことは避けてください。気がついたとき、その日のうちにできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が間近の場合は1回とぼして、次の時間に1回分飲んでください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと

● 下記のような症状に気づいたときは、すぐに医師または薬剤師に連絡して下さい。

- | | |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> かぜ症候群 | <input type="checkbox"/> 頭痛 |
| <input type="checkbox"/> 鼻炎 | <input type="checkbox"/> 耳鳴り |
| <input type="checkbox"/> 胃腸炎 | <input type="checkbox"/> 階段や坂をのぼる時の動悸や息切れの悪化 |
| <input type="checkbox"/> からだがだるい | <input type="checkbox"/> 息切れの悪化 |
| <input type="checkbox"/> めまい | |

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

連絡先(医療機関・薬局名)