重症度別では、Grade 3 又は 4 の有害事象の発現率は、65 歳未満、65 歳以上ともに 100%であった。65 歳未満で発現率が 65 歳以上より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、発熱性好中球減少症（65 歳未満：8.3%、65 歳以上：0%）、注入に伴う反応（65 歳未満：5.6%、65 歳以上：0%）、食欲減退（65 歳未満：5.6%、65 歳以上：0%）であった。65 歳以上で発現率が 65 歳未満より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、斑状丘疹状皮疹（65 歳以上：6.1%、65 歳未満：0%）であった［総括報告書（2011002 試験）表 12-12、12.2.3.6.1］。

（2）　NHL 1-2003 試験

65 歳未満で発現率が 65 歳以上より 10%以上高かった有害事象は、BR 群では認められなかった。65 歳以上で発現率が 65 歳未満より 10%以上高かった有害事象は、BR 群ではヘモグロビン減少（65 歳以上：49%、65 歳未満：28%）及び血小板数減少（65 歳以上：39%、65 歳未満：19%）であった。

重症度別では、Grade 3 又は 4 の有害事象の発現率は、65 歳以上で 65 歳未満より高かった（BR 群：65 歳未満 56%、65 歳以上 76%）［総括報告書（NHL 1-2003 試験）Table 74、75、12.2.2.4(a)］。

65 歳未満で発現率が 65 歳以上より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、BR 群では認められなかった。65 歳以上で発現率が 65 歳未満より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、BR 群では血小板数減少（65 歳以上：11%、65 歳未満：3%）、白血球数減少（65 歳以上：40%、65 歳未満：31%）であった［総括報告書（NHL 1-2003 試験）Table 75、12.2.2.4(a)］。

（3）　C18083/3064/NL/MN 試験

65 歳未満で発現率が 65 歳以上より 10%以上高かった有害事象は、BR 群では悪心（65 歳未満：68%、65 歳以上：53%）、頭痛（65 歳未満：27%、65 歳以上：12%）であった。65 歳以上で発現率が 65 歳未満より 10%以上高かった有害事象は、BR 群では血小板減少症（65 歳以上：21%、65 歳未満：9%）、上気道感染症（65 歳以上：17%、65 歳未満：6%）であった［総括報告書（C18083/3064/NL/MN 試験）Adhoc Summary S4］。

65 歳未満で発現率が 65 歳以上より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、BR 群ではリンパ球減少症（65 歳未満：8%、65 歳以上：1%）であった。65 歳以上で発現率が 65 歳未満より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、BR 群では発熱性好中球減少症（65 歳以上：6%、65 歳未満：1%）、白血球減少症（65 歳以上：8%、65 歳未満：3%）、好中球減少症（65 歳以上：31%、65 歳未満：26%）であった［総括報告書（C18083/3064/NL/MN 試験）Adhoc Summary S10］。

2.7.4.5.1.2　　性別

（1）　2011002 試験

男性で発現率が女性より 10%以上高かった有害事象は、便秘（男性：77.4%、女性：55.3%、以下同様）、血小板数減少（64.5%、47.4%）、血中免疫グロブリン M 減少（54.8%、39.5%）、貧血（41.9%、28.9%）、味覚異常（25.8%、13.2%）、血中クレアチニン増加（16.1%、0%）、上気道感染（12.9%、2.6%）、しゃっくり（12.9%、0%）であった。女性で発現率が男性より 10%以上高かった有害事象は、悪心（女性：81.6%、男性：48.4%、以下同様）、倦怠感（60.5%、45.2%）、食欲減退（57.9%、

25.8%）、AST 増加（39.5%、22.6%）、口内炎（34.2%、6.5%）、嘔吐（34.2%、0%）、ALT 増加（34.2%、16.1%）、発熱（31.6%、16.1%）、頭痛（23.7%、9.7%）、注射部位反応（21.1%、0%）、下痢（21.1%、9.7%）、疲労（15.8%、0%）、発熱性好中球減少症（10.5%、0%）、静脈炎（10.5%、0%）であった。

重症度別では、Grade 3 又は 4 の有害事象の発現率は、男性、女性ともに 100%であった。

男性で発現率が女性より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、認められなかった。

女性で発現率が男性より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、白血球数減少（女性:86.8%、男性 : 77.4%、以下同様）、発熱性好中球減少症（7.9%、0%）、発疹（5.3%、0%）、ALT 増加（5.3%、0%）、AST 増加（5.3%、0%）、食欲減退（5.3%、0%）、リンパ球数減少（100%、93.6%）であった［総括報告書（2011002 試験）表 12-13、12.2.3.6.2］。

（2） NHL 1-2003 試験

男性で発現率が女性より 10%以上高かった有害事象は、BR 群では発疹（男性 : 33%、女性 : 20%）及び血小板数減少（男性 : 34%、女性 : 22%）であった。女性で男性より 10%以上高頻度に発現した有害事象は、BR 群では嘔吐（女性 : 55%、男性 : 30%）、ヘモグロビン減少（女性 : 44%、男性 : 32%）、トランスアミナーゼ値上昇（女性 : 33%、男性 : 12%）、白血球数減少（女性 : 88%、男性 : 75%）であった［総括報告書（NHL 1-2003 試験）Table 76、12.2.2.4(b)］。

重症度別では、男性で発現率が女性より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は認められなかった。女性で発現率が男性より 5%以上高かった Grade 3 又は 4 の有害事象は、BR 群では白血球数減少（女性 : 43%、男性 : 28%）、顆粒球数減少（女性 : 27%、男性 : 22%）、脱毛症（女性 : 7%、男性 : 1%）であった［総括報告書（NHL 1-2003 試験）Table 77、12.2.2.4(b)］。

（3） C18083/3064/NL/MN 試験

男性で発現率が女性より 10%以上高かった有害事象は認められなかった。女性で発現率が男性より 10%以上高かった有害事象は、BR 群では悪心（女性 : 70%、男性 : 58%）、疲労（女性 : 60%、男性 : 46%）、嘔吐（女性 : 34%、男性 : 22%）であった［総括報告書（C18083/3064/NL/MN 試験）Adhoc Summary S5］。

重症度別では、Grade 3 又は 4 の有害事象の発現率は、男性 60%、女性 56%であった。［総括報告書（C18083/3064/NL/MN 試験）Adhoc Summary S11］。

2.7.4.5.2 外因性要因

外因性民族的要因（医療環境、喫煙、飲酒、食事の習慣など）による本剤の安全性への影響について、特に調査はしていない。

2.7.4.5.3 薬物相互作用

リツキシマブは本剤の薬物動態には影響を及ぼさなかった。（2.7.2 項参照）。

2.7.4.5.4　妊娠及び授乳時の使用

妊婦又は授乳婦及び妊娠可能な女性は本剤の臨床試験から除外した。ヒトにおける妊娠中の本剤の投与は実施していない。

2.7.4.5.5　過量投与

評価資料に用いた試験において、過量投与された症例は報告されていない。

2.7.4.5.6　薬物乱用

依存性を検討した非臨床及び臨床試験は実施しておらず、薬物乱用に関する情報はない。

2.7.4.5.7　離脱症状及び反跳現象

離脱症状又は反跳現象を検討した臨床試験は実施しておらず、これらに関する情報はない。

2.7.4.5.8　自動車運転及び機械操作に対する影響又は精神機能の障害

自動車の運転能力及び機械操作能力への影響を検討した試験は実施していない。

2.7.4.6　市販後データ

2.7.4.6.1　国内の製造販売後調査の概要

本剤は、再発又は難治性の低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症に、2010 年 10 月 27 日付にて製造販売承認を取得し、承認条件に基づく特定使用成績調査（全例調査）を実施した。

全例調査において収集された 272 施設 583 例の調査票の結果を取りまとめた承認条件解除希望書が厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会に報告され、2013 年 3 月 14 日付で厚生労働省より承認条件解除の連絡を受け、調査を終了した。

全例調査の結果の概要を以下に示す。

2.7.4.6.1.1　安全性

（1）　副作用発現状況

安全性解析対象症例 583 例における副作用は 565 例 2,814 件認められ、副作用発現症例率は 96.91%（565/583 例）であった。

主な副作用は、器官別大分類（SOC）別では、「臨床検査」90.39%（527 例）が最も多く、次いで「血液およびリンパ系障害」36.54%（213 例）、「胃腸障害」27.79%（162 例）、「感染症および寄生虫症」21.10%（123 例）、「一般・全身障害および投与部位の状態」19.21%（112 例）等であった。また、基本語（PT）別では、「リンパ球数減少」71.87%（419 件）、「白血球数減少」57.46%（335 件）、「好中球数減少」55.57%（324 件）、「血小板数減少」40.14%（234 件）及び「貧血」19.55%（114 件）等であった（表 2.7.4.6-1）。

（2） 転帰「死亡」の副作用発現状況

安全性解析対象症例 583 例において、副作用の転帰が死亡と報告された症例は 13 例（16 件）であり、2 件以上に認められた副作用は、「ニューモシスチス・イロベチイ肺炎」及び「肺炎」の各 2 件であった（表 2.7.4.6-2）。

全例調査における解析結果から、承認時までの状況と比べ、副作用の発現傾向に著変は認められなかった。

表 2.7.4.6-1 副作用発現状況一覧表

	承認時迄の状況	特定使用成績調査	合計
調査施設数	**17**	**272**	**273**
調査症例数	**78**	**583**	**661**
副作用等の発現症例数	**78**	**565**	**643**
副作用等の発現件数	**1502**	**2814**	**4316**
副作用等の発現症例率	**100.00%**	**96.91%**	**97.28%**
副作用等の種類	**副作用等の種類別発現症例(件数)率（%）**		
感染症および寄生虫症	23(29.49)	123(21.10)	146(22.09)
気管支炎	—	9(1.54)	9(1.36)
カンピロバクター胃腸炎	—	1(0.17)	1(0.15)
蜂巣炎	—	3(0.51)	3(0.45)
慢性副鼻腔炎	—	1(0.17)	1(0.15)
結膜炎	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
膀胱炎	2(2.56)	2(0.34)	4(0.61)
サイトメガロウイルス感染	—	10(1.72)	10(1.51)
毛包炎	—	2(0.34)	2(0.30)
真菌血症	—	1(0.17)	1(0.15)
真菌感染	—	1(0.17)	1(0.15)
胃腸炎	—	2(0.34)	2(0.30)
歯肉炎	—	2(0.34)	2(0.30)
Ｂ型肝炎	—	5(0.86)	5(0.76)
単純ヘルペス	—	2(0.34)	2(0.30)
ヘルペスウイルス感染	1(1.28)	3(0.51)	4(0.61)
帯状疱疹	2(2.56)	27(4.63)	29(4.39)
感染	—	5(0.86)	5(0.76)
インフルエンザ	1(1.28)	—	1(0.15)
鼻咽頭炎	10(12.82)	8(1.37)	18(2.72)
口腔カンジダ症	1(1.28)	—	1(0.15)
外耳炎	—	1(0.17)	1(0.15)
咽頭炎	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
肺炎	1(1.28)	14(2.40)	15(2.27)
サイトメガロウイルス性肺炎	—	3(0.51)	3(0.45)
大腸菌性肺炎	—	1(0.17)	1(0.15)
偽膜性大腸炎	—	2(0.34)	2(0.30)
敗血症	—	9(1.54)	9(1.36)
副鼻腔炎	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
皮下組織膿瘍	—	1(0.17)	1(0.15)
上気道感染	—	2(0.34)	2(0.30)
尿路感染	—	1(0.17)	1(0.15)
水痘	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
ウイルス性咽頭炎	1(1.28)	—	1(0.15)
外陰部炎	1(1.28)	—	1(0.15)
外陰部腟カンジダ症	1(1.28)	—	1(0.15)
サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	—	2(0.34)	2(0.30)
肛門膿瘍	—	2(0.34)	2(0.30)
サイトメガロウイルス性腸炎	—	2(0.34)	2(0.30)
ブドウ球菌性敗血症	—	1(0.17)	1(0.15)
ブドウ球菌感染	—	1(0.17)	1(0.15)
クロストリジウム性大腸炎	—	1(0.17)	1(0.15)
サイトメガロウイルス血症	—	4(0.69)	4(0.61)
好中球減少性感染	1(1.28)	—	1(0.15)
細菌感染	—	1(0.17)	1(0.15)
肺感染	—	1(0.17)	1(0.15)
口腔真菌感染	—	1(0.17)	1(0.15)
胆道感染	—	1(0.17)	1(0.15)

表 2.7.4.6-1 副作用発現状況一覧表（続き）

	承認時迄の状況	特定使用成績調査	合計
細菌性鼻炎	—	1(0.17)	1(0.15)
口唇感染	1(1.28)	—	1(0.15)
口腔ヘルペス	2(2.56)	6(1.03)	8(1.21)
感染性皮膚嚢腫	—	1(0.17)	1(0.15)
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	—	5(0.86)	5(0.76)
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	2(2.56)	3(0.51)	5(0.76)
骨髄異形成症候群	—	1(0.17)	1(0.15)
皮膚乳頭腫	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
腫瘍疼痛	1(1.28)	—	1(0.15)
単クローン性免疫グロブリン血症	—	1(0.17)	1(0.15)
血液およびリンパ系障害	10(12.82)	213(36.54)	223(33.74)
無顆粒球症	—	2(0.34)	2(0.30)
貧血	2(2.56)	114(19.55)	116(17.55)
大球性貧血	—	1(0.17)	1(0.15)
赤芽球癆	—	1(0.17)	1(0.15)
播種性血管内凝固	—	4(0.69)	4(0.61)
赤血球減少症	—	2(0.34)	2(0.30)
発熱性好中球減少症	1(1.28)	48(8.23)	49(7.41)
溶血性貧血	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
白血球減少症	1(1.28)	22(3.77)	23(3.48)
リンパ球減少症	6(7.69)	19(3.26)	25(3.78)
好中球減少症	—	55(9.43)	55(8.32)
汎血球減少症	—	10(1.72)	10(1.51)
血小板減少症	—	18(3.09)	18(2.72)
腎性貧血	—	1(0.17)	1(0.15)
骨髄機能不全	—	4(0.69)	4(0.61)
血球減少症	—	1(0.17)	1(0.15)
免疫系障害	4(5.13)	8(1.37)	12(1.82)
過敏症	3(3.85)	3(0.51)	6(0.91)
低γグロブリン血症	—	5(0.86)	5(0.76)
節足動物刺傷アレルギー	1(1.28)	—	1(0.15)
代謝および栄養障害	51(65.38)	84(14.41)	135(20.42)
葉酸欠乏	—	1(0.17)	1(0.15)
高カルシウム血症	—	3(0.51)	3(0.45)
高クロール血症	—	1(0.17)	1(0.15)
高血糖	1(1.28)	—	1(0.15)
高カリウム血症	—	6(1.03)	6(0.91)
高ナトリウム血症	—	2(0.34)	2(0.30)
高尿酸血症	—	12(2.06)	12(1.82)
低アルブミン血症	—	8(1.37)	8(1.21)
低カルシウム血症	1(1.28)	4(0.69)	5(0.76)
低カリウム血症	—	11(1.89)	11(1.66)
低ナトリウム血症	—	1(0.17)	1(0.15)
低蛋白血症	—	4(0.69)	4(0.61)
腫瘍崩壊症候群	—	8(1.37)	8(1.21)
脂質異常症	—	1(0.17)	1(0.15)
栄養補給障害	—	1(0.17)	1(0.15)
食欲減退	51(65.38)	39(6.69)	90(13.62)
高アミラーゼ血症	—	1(0.17)	1(0.15)
精神障害	9(11.54)	3(0.51)	12(1.82)
無感情	2(2.56)	—	2(0.30)
不眠症	6(7.69)	2(0.34)	8(1.21)
気分変化	1(1.28)	—	1(0.15)
抑うつ症状	—	1(0.17)	1(0.15)

表 2.7.4.6-1 副作用発現状況一覧表（続き）

	承認時迄の状況	特定使用成績調査	合計
神経系障害	37(47.44)	27(4.63)	64(9.68)
意識変容状態	—	1(0.17)	1(0.15)
小脳出血	—	1(0.17)	1(0.15)
脳出血	—	1(0.17)	1(0.15)
浮動性めまい	3(3.85)	1(0.17)	4(0.61)
体位性めまい	4(5.13)	—	4(0.61)
味覚異常	19(24.36)	10(1.72)	29(4.39)
頭痛	22(28.21)	10(1.72)	32(4.84)
知覚過敏	1(1.28)	—	1(0.15)
感覚鈍麻	3(3.85)	—	3(0.45)
ミオクローヌス	—	1(0.17)	1(0.15)
神経系障害	—	2(0.34)	2(0.30)
末梢性ニューロパチー	—	2(0.34)	2(0.30)
嗅覚錯誤	2(2.56)	—	2(0.30)
ヘルペス後神経痛	—	1(0.17)	1(0.15)
眼障害	7(8.97)	0(0.00)	7(1.06)
眼瞼紅斑	1(1.28)	—	1(0.15)
角膜炎	2(2.56)	—	2(0.30)
流涙増加	1(1.28)	—	1(0.15)
眼充血	2(2.56)	—	2(0.30)
強膜出血	1(1.28)	—	1(0.15)
眼そう痒症	1(1.28)	—	1(0.15)
耳および迷路障害	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
耳管閉塞	1(1.28)	—	1(0.15)
耳鳴	—	1(0.17)	1(0.15)
回転性めまい	—	1(0.17)	1(0.15)
心臓障害	11(14.10)	10(1.72)	21(3.18)
不整脈	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
上室性不整脈	—	1(0.17)	1(0.15)
心房細動	—	1(0.17)	1(0.15)
房室ブロック	1(1.28)	—	1(0.15)
徐脈	—	2(0.34)	2(0.30)
心不全	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
急性心不全	—	1(0.17)	1(0.15)
うっ血性心不全	—	1(0.17)	1(0.15)
動悸	6(7.69)	2(0.34)	8(1.21)
洞性頻脈	2(2.56)	—	2(0.30)
上室性期外収縮	1(1.28)	—	1(0.15)
心室性期外収縮	3(3.85)	—	3(0.45)
左室機能不全	2(2.56)	—	2(0.30)
血管障害	42(53.85)	76(13.04)	118(17.85)
潮紅	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
高血圧	1(1.28)	—	1(0.15)
低血圧	4(5.13)	1(0.17)	5(0.76)
静脈炎	24(30.77)	13(2.23)	37(5.60)
血栓性静脈炎	—	1(0.17)	1(0.15)
血管痛	21(26.92)	40(6.86)	61(9.23)
血管炎	—	21(3.60)	21(3.18)
静脈血栓症	1(1.28)	—	1(0.15)
ほてり	6(7.69)	1(0.17)	7(1.06)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	25(32.05)	32(5.49)	57(8.62)
アレルギー性胞隔炎	1(1.28)	—	1(0.15)
喘息	—	1(0.17)	1(0.15)
慢性気管支炎	—	1(0.17)	1(0.15)

表 2.7.4.6-1 副作用発現状況一覧表（続き）

	承認時迄の状況	特定使用成績調査	合計
咳嗽	6(7.69)	6(1.03)	12(1.82)
呼吸困難	2(2.56)	—	2(0.30)
鼻出血	1(1.28)	—	1(0.15)
喀血	—	2(0.34)	2(0.30)
しゃっくり	2(2.56)	6(1.03)	8(1.21)
間質性肺疾患	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
胸水	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
胸膜炎	—	1(0.17)	1(0.15)
肺臓炎	—	2(0.34)	2(0.30)
湿性咳嗽	1(1.28)	—	1(0.15)
呼吸性アシドーシス	—	1(0.17)	1(0.15)
アレルギー性鼻炎	1(1.28)	—	1(0.15)
鼻漏	1(1.28)	—	1(0.15)
喀痰増加	—	2(0.34)	2(0.30)
喘鳴	—	1(0.17)	1(0.15)
上気道の炎症	7(8.97)	8(1.37)	15(2.27)
器質化肺炎	—	1(0.17)	1(0.15)
口腔咽頭不快感	3(3.85)	—	3(0.45)
口腔咽頭痛	5(6.41)	—	5(0.76)
胃腸障害	73(93.59)	162(27.79)	235(35.55)
腹部不快感	8(10.26)	3(0.51)	11(1.66)
腹部膨満	1(1.28)	—	1(0.15)
腹痛	1(1.28)	4(0.69)	5(0.76)
下腹部痛	1(1.28)	—	1(0.15)
上腹部痛	5(6.41)	2(0.34)	7(1.06)
口唇炎	6(7.69)	1(0.17)	7(1.06)
便秘	37(47.44)	21(3.60)	58(8.77)
下痢	18(23.08)	14(2.40)	32(4.84)
出血性腸憩室炎	—	1(0.17)	1(0.15)
口内乾燥	6(7.69)	—	6(0.91)
消化不良	2(2.56)	—	2(0.30)
腸炎	—	2(0.34)	2(0.30)
おくび	2(2.56)	—	2(0.30)
胃炎	—	1(0.17)	1(0.15)
胃食道逆流性疾患	—	2(0.34)	2(0.30)
胃腸出血	—	2(0.34)	2(0.30)
舌炎	2(2.56)	3(0.51)	5(0.76)
痔核	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
麻痺性イレウス	—	1(0.17)	1(0.15)
メレナ	—	1(0.17)	1(0.15)
口腔内潰瘍形成	1(1.28)	—	1(0.15)
悪心	67(85.90)	113(19.38)	180(27.23)
歯周病	—	1(0.17)	1(0.15)
口内炎	14(17.95)	10(1.72)	24(3.63)
舌障害	1(1.28)	—	1(0.15)
嘔吐	32(41.03)	18(3.09)	50(7.56)
肛門出血	1(1.28)	—	1(0.15)
消化管運動過剰	1(1.28)	—	1(0.15)
痔出血	—	1(0.17)	1(0.15)
びらん性十二指腸炎	1(1.28)	—	1(0.15)
口腔障害	1(1.28)	—	1(0.15)
肝胆道系障害	1(1.28)	21(3.60)	22(3.33)
肝機能異常	1(1.28)	11(1.89)	12(1.82)
肝障害	—	11(1.89)	11(1.66)

表 2.7.4.6-1 副作用発現状況一覧表（続き）

	承認時迄の状況	特定使用成績調査	合計
皮膚および皮下組織障害	41(52.56)	65(11.15)	106(16.04)
水疱	—	1(0.17)	1(0.15)
ざ瘡様皮膚炎	1(1.28)	—	1(0.15)
薬疹	—	3(0.51)	3(0.45)
湿疹	1(1.28)	3(0.51)	4(0.61)
紅斑	—	5(0.86)	5(0.76)
多形紅斑	—	3(0.51)	3(0.45)
多汗症	1(1.28)	—	1(0.15)
皮膚疼痛	1(1.28)	—	1(0.15)
点状出血	1(1.28)	—	1(0.15)
そう痒症	9(11.54)	7(1.20)	16(2.42)
発疹	29(37.18)	40(6.86)	69(10.44)
全身性皮疹	1(1.28)	—	1(0.15)
そう痒性皮疹	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
皮膚びらん	2(2.56)	—	2(0.30)
皮膚剥脱	1(1.28)	—	1(0.15)
蕁麻疹	2(2.56)	1(0.17)	3(0.45)
全身紅斑	—	1(0.17)	1(0.15)
皮膚硬結	—	1(0.17)	1(0.15)
中毒性皮疹	—	1(0.17)	1(0.15)
色素沈着障害	2(2.56)	—	2(0.30)
筋骨格系および結合組織障害	10(12.82)	1(0.17)	11(1.66)
関節痛	1(1.28)	—	1(0.15)
背部痛	2(2.56)	—	2(0.30)
筋肉痛	2(2.56)	1(0.17)	3(0.45)
頚部痛	2(2.56)	—	2(0.30)
四肢痛	1(1.28)	—	1(0.15)
筋骨格硬直	2(2.56)	—	2(0.30)
腎および尿路障害	6(7.69)	12(2.06)	18(2.72)
出血性膀胱炎	—	2(0.34)	2(0.30)
排尿困難	—	1(0.17)	1(0.15)
血尿	—	1(0.17)	1(0.15)
頻尿	1(1.28)	—	1(0.15)
蛋白尿	5(6.41)	1(0.17)	6(0.91)
腎障害	—	2(0.34)	2(0.30)
腎不全	—	1(0.17)	1(0.15)
腎機能障害	—	4(0.69)	4(0.61)
生殖系および乳房障害	1(1.28)	0(0.00)	1(0.15)
不規則月経	1(1.28)	—	1(0.15)
一般・全身障害および投与部位の状態	62(79.49)	112(19.21)	174(26.32)
無力症	1(1.28)	—	1(0.15)
胸痛	—	2(0.34)	2(0.30)
悪寒	6(7.69)	1(0.17)	7(1.06)
顔面浮腫	—	1(0.17)	1(0.15)
疲労	31(39.74)	4(0.69)	35(5.30)
熱感	2(2.56)	—	2(0.30)
低体温	6(7.69)	1(0.17)	7(1.06)
注射部位紅斑	1(1.28)	—	1(0.15)
注射部位硬結	—	2(0.34)	2(0.30)
注射部位疼痛	1(1.28)	—	1(0.15)
注射部位反応	17(21.79)	—	17(2.57)
倦怠感	21(26.92)	30(5.15)	51(7.72)
浮腫	—	5(0.86)	5(0.76)
末梢性浮腫	4(5.13)	—	4(0.61)

表 2.7.4.6-1 副作用発現状況一覧表（続き）

	承認時迄の状況	特定使用成績調査	合計
発熱	27(34.62)	64(10.98)	91(13.77)
圧痛	1(1.28)	—	1(0.15)
末梢腫脹	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
限局性浮腫	1(1.28)	—	1(0.15)
注射部位腫脹	—	1(0.17)	1(0.15)
硬結	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
疾患進行	—	1(0.17)	1(0.15)
注入部位血管外漏出	1(1.28)	4(0.69)	5(0.76)
注射部位血管炎	—	1(0.17)	1(0.15)
臨床検査	78(100.00)	527(90.39)	605(91.53)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	28(35.90)	18(3.09)	46(6.96)
アルブミン・グロブリン比異常	—	1(0.17)	1(0.15)
アミラーゼ増加	—	3(0.51)	3(0.45)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	30(38.46)	22(3.77)	52(7.87)
β－NアセチルDグルコサミニダーゼ増加	—	1(0.17)	1(0.15)
血中アルブミン減少	8(10.26)	1(0.17)	9(1.36)
血中ビリルビン増加	8(10.26)	5(0.86)	13(1.97)
血中カルシウム減少	3(3.85)	—	3(0.45)
血中クロール減少	—	2(0.34)	2(0.30)
血中クロール増加	1(1.28)	—	1(0.15)
血中クレアチニン増加	18(23.08)	14(2.40)	32(4.84)
血中ブドウ糖増加	1(1.28)	2(0.34)	3(0.45)
血中免疫グロブリンA減少	24(30.77)	1(0.17)	25(3.78)
血中免疫グロブリンG減少	23(29.49)	1(0.17)	24(3.63)
血中免疫グロブリンM減少	34(43.59)	1(0.17)	35(5.30)
血中乳酸脱水素酵素増加	39(50.00)	34(5.83)	73(11.04)
血中カリウム減少	5(6.41)	6(1.03)	11(1.66)
血中カリウム増加	4(5.13)	2(0.34)	6(0.91)
血圧上昇	1(1.28)	—	1(0.15)
血中ナトリウム減少	3(3.85)	3(0.51)	6(0.91)
血中トリグリセリド増加	—	1(0.17)	1(0.15)
血中尿素減少	1(1.28)	—	1(0.15)
血中尿素増加	3(3.85)	10(1.72)	13(1.97)
血中尿酸増加	2(2.56)	14(2.40)	16(2.42)
Ｃ－反応性蛋白増加	37(47.44)	72(12.35)	109(16.49)
ＣＤ４リンパ球減少	54(69.23)	2(0.34)	56(8.47)
ＣＤ４／ＣＤ８比減少	9(11.54)	—	9(1.36)
心電図ＱＴ延長	7(8.97)	—	7(1.06)
心電図Ｔ波振幅減少	1(1.28)	—	1(0.15)
好酸球数増加	6(7.69)	9(1.54)	15(2.27)
フィブリンDダイマー増加	—	1(0.17)	1(0.15)
γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	15(19.23)	10(1.72)	25(3.78)
尿中ブドウ糖	1(1.28)	1(0.17)	2(0.30)
顆粒球数減少	—	4(0.69)	4(0.61)
ヘマトクリット減少	—	16(2.74)	16(2.42)
尿中血陽性	4(5.13)	5(0.86)	9(1.36)
ヘモグロビン減少	54(69.23)	38(6.52)	92(13.92)
ヘモグロビン増加	1(1.28)	—	1(0.15)
リンパ球数減少	72(92.31)	419(71.87)	491(74.28)
単球数減少	—	2(0.34)	2(0.30)
単球数増加	—	1(0.17)	1(0.15)
好中球数減少	68(87.18)	324(55.57)	392(59.30)
好中球数増加	1(1.28)	—	1(0.15)
血小板数減少	60(76.92)	234(40.14)	294(44.48)

表 2.7.4.6-1 副作用発現状況一覧表（続き）

	承認時迄の状況	特定使用成績調査	合計
総蛋白減少	19(24.36)	3(0.51)	22(3.33)
脈拍異常	4(5.13)	－	4(0.61)
赤血球数減少	54(69.23)	16(2.74)	70(10.59)
体重減少	26(33.33)	2(0.34)	28(4.24)
体重増加	1(1.28)	3(0.51)	4(0.61)
白血球数減少	76(97.44)	335(57.46)	411(62.18)
白血球数増加	2(2.56)	－	2(0.30)
血中リン減少	－	1(0.17)	1(0.15)
ＣＤ４／ＣＤ８比増加	1(1.28)	－	1(0.15)
サイトメガロウイルス検査陽性	－	1(0.17)	1(0.15)
血中β－Ｄ－グルカン増加	－	1(0.17)	1(0.15)
尿中蛋白陽性	－	2(0.34)	2(0.30)
脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	－	1(0.17)	1(0.15)
血中アルカリホスファターゼ減少	1(1.28)	－	1(0.15)
血中アルカリホスファターゼ増加	12(15.38)	9(1.54)	21(3.18)
肝酵素上昇	－	1(0.17)	1(0.15)
リンパ球形態異常	－	1(0.17)	1(0.15)
血中クレアチンホスホキナーゼ減少	－	1(0.17)	1(0.15)
尿中ウロビリノーゲン増加	1(1.28)	－	1(0.15)
傷害、中毒および処置合併症	0(0.00)	1(0.17)	1(0.15)
硬膜下血腫	－	1(0.17)	1(0.15)

注：副作用は、「ICH 国際医薬品用語集日本語版（MedDRA/J）Ver.18.0」に基づき分類した。
注：調査症例数を分母として発現率（%）を算出した。
注：器官別大分類（SOC）の集計は症例数、基本語（PT）の集計は件数（同一症例内で、同じ事象が 2 回以上発現している場合は 1 件）とした。

表 2.7.4.6-2 転帰「死亡」の副作用発現状況一覧表

	関連あり	関連不明	合計
副作用の転帰「死亡」の発現症例数	8	6	13
副作用の転帰「死亡」の発現件数	10	6	16
副作用等の種類	**副作用等の種類別発現症例(件数)率（%）**		
感染症および寄生虫症	4(0.69)	2(0.34)	6(1.03)
真菌感染	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
肺炎	2(0.34)	0(0.00)	2(0.34)
サイトメガロウイルス性肺炎	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)
敗血症	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	2(0.34)	0(0.00)	2(0.34)
血液およびリンパ系障害	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
発熱性好中球減少症	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
神経系障害	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
脳出血	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
心臓障害	1(0.17)	1(0.17)	2(0.34)
急性心不全	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
うっ血性心不全	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	2(0.34)	1(0.17)	3(0.51)
間質性肺疾患	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
呼吸性アシドーシス	1(0.17)	0(0.00)	1(0.17)
器質化肺炎	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)
胃腸障害	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)
胃腸出血	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)
一般・全身障害および投与部位の状態	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)
疾患進行	0(0.00)	1(0.17)	1(0.17)

注：副作用は、「ICH 国際医薬品用語集日本語版（MedDRA/J）Ver.18.0」に基づき分類した。
注：器官別大分類（SOC）の集計は症例数、基本語（PT）の集計は件数（同一症例内で、同じ事象が 2 回以上発現している場合は 1 件）とした。

2.7.4.6.2　国外を含む市販後における副作用発現状況の概要

第■回及び第■回 PBRER（2014 年 1 月■日～2014 年 7 月■日及び 2014 年 7 月■日～2015 年 1 月■日）の要約を示す。

当該調査単位期間中に、約 40,000 人の患者にベンダムスチン塩酸塩が使用されたと推定された。

安全性全体の評価では、安全性プロファイルに影響を与える情報はなかった。

本剤の確立した全般的なベネフィットーリスクプロファイルに関して、新たな重要な所見はない。本剤のベネフィットーリスクプロファイルは、好ましいと考えられる。

2.7.4.7　付録

表 2.7.4.7- 1 死亡例一覧（NHL 1-2003 試験）
表 2.7.4.7-2 死亡例一覧（C18083/3064/NL/MN 試験）
表 2.7.4.7- 3 重篤な有害事象を発現した症例一覧（2011002 試験）
表 2.7.4.7-4 重篤な有害事象を発現した症例一覧（NHL 1-2003 試験）
表 2.7.4.7- 5 重篤な有害事象を発現した症例一覧（C18083/3064/NL/MN 試験）
表 2.7.4.7- 6 重篤な有害事象を発現した症例一覧（2006001 試験）
表 2.7.4.7- 7 重篤な有害事象を発現した症例一覧（2007002 試験）
表 2.7.4.7-8 有害事象の発現例数（%）
（2006001 試験及び 2007002 試験併合）

表 2.7.4.7- 1 死亡例一覧（NHL 1-2003 試験）

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
BENDAMUSTINE + RITUXIMAB	NHL	00103		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	肺障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	認知症	880	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00106		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	ウイルス性上気道感染	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	敗血症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	心血管障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	敗血症	740	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00108		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれ	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	死亡	170	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00136		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	単径ヘルニア	311	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	胆管狭窄	319	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	心筋梗塞	358	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00154		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	疼痛	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	B細胞性リンパ腫	170	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00159		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	下痢	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	イレウス	96	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：670	腹壁膿瘍	130	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：670	ブドウ球菌性敗血症	1882	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00192		女性	4[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：325 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：325 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	95	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：325 リツキシマブ：700	白血球減少症	95	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	非ホジキンリンパ腫	754	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00193		男性	4[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	四肢痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	非ホジキンリンパ腫	951	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00226		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	単純ヘルペス	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	粘膜の炎症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	顆粒球数減少	36	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	発熱	38	-	-	Grade2	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	心血管不全	40	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡
		00230		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	帯状疱疹	165	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	リンパ腫	345	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	544	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00245		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：300	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：612	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：300	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：612	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：600	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：300	死亡	860	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00312		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：150	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	血小板数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	過敏症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	敗血症	396	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00315		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	肺塞栓症	106	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	胸痛	146	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	胸部不快感	201	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	非ホジキンリンパ腫	1083	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00316		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ウイルス性消化管感染	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	外陰膣真菌感染	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	イレウス	88	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	下痢	88	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	死亡	97	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00317		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中ビリルビン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	ウイルス性気管支炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	疲労	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	敗血症	415	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00479		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	肺炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	脳梗塞	17	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	死亡	672	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00508		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	心筋梗塞	1858	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00525		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれ	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	脱水	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	浮腫	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	汎血球減少症	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	腎不全	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	肺障害	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	心停止	52	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	心不全	52	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	貧血	52	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00540		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：125 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：125 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	死亡	1371	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00541		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	非ホジキンリンパ腫	492	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00544		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	細菌感染	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	真菌性性器感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	腹水	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	死亡	614	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00550		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：663	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	大腸菌性尿路感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：663	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：294 リツキシマブ：700	霧視	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：294 リツキシマブ：700	筋痙縮	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	頭痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	鼻咽頭炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	体重減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	71	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	死亡	399	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	直腸癌	399	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00558		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	細菌感染	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	細菌感染	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	湿性咳嗽	125	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	全身健康状態低下	125	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	肺炎	139	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	200	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00717		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	1477	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00736		女性	7■	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	骨痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	高血圧	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	落ち着きのなさ	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	睡眠障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	回転性めまい	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	1033	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00737		女性	5■	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	ウイルス感染	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	発疹	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	サイトメガロウイルス感染	-	-	なし	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	便秘	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	口内炎	-	-	なし	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	便秘	8	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	尿路感染	8	-	-	-	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	サイトメガロウイルス感染	32	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	サイトメガロウイルス感染	51	-	なし	-	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	粘膜の炎症	51	-	なし	-	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	口内炎	51	-	なし	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	急性心不全	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	呼吸困難	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	肺塞栓症	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	細菌性気管支炎	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00744		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	口腔ヘルペス	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	体重減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	椎間板突出	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	四肢痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	無力症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	リンパ腫	605	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00774		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	細菌感染	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	咳嗽	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	嘔吐	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	下痢	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	非ホジキンリンパ腫	261	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00775		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	不整脈	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	心障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	失見当識	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	失見当識	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	胸水	76	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	認知障害	76	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	全身健康状態低下	76	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	呼吸不全	125	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00779		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	不整脈	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	心障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	結腸癌	195	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	死亡	1192	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00788		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：400 リツキシマブ：800	非ホジキンリンパ腫	460	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00810		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	大腸菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	四肢痛	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	一過性脳虚血発作	23	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	変形性関節症	115	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	リンパ腫	262	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00837		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：288 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：288 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：288 リツキシマブ：600	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：563	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：563	下痢	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	尿路感染	57	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：563	骨髄異形成症候群	233	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
		00850		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	血栓症	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	肺障害	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	急性腎不全	416	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	尿路性敗血症	416	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00872		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：740	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：740	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	84	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：700	リンパ腫	161	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00884		女性	8[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中クレアチニン増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	発疹	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	視力障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	視力障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	非ホジキンリンパ腫	298	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
	MCL	00147		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	便秘	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	虫垂炎	99	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	リンパ腫	2250	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00410		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	扁平上皮癌	2080	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	注意力障害	2263	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	全身健康状態低下	2263	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	扁平上皮癌	2266	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	2282	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00424		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	悪性新生物	-	-	なし	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	扁平上皮癌	1354	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	死亡	2037	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00426		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	咳嗽	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	リンパ腫	134	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00428		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	単純ヘルペス	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	細菌感染	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	鎖骨下静脈血栓症	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	医療機器関連感染	88	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	悪性新生物	292	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	死亡	1125	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00433		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	好中球減少症	-	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	傾眠	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	傾眠	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	傾眠	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	腺癌	233	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	死亡	1540	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	肺炎	1540	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00437		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	肺炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	肺炎	30	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	死亡	1249	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00442	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	インフルエンザ	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血栓性静脈炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	低血圧	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	低血圧	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	転倒	86	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	上腕骨骨折	86	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	非ホジキンリンパ腫	1628	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00444		男性	7[redacted]	リツキシマブ：772.5	不整脈	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：772.5	低血圧	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：772.5	過敏症	1	-	あり	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：772.5	悪寒	1	-	あり	-	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：772.5	チアノーゼ	1	-	あり	-	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：772.5	呼吸困難	1	-	あり	-	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：772.5	腹部膿瘍	1	-	あるかもしれない	-	重篤	-	回復
						リツキシマブ：772.5	呼吸数減少	1	-	あり	-	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：772.5	悪性新生物	210	-	-	Grade4	重篤	-	不明
						リツキシマブ：772.5	死亡	1150	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00447		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	膀胱刺激症状	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375	疲労	-	-	あるか	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：790				もしれない				
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	疼痛	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	膀胱刺激症状	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	疲労	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	疼痛	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	疲労	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	疼痛	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	関節痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	筋肉痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375	嘔吐	-	-	あるか	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：790				もしれない				
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：375 リツキシマブ：790	死亡	1406	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00450		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：180	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：180	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：180	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	疲労	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	便秘	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340	咳嗽	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700								
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：180	疼痛	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	疼痛	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：180	発熱	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	発熱	30	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	悪寒	63	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	Ｃ－反応性蛋白増加	63	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	背部痛	63	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	頻脈	63	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：700	発熱	63	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：180	細菌感染	94	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260	好中球減少症	155	-	あり	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260	肺扁平上皮癌、病期不明	623	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
						ベンダムスチン：260	肺炎	722	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00452		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	過敏症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	死亡	290	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00458		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	帯状疱疹	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	帯状疱疹	60	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300	リンパ腫	1050	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00460		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	過敏症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	肋間神経痛	70	-	なし	Grade2	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	413	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00462		男性	8[redacted]	ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	血小板数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	血小板数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	心障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	便秘	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：694	リンパ腫	144	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00466		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：665	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：665	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：665	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：665	疼痛	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：665	非ホジキンリンパ腫	1419	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00484		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	不整脈	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	口腔真菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	細菌感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	褥瘡性潰瘍	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	全身健康状態低下	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	便秘	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	上部消化管出血	12	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	嘔吐	12	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：290 リツキシマブ：615	非ホジキンリンパ腫	79	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00486		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン： 330	細菌感染	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	敗血症	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	発熱	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン： 330	発熱	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	過敏症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：560	過敏症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン： 330	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：330	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330	咳嗽	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330	呼吸困難	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330	喀血	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：560	下痢	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	31	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：330	細菌性肺炎	111	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：330	非ホジキンリンパ腫	339	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00487		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：100	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：100	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：100	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：100	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：100	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	過敏症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：100	心室性頻脈	45	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：100	死亡	684	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00492		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：165 リツキシマブ：667	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：633	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：633	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：633	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：633	リンパ腫	68	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
CHOP + RITUXIMAB	NHL	00102		女性	6[redacted]	リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	無力症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	背部痛	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	回転性めまい	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2	無力症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	回転性めまい	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	倦怠感	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	高カルシウム血症	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	倦怠感	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	寝汗	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	四肢痛	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 プレドニゾロン：500	肛径部痛	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 プレドニゾロン：500	口腔咽頭痛	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	背部痛	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2	背部痛	93	-	なし	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	背部痛	148	-	-	Grade3	重篤	-	不明
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪心	148	-	-	Grade4	重篤	-	不明
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	全身健康状態低下	148	-	-	Grade4	重篤	-	不明
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脊椎骨折	148	-	-	Grade4	重篤	-	不明
						リツキシマブ：641 シクロフォスファミド：1283 ドキソルビシン：86 オンコビン：2	急性腎不全	149	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
		00115		女性	4[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	腎仙痛	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-