投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	近視	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	2039	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00121		女性	5[redacted]	リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：550 シクロフォスファミド：1087 ドキソルビシン：72.5 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：50								
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：550 シクロフォスファミド：1087 ドキソルビシン：72.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：50	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：550 シクロフォスファミド：1087 ドキソルビシン：72.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：50	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：550 シクロフォスファミド：1087 ドキソルビシン：72.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：50	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1	便秘	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：550 シクロフォスファミド：1087 ドキソルビシン：72.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：50	イレウス	8	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	死亡	1640	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00122		女性	7[redacted]	リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：900 ドキソルビシン：60 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：900 ドキソルビシン：60 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：900 ドキソルビシン：60 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：900 ドキソルビシン：60 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	口内乾燥	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	体温上昇	35	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	リンパ浮腫	35	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：1100 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	白血球減少症	54	-	-	Grade4	重篤	-	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：560 シクロフォスファミド：900 ドキソルビシン：60 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	リンパ腫	2214	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00161		男性	6[redacted]	リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球減少症	9	-	あり	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	好中球減少症	9	-	あり	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	352	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00203		女性	4[redacted]	リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：600								
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：600								
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	発疹	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：600								
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：600								
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	リンパ腫	1797	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00208		男性	6[redacted]	リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：400	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2	口腔カンジダ症	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：400	口腔カンジダ症	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：400	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2	口内炎	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：400	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺の悪性新生物	1553	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00214		女性	5[redacted]	リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性浮腫	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪寒	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血栓症	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	低血圧	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	呼吸困難	58	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	深部静脈血栓症	92	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	リンパ腫	1680	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	多臓器不全	1680	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	アスペルギルス症	1680	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00220		男性	6[redacted]	リツキシマブ：100 リツキシマブ：635 シクロフォスファミド：1470 ドキソルビシン：98 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	血中ビリルビン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1470 ドキソルビシン：98 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1470 ドキソルビシン：98 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1470 ドキソルビシン：98 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 リツキシマブ：635 シクロフォスファミド：1470 ドキソルビシン：98 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1470 ドキソルビシン：98 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	40	-	-	Grade3	重篤	-	回復
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1470 ドキソルビシン：98 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球減少症	40	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	死亡	861	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00248		女性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	蛋白尿	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	全身健康状態異常	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	30	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00306		男性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	死亡	79	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00318		男性	7[redacted]	リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	無力症	153	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	食欲減退	153	-	なし	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	心不全	466	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00319		男性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	全身健康状態低下	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	心不全	82	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
		00320		女性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：8								
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ウイルス性気管支炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	真菌性気管支炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	過敏症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	疲労	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	頭痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 プレドニゾロン：8	浮腫	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内乾燥	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	血小板数減少	40	-	あり	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	過敏症	40	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	リンパ腫	427	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00511		男性	7[redacted]	リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75.6 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75.6 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75.6 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	15	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	浮動性めまい	15	-	あるかもしれない	-	重篤	-	回復
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	転倒	15	-	あるかもしれない	-	重篤	-	回復
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2	腎癌	239	-	なし	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	前立腺癌	319	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	1220	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00513		男性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	-	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00531		女性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ウイルス性扁桃炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	腎不全	335	-	-	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
		00706		女性	6[redacted]	リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	結腸癌	146	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	胆嚢癌	428	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	死亡	884	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00727		女性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	尿路感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	862	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00732		女性	6[redacted]	リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	器質化肺炎	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	器質化肺炎	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	器質化肺炎	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋力低下	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	閉塞性細気管支炎	62	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	851	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00735		女性	8[redacted]	リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	全身健康状態低下	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	白血球数減少	11	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	全身健康状態低下	11	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	白血球数減少	32	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	発熱	32	-	あり	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	顆粒球数減少	97	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	白血球数減少	97	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	消化管感染	97	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	肺炎	97	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00739		女性	7[redacted]	リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性浮腫	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	多発ニューロパチー	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	粘膜の炎症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	寝汗	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	回転性めまい	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	650	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00757		男性	6[redacted]	リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	腎出血	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	非ホジキンリンパ腫	293	-	-	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00781		女性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	1289	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00782		男性	6[redacted]	リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	味覚異常	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	頚部痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	508	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00799		女性	7[redacted]	リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	腹痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	葉状肉腫	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	乳癌	982	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00801		男性	5[redacted]	リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	真菌性性器感染	-	-	-	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺の悪性新生物	852	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00824		男性	6[redacted]	リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嚥下障害	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	味覚異常	-	-	-	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋骨格痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋骨格痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	局所腫脹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪寒	134	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	134	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	全身健康状態低下	134	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	リンパ腫	244	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪性新生物	244	-	-	Grade4	重篤	-	不明
		00853		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	食欲減退	-	-	-	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	体重減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	23	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	リンパ腫	225	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00859		女性	4[redacted]	リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	急性呼吸窮迫症候群	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	13	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	気管支肺アスペルギルス症	20	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺炎	20	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00862		女性	6[redacted]	リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	口腔カンジダ症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	溢血	3	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：710 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	上腹部痛	24	-	なし	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	全身健康状態低下	35	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	食欲減退	35	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	低血圧	35	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	非ホジキンリンパ腫	585	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00889		女性	7[redacted]	リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口腔カンジダ症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	低血圧	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	呼吸困難	1	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	胸水	1	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	55	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱性好中球減少症	55	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
	MCL	00404		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺炎	2229	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00408		女性	7[redacted]	リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	帯状疱疹	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	細菌感染	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	好中球減少症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	腎新生物	76	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	細菌性副鼻腔炎	101	-	なし	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	死亡	1985	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00411		女性	6[redacted]	リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔ヘルペス	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	発熱	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血中クレアチニン増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	発疹	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	腫瘍崩壊症候群	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	非ホジキンリンパ腫	109	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00416		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	625	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00420		男性	7[redacted]	リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	ウイルス性上気道感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	味覚異常	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	感覚鈍麻	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	感覚鈍麻	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	浮腫	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	肺炎	1094	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00422		男性	7[redacted]	リツキシマブ：727 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：727 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：727 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	1886	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	骨髄異形成症候群の転化	1886	-	なし	-	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	1927	-	なし	-	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	汎血球減少症	1927	-	なし	-	重篤	-	死亡
		00435		男性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	敗血症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	低血圧	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	細菌性肺炎	4	-	あるかもしれない	Grade2	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	処置後出血	75	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	大腸炎	153	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	イレウス	153	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	914	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00436		男性	5[redacted]	リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：1100								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：1150	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：1150	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	心筋梗塞	499	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00446		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嚥下障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘルペスウイルス感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心不全	311	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	腎不全	311	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00473		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血中ビリルビン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血中ビリルビン増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	B型肝炎	1396	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	大葉性肺炎	1396	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00481		女性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：200	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：200	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1190 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：200	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1190 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：200	過敏症	3	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1190 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	28	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	リンパ腫	535	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

*1 MedDRA/J Ver 13.0
*2 有害事象発現日は、投与開始日を 1 日目として起算

表 2.7.4.7-2 死亡例一覧（C18083/3064/NL/MN 試験）

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
BENDAMUSTINE-RITUXIMAB	NHL	001701	WHITE	男性	8[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	咳嗽	3	97	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	疲労	35	7	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	食欲減退	35	20	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	便秘	35	23	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	皮膚乾燥	35	23	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	疲労	41	14	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	消化不良	41	17	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	疲労	54	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 ベンダムスチン：186 リツキシマブ：776	剥脱性発疹	76	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 ベンダムスチン：186 リツキシマブ：776	下痢	78	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	白血球数減少	120	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	好中球数減少	120	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	白血球数減少	127	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	好中球数減少	127	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	白血球数増加	133	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	好中球減少症	133	16	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	白血球数減少	148	9	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	好中球減少症	148	9	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	肋骨骨折	155	-	なし	Grade2	重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	肺水腫	155	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	胸水	155	6	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	低酸素症	155	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	白血球数増加	156	20	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	末梢性浮腫	157	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														あり）
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	胸水	160	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	ヘモグロビン減少	169	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	発疹	171	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	白血球数減少	175	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	好中球減少症	175	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	002409	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	注入に伴う反応	1	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	低マグネシウム血症	1	92	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	注入に伴う反応	1	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	下痢	8	113	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	疲労	13	36	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	浮動性めまい	15	50	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	起立性低血圧	46	1	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	無力症	49	12	不明	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	疲労	49	13	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	脱水	50	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復