投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	貧血	50	78	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	体重減少	64	-	不明	Grade2	非重篤	減量	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	下痢	121	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	低マグネシウム血症	121	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	悪心	125	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	浮動性めまい	125	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	起立性低血圧	125	1	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	貧血	127	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	心停止	134	1	不明	Grade5	重篤	投与中止	死亡
	NHL	002502	WHITE	女性	8[redacted]	ベンダムスチン：135 リツキシマブ：548	食欲減退	1	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：548	便秘	15	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：548	低血圧	15	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	無力症	34	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	上気道感染	62	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	疲労	69	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	疼痛	69	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	気管支炎	77	5	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	慢性閉塞性肺疾患	77	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	呼吸不全	77	5	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	不眠症	81	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	肺塞栓症	85	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	気道うっ血	90	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	ＩＮＲ増加	90	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	各種物質毒性	95	10	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	吐血	95	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	喀血	95	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	十二指腸炎	97	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	喀血	115	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	腹膜ヘルニア	116	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	呼吸困難	118	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	ＩＮＲ減少	118	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	好中球減少症	125	60	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	貧血	146	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	発声障害	146	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	鼻出血	146	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	筋骨格系胸痛	146	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	上気道感染	146	38	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	肺炎	170	11	なし	Grade3	重篤	なし	回復
	NHL	003032	WHITE	男性	7[redacted]	ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	薬物過敏症	1	1	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	振戦	3	13	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	歯の知覚過敏	12	18	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	好中球減少症	22	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	発声障害	53	5	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	口腔咽頭痛	53	5	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	歯肉腫脹	77	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	血小板減少症	92	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	白血球減少症	92	36	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	貧血	92	43	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	副鼻腔炎	101	12	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	副鼻腔炎	113	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	咳嗽	116	9	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	慢性気管支炎	122	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	血小板減少症	134	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	脱水	136	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	嘔吐	136	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	ウイルス性消化管感染	136	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	悪心	136	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	不眠症	141	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	貧血	148	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	血小板減少症	148	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	気管気管支炎	167	4	なし	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	004702	WHITE	男性	7[redacted]	ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	発熱	13	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	疲労	19	66	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	頭痛	29	57	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	胸膜痛	34	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	多汗症	39	47	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	呼吸困難	60	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	悪性胸水	79	7	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	疲労	85	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	肺の悪性新生物	85	184	なし	Grade3	重篤	投与中止	軽快
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	肺の悪性新生物	268	1	なし	Grade5	重篤	なし	死亡
	MCL	006607	WHITE	男性	7[redacted]	ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	夜間頻尿	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	腫瘍崩壊症候群	2	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	低アルブミン血症	29	29	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	好中球減少症	36	8	あり	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語)[*1]	有害事象発現日[*2](投与●日目)	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置(継続、投与中止等)	転帰
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	白血球減少症	36	15	あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：165 リツキシマブ：690	体重減少	36	77	なし	Grade2	非重篤	減量	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：690	眼瞼紅斑	83	30	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：690	上気道感染	89	24	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：690	悪心	112	30	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：690	心電図ＱＴ延長	133	1	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
	NHL	015002	WHITE	男性	6[redacted]		心電図異常	-6	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	1	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	投与中断	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	悪心	2	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	疲労	3	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	リンパ球減少症	8	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	側腹部痛	11	10	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	嘔吐	13	2	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	腎盂腎炎	13	16	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	便秘	14	5	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	腎結石症	17	6	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	58	1	不明	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	58	1	不明	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	58	1	不明	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	86	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	86	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	注入に伴う反応	86	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	潮紅	87	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	好中球減少症	98	22	なし	Grade4	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
	NHL	020005	WHITE	男性	4[redacted]	ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	味覚異常	1	-	あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	聴覚過敏	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	疲労	1	5	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	羞明	1	63	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	咳嗽	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	潮紅	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	筋骨格系胸痛	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	発疹	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	消化不良	3	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪心	3	58	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	嘔吐	3	58	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	熱傷	25	46	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪寒	29	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	29	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	57	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	熱感	57	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	疲労	85	5	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪心	85	6	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	四肢痛	110	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	鼻炎	114	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪寒	131	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	疲労	143	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	多汗症	153	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	肺炎	159	4	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	肺塞栓症	159	4	あるかもしれない	Grade4	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	肺塞栓症	162	127	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	高血圧	165	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	030506	WHITE	男性	5[redacted]		疲労	-7	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	不眠症	27	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	筋骨格痛	30	182	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	末梢性感覚ニューロパチー	31	2	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	注入に伴う反応	58	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	便秘	59	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	腹痛	86	1	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	悪心	86	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	不安	120	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	発熱	131	7	多分あり	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中ブドウ糖増加	149	-	不明	Grade3	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	胸膜痛	160	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	便秘	178	2	あるかもしれない	Grade2	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	腹痛	184	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	悪心	184	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中カリウム減少	184	28	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	胃食道逆流性疾患	184	29	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	便秘	186	22	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中マグネシウム減少	186	24	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	好中球数減少	187	3	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	咳嗽	189	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	低酸素症	189	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	低血圧	189	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	貧血	189	23	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	トロポニン増加	190	22	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	激越	191	18	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	肺水腫	191	21	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	194	19	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	好中球数減少	196	11	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中リン減少	200	9	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中アルブミン減少	202	10	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	低血圧	202	11	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
	MCL	050703	WHITE	男性	5[redacted]		勃起不全	-	2010-11-18	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
							四肢痛	-15	45	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							末梢性浮腫	-15	77	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	疼痛	3	237	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	鼻閉	16	2010-10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	口腔咽頭痛	16	2010-10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	16	7	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	22	26	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	白血球減少症	42	6	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	好中球減少症	42	6	あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	貧血	42	21	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	70	8	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	77	7	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	好中球減少症	77	7	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	83	18	あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	100	15	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	114	15	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	128	15	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	142	15	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	156	8	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	163	22	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	慢性閉塞性肺疾患	175	30	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	184	34	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	好中球減少症	191	7	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
							頭痛	-	2011-05	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	慢性閉塞性肺疾患	204	70	不明	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	217	-	あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	慢性閉塞性肺疾患	273	114	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	060001	WHITE	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	上腹部痛	1	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	悪心	3	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	便秘	3	2	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	カテーテル留置部位疼痛	5	10	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	無力症	31	9	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	歯痛	41	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	無力症	50	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	頭痛	51	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	腹部膨満	51	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	腹痛	56	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	腹部膨満	56	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	血中乳酸脱水素酵素増加	84	-	なし	Grade3	非重篤	投与中止	不明
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	脾腫	87	1	なし	Grade4	重篤	投与中止	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	急性呼吸不全	138	1	なし	Grade5	重篤	なし	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	070001	OTHER	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	脂肪織炎	10	38	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	急性中耳炎	13	42	不明	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	ＩＮＲ増加	19	39	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	白血球減少症	19	44	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	鼓膜穿孔	20	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	カンジダ症	21	26	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	回転性めまい	37	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	直腸出血	40	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	鉄欠乏性貧血	43	20	不明	Grade3	非重篤	なし	不明
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	好中球減少症	57	3	あり	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	肺炎	57	6	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	呼吸不全	57	6	あるかもしれ	Grade5	重篤	なし	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	敗血症性ショック	61	2	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
RITUXIMAB-CHOP	NHL	004102	WHITE	男性	5[redacted]	リツキシマブ：770 シクロフォスファミド：1540 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：770 シクロフォスファミド：1540 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	味覚異常	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：770 シクロフォスファミド：1540 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	2	63	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：770 シクロフォスファミド：1540 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	22	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：770 シクロフォスファミド：1540 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	感覚鈍麻	22	43	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	MCL	005805	WHITE	男性	6[redacted]		高尿酸血症	-7	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	食欲減退	1	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	背部痛	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	呼吸困難	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	1	52	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	骨痛	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔内痛	11	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔内潰瘍形成	11	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	14	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	四肢痛	14	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	15	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	慢性副鼻腔炎	15	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	22	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	潮紅	22	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胸部不快感	22	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	43	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	51	21	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	52	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	71	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	78	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	99	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	141	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	155	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	162	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	162	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	162	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
	MCL	015501	WHITE	男性	7[redacted]	リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胸膜炎	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	1	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	インフルエンザ様疾患	1	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低酸素症	1	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発声障害	5	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	排尿困難	8	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔カンジダ症	8	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	8	99	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	12	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	14	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	歯感染	15	2	なし	Grade4	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱水	15	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	8	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	22	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球増加症	22	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	22	43	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	レンサ球菌性咽頭炎	49	16	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	感覚鈍麻	62	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	尿路閉塞	64	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋骨格痛	105	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	帯状疱疹	105	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	040003	WHITE	女性	6[redacted]	リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1250 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道感染	7	9	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1250 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	食欲減退	15	9	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1250 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	9	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1250 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	23	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1250 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	消化不良	50	50	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1250 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	99	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1250 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	119	9	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
	MCL	050901	WHITE	女性	6[redacted]		傾眠	-26	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							無力症	-4	5	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	そう痒性皮疹	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	眼そう痒症	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	1	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	1	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	1	21	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67	便秘	5	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						オンコビン：2 プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	11	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	22	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	22	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	35	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	36	7	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	36	7	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	51	7	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	51	7	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67	貧血	57	7	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						オンコビン：2 プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道感染	58	13	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肛門感染	78	3	なし	Grade3	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	78	3	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	78	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	78	3	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肛門感染	81	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ節炎	101	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口内炎	101	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67	口腔内潰瘍形成	101	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						オンコビン：2 プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	108	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	鼻部不快感	108	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	流涙増加	108	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	115	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	115	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	舌潰瘍	116	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	119	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	122	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ:650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67	好中球減少症	122	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						オンコビン：2 プレドニゾロン：100								
RITUXIMAB-CVP	MCL	003303	WHITE	男性	7[redacted]	リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	嘔吐	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	3	13	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	3	21	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	そう痒性皮疹	8	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	味覚異常	9	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	9	7	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胃炎	22	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	心房細動	22	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中アルブミン減少	22	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中ビリルビン増加	22	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上腹部痛	22	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	22	24	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	傾眠	29	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	29	8	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	29	15	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	29	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	32	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	36	8	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	43	11	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	45	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	45	6	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	53	3	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	53	3	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中ビリルビン増加	53	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	57	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中ビリルビン増加	60	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：713 シクロフォスファミド：1425 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	62	3	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	004604	AMERICAN INDIAN OR ALASKAN NATIVE	男性	7[redacted]		ヘモグロビン減少	-2	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	薬物過敏症	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	4	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	21	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低カルシウム血症	21	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球数減少	21	7	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	22	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	流涙増加	22	98	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	22	112	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	薬物過敏症	28	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血糖	49	21	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うつ病	49	64	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋骨格痛	64	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋力低下	70	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口内炎	70	43	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血糖	91	35	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球数減少	105	7	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	111	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	112	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低アルブミン血症	112	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血糖	126	7	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
	MCL	070103	WHITE	男性	7[redacted]		リンパ腫	-6	287	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
							リンパ腫	-5	286	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	激越	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	失見当識	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	倦怠感	1	281	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	食欲減退	4	278	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
	NHL	070303	OTHER	女性	7[redacted]	リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	6	6	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	食欲減退	6	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	汎血球減少症	6	6	なし	Grade4	非重篤	なし	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	糖尿病性昏睡	7	5	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低アルブミン血症	7	5	なし	Grade2	非重篤	なし	不明
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	敗血症性ショック	7	5	なし	Grade4	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔カンジダ症	8	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	皮膚潰瘍	8	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	斑状出血	9	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語)*1	有害事象発現日*2（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	敗血症性ショック	11	1	なし	Grade5	重篤	なし	死亡

*1 MedDRA/J Ver 15.0
*2 有害事象発現日は、投与開始日を 1 日目として起算

表 2.7.4.7- 3 重篤な有害事象を発現した症例一覧（2011002 試験）

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m²)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫	02-02	-	女性	7[redacted]	90	375	便秘	4	125	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	悪心	31	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	口内炎	111	18	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中アルブミン減少	8	100	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中ビリルビン増加	8	9	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中尿酸増加	16	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	23	57	関連性あり	3	非重篤	変更なし	不変
					90	375	リンパ球数減少	8	50	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	64	60	関連性あり	4	非重篤	変更なし	軽快
					90	375	好中球数減少	37	10	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	72	36	関連性あり	4	非重篤	休薬	軽快
					90	375	血小板数減少	16	22	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	46	12	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	72	22	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	16	42	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	白血球数減少	64	44	関連性あり	3	非重篤	変更なし	不変
					90	375	腫瘍崩壊症候群	4	4	関連性あり	3	重篤	変更なし	回復
					90	375	筋骨格硬直	17	112	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
							乳癌	217	240	関連性あり	3	重篤	変更なし	軽快
					90	375	発疹	14	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発疹	48	81	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	静脈炎	37	10	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫	02-06	-	女性	5[redacted]	90	375	悪心	8	1	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	8	1	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	注入に伴う反応	-1	1	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中免疫グロブリンＡ減少	23	295	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	23	295	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	9	50	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	ヘモグロビン減少	10	22	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	8	310	関連性あり	4	非重篤	変更なし	不変
					90	375	好中球数増加	9	4	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	血小板数減少	11	5	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	赤血球数減少	10	6	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	体重増加	-1	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	13	305	関連性あり	2	非重篤	変更なし	不変
					90	375	白血球数増加	9	3	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	8	3	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	不眠症	18	60	関連性なし	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	アレルギー性皮膚炎	8	157	関連性なし	3	重篤	休薬	回復
低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫	06-01	-	女性	4[redacted]	90	375	発熱性好中球減少症	98	9	関連性あり	3	重篤	減量	回復
					90	375	下痢	61	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	下痢	90	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	下痢	96	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	下痢	100	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	下痢	102	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	3	13	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	23	5	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	悪心	33	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	37	1	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	60	9	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	85	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	3	4	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	9	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	23	3	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	33	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	37	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	60	3	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	63	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	88	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	嘔吐	169	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	胸痛	141	35	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	疲労	34	142	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	疼痛	143	33	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	発熱	63	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発熱	97	6	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	尿路感染	8	4	関連性なし	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	尿路感染	21	8	関連性なし	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	尿路感染	97	10	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	105	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中免疫グロブリンM減少	103	332	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	91	10	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	105	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	Ｃ－反応性蛋白増加	1	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	Ｃ－反応性蛋白増加	98	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	49	31	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					60	375	ＣＤ４リンパ球減少	161	113	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	1	378	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	35	36	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	91	13	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	好中球数減少	113	21	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	141	14	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	161	24	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	29	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	79	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	91	23	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	総蛋白減少	103	11	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	5	430	関連性あり	4	非重篤	変更なし	軽快
					90	375	高カリウム血症	14	16	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	高尿酸血症	5	4	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	低ナトリウム血症	91	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	3	8	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	23	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	58	26	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	87	21	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	関節痛	35	6	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	関節痛	42	27	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	関節痛	97	6	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	頭痛	23	18	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	頭痛	61	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	頭痛	169	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	末梢性ニューロパチー	30	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	末梢性ニューロパチー	59	9	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	末梢性ニューロパチー	116	60	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	感覚障害	157	19	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	そう痒症	12	10	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発疹	12	10	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発疹	29	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血管痛	58	47	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫	06-02	-	女性	5[redacted]	90	375	下痢	117	4	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	32	4	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発熱	3	6	関連性あり	1	重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	発熱	8	4	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	鼻咽頭炎	169	7	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	細菌感染	5	6	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	注入に伴う反応	-1	2	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	9	20	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	57	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	7	22	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	50	29	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中免疫グロブリンM減少	50	323	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	9	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	134	30	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	Ｃ－反応性蛋白増加	5	11	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	106	29	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	163	98	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	7	37	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	3	3	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	リンパ球数減少	64	8	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	85	22	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	120	15	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	148	8	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	64	8	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	78	15	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	148	8	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	163	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	28	107	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	141	232	関連性あり	3	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中アルカリホスファターゼ増加	7	16	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	頭痛	142	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	そう痒症	9	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発疹	9	10	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発疹	135	30	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血管痛	29	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	血管痛	49	147	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫	08-01	-	女性	5[redacted]	90	375	貧血	1	5	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	貧血	23	11	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発熱性好中球減少症	21	13	関連性あり	3	重篤	減量	回復
					90	375	便秘	5	325	関連性あり	2	非重篤	変更なし	不変
					60	375	齲歯	187	52	関連性なし	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	悪心	4	6	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	倦怠感	106	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	倦怠感	140	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	倦怠感	168	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	発熱	79	6	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	注入に伴う反応	-1	3	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中免疫グロブリンA減少	21	309	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	血中免疫グロブリンG減少	98	232	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中免疫グロブリンM減少	21	309	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	21	9	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	ＣＤ４リンパ球減少	98	29	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					60	375	ＣＤ４リンパ球減少	182	92	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好酸球数増加	23	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好酸球数増加	63	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好酸球数増加	112	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好酸球数増加	126	6	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好酸球数増加	154	22	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好酸球数増加	189	50	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	1	42	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					60	375	リンパ球数減少	54	73	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					60	375	リンパ球数減少	140	99	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	単球数減少	1	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	単球数減少	7	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	9	4	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	14	16	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	112	8	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	好中球数減少	126	6	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	140	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	154	22	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	182	148	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数増加	33	10	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数増加	91	8	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数増加	147	8	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	1	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	21	13	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	75	10	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	91	22	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	126	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	147	64	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	総蛋白減少	112	127	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	尿蛋白	21	55	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	5	25	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	白血球数減少	42	50	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	98	22	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	126	22	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	154	22	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	182	148	関連性あり	3	非重篤	変更なし	軽快
					90	375	白血球数増加	2	4	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数増加	33	10	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数増加	91	8	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球百分率増加	119	8	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	不眠症	2	74	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	多形紅斑	5	11	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	多形紅斑	191	48	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫	12-05	-	女性	6[redacted]	90	375	発熱性好中球減少症	108	7	関連性あり	3	重篤	変更なし	回復
					90	375	便秘	1	12	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	3	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	悪心	59	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	悪心	89	12	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	倦怠感	3	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	倦怠感	59	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	倦怠感	86	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	肝機能異常	134	20	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	鼻咽頭炎	44	15	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	58	9	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	58	9	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中免疫グロブリンA減少	23	194	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中免疫グロブリンG減少	23	194	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中免疫グロブリンM減少	51	166	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	44	23	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	72	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	107	19	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	134	20	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中乳酸脱水素酵素増加	163	54	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	Ｃ－反応性蛋白増加	44	15	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	Ｃ－反応性蛋白増加	72	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	Ｃ－反応性蛋白増加	100	19	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	23	194	関連性あり	3	非重篤	変更なし	不変
					90	375	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	44	173	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	7	52	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	93	15	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	118	17	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	153	11	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	16	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	44	15	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	107	8	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	125	15	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	146	22	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	174	22	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	総蛋白減少	7	210	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	体重減少	107	33	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	16	43	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	107	8	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	125	15	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	146	22	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	174	22	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	86	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	149	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	口腔咽頭不快感	44	15	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発疹	105	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫	15-02	-	女性	6[redacted]	90	375	細胞遺伝学的異常	135	295	関連性あり	2	重篤	変更なし	不変
					90	375	便秘	2	134	関連性あり	2	非重篤	変更なし	軽快
					90	375	悪心	1	18	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	嘔吐	4	12	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	倦怠感	63	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発熱	8	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	発熱	14	3	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中ビリルビン増加	6	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血中免疫グロブリンＡ減少	35	353	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中免疫グロブリンＧ減少	84	304	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	血中免疫グロブリンＭ減少	44	344	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	28	108	関連性あり	3	非重篤	変更なし	不変
					90	375	リンパ球数減少	1	51	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	59	371	関連性あり	4	非重篤	変更なし	軽快
					90	375	好中球数減少	9	20	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	51	9	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	63	283	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数増加	31	14	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数増加	59	5	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	8	21	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	30	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	58	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					90	375	白血球数減少	63	367	関連性あり	3	非重篤	変更なし	不変
					90	375	白血球数増加	31	5	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	食欲減退	3	9	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	頻尿	34	102	関連性あり	2	非重篤	変更なし	不変
					90	375	口腔咽頭痛	19	10	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発疹	9	127	関連性あり	2	非重篤	変更なし	軽快
					90	375	血管炎	30	6	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫	18-06	-	男性	7[redacted]	90	375	白血球増加症	31	4	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	心房頻脈	148	6	関連性なし	2	重篤	変更なし	回復
					60	375	口唇炎	107	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	便秘	3	77	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	便秘	204	17	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					90	375	悪心	4	6	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	胸痛	-1	1	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発熱	29	1	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	発熱	46	1	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	発熱	53	1	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	発熱	130	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	発熱	156	13	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	サイトメガロウイルス感染	191	14	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	鼻咽頭炎	93	28	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	アスペルギルス感染	178	43	関連性あり	2	非重篤	変更なし	軽快
					60	375	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	59	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	49	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	59	5	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	199	22	関連性なし	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	血中免疫グロブリンA減少	63	158	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	血中免疫グロブリンG減少	63	158	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	血中免疫グロブリンM減少	63	158	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	ＣＤ４リンパ球減少	93	128	関連性あり	3	非重篤	変更なし	不変
					60	375	好中球数減少	79	9	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	98	10	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	好中球数減少	168	11	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	199	12	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	213	8	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数増加	31	4	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血小板数減少	22	10	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	49	11	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	79	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	114	55	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	血小板数減少	178	43	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	白血球数減少	79	9	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	98	10	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	136	8	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	164	15	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	185	7	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	199	15	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	心電図ＳＴ－Ｔ部分異常	-1	1	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	血中アルカリホスファターゼ増加	49	172	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	糖尿病	93	128	関連性なし	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	味覚異常	143	78	関連性あり	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	不眠症	88	133	関連性なし	1	非重篤	変更なし	不変
					60	375	尿閉	210	4	関連性なし	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	上気道の炎症	199	12	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	剥脱性皮膚炎	31	4	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	そう痒症	12	76	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	斑状丘疹状皮疹	12	27	関連性あり	3	非重篤	減量	回復
					60	375	斑状丘疹状皮疹	49	39	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	潮紅	69	2	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	血管痛	1	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
マントル細胞リンパ腫	18-04	-	女性	7[redacted]	90	375	貧血	2	27	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	貧血	36	245	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	リンパ節炎	77	8	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	便秘	6	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	下痢	64	2	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	口内炎	149	11	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	注射部位反応	63	17	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	倦怠感	3	4	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	倦怠感	101	2	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					60	375	末梢性浮腫	91	6	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	発熱	44	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	低γグロブリン血症	47	465	関連性あり	2	非重篤	変更なし	不変
					90	375	サイトメガロウイルス性肺炎	56	51	関連性あり	3	重篤	変更なし	回復
					90	375	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	13	16	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	56	22	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	13	11	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	56	17	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	ＣＤ４リンパ球減少	19	96	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好酸球数増加	16	41	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	リンパ球数減少	5	92	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象[*1]	発現日[*2](投与●日目)	持続期間(●日間)	治験薬との関連性	重症度(Grade)	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	リンパ球数減少	99	5	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	リンパ球数減少	127	36	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	19	10	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	好中球数減少	36	31	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	68	5	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	75	17	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	96	4	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	106	9	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					60	375	好中球数減少	131	68	関連性あり	4	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	5	24	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	白血球数減少	36	37	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	75	29	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	106	9	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					60	375	白血球数減少	131	68	関連性あり	3	非重篤	変更なし	回復
					90	375	不眠症	29	357	関連性あり	1	非重篤	変更なし	軽快
					90	375	湿性咳嗽	38	3	関連性あり	1	非重篤	変更なし	回復

解析対象集団：登録例

病型	症例番号	人種	性別	年齢(歳)	投与量(mg/m^2)		有害事象*1	発現日*2（投与●日目）	持続期間（●日間）	治験薬との関連性	重症度（Grade）	重篤／非重篤	治験薬投与の変更	転帰
					SyB L-0501	リツキシマブ								
					60	375	皮膚乾燥	79	7	関連性なし	1	非重篤	変更なし	回復
					90	375	斑状丘疹状皮疹	20	9	関連性あり	2	非重篤	変更なし	回復
					90	375	斑状丘疹状皮疹	33	16	関連性あり	3	非重篤	減量	回復

*1 MedDRA/J Ver 16.1
*2 有害事象発現日は、投与開始日を 1 日目として起算

表 2.7.4.7-4 重篤な有害事象を発現した症例一覧（NHL 1-2003 試験）

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
BENDAMUSTINE + RITUXIMAB	NHL	00103		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	肺障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：687	認知症	880	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00106		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	ウイルス性上気道感染	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	敗血症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	心血管障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	敗血症	740	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00108		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれ	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	死亡	170	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00130		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：286 リツキシマブ：875	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：875	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	ヘルペスウイルス感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	帯状疱疹	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	陰部ヘルペス	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：875	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	無力症	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	便秘	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：585	肺炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：875	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：296 リツキシマブ：615	肺炎	2	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00136		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	単径ヘルニア	311	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	胆管狭窄	319	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	心筋梗塞	358	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00138		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	発熱	-	-	あるかもしれ	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	蛋白尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：630	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	胸水	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	胸水	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	胸水	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	胸水	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：630	胸水	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	胸水	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：630	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	発熱	11	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00141		男性	4[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	血小板数減少	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	腹部膨満	-	-	あるかもしれ	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	初期不眠症	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：800	サルモネラ菌性胃腸炎	139	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00154		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	疼痛	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	B細胞性リンパ腫	170	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00159		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	下痢	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：670	イレウス	96	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：670	腹壁膿瘍	130	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：670	ブドウ球菌性敗血症	1882	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00166		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：578								
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：578	薬物過敏症	726	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00183		女性	3[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：246 リツキシマブ：670	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：246 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：670	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球減少症	83	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00184	WHITE	男性	5[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	細菌感染	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	悪寒	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：740	胃腸炎	175	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00192		女性	4[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：325 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：325 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	95	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：325 リツキシマブ：700	白血球減少症	95	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	非ホジキンリンパ腫	754	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00193		男性	4[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	四肢痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	非ホジキンリンパ腫	951	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00209		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	挫傷	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	口内乾燥	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	口内乾燥	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	多発骨折	96	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	交通事故	96	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00219		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：400 リツキシマブ：700	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：400 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：400 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：400 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：400 リツキシマブ：700	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：400 リツキシマブ：700	胞隔炎	25	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00226		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	単純ヘルペス	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	粘膜の炎症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	顆粒球数減少	36	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	発熱	38	-	-	Grade2	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：550	心血管不全	40	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡
		00230		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	帯状疱疹	165	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	リンパ腫	345	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：250 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	544	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00232		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：315 リツキシマブ：640	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：315 リツキシマブ：640	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：315 リツキシマブ：640	背部痛	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：306 リツキシマブ：640	注入に伴う反応	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：306 リツキシマブ：640	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：640	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：306 リツキシマブ：640	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：306 リツキシマブ：640	点状出血	3	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00233		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	感染性静脈炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	背部痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	眼窩周囲血腫	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	網膜静脈血栓症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	後腹膜膿瘍	62	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00239		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	蛋白尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	平衡障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	筋肉痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-