投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	精神病性障害	85	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
		00245		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：300	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：612	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：300	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：612	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：100 リツキシマブ：600	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：300	死亡	860	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00307		男性	6[redacted]	リツキシマブ：800	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：90 ベンダムスチン：100 リツキシマブ：800	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：193 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：386 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれ	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：386 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：90 ベンダムスチン：100 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800	発熱	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：90 ベンダムスチン：100 リツキシマブ：800	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：193 リツキシマブ：800	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：386 リツキシマブ：800	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：386 リツキシマブ：800	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：386 リツキシマブ：800	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：90 ベンダムスチン：100 リツキシマブ：800	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：90 ベンダムスチン：100 リツキシマブ：800	咳嗽	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：193 リツキシマブ：800	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800	蜂巣炎	135	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00312		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：150	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	血小板数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	過敏症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150	敗血症	396	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00315		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	肺塞栓症	106	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	胸痛	146	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	胸部不快感	201	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	非ホジキンリンパ腫	1083	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00316		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	ウイルス性消化管感染	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	外陰腟真菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	イレウス	88	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	下痢	88	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：700	死亡	97	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00317		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中ビリルビン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	ウイルス性気管支炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	疲労	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：720	敗血症	415	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00479		男性	6■	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	肺炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	脳梗塞	17	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：730	死亡	672	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00483		男性	7■	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	悪寒	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	疲労	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	側腹部痛	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	脊椎手術	2	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00501		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	腎細胞癌	1092	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00506		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：364 リツキシマブ：800	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：364 リツキシマブ：800	真菌性肺炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：364 リツキシマブ：800	発熱	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	過敏症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：364 リツキシマブ：800	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	Ｃ－反応性蛋白増加	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	原発性異型肺炎	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	発熱	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：364 リツキシマブ：800	原発性異型肺炎	13	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00508		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	心筋梗塞	1858	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00525		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	脱水	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	浮腫	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	汎血球減少症	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	腎不全	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	肺障害	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	心停止	52	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	心不全	52	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	貧血	52	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00535		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	肺腺癌	1552	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
		00540		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：125 リツキシマブ：660	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：125 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	死亡	1371	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00541		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	非ホジキンリンパ腫	492	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00544		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	細菌感染	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	真菌性性器感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	腹水	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	死亡	614	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00545		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	口腔カンジダ症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	便秘	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	疲労	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	無力症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	無力症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	下痢	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	嘔吐	5	-	あり	Grade1	重篤	-	回復
		00550		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：663	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	大腸菌性尿路感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：663	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：294 リツキシマブ：700	霧視	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：294 リツキシマブ：700	筋痙縮	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	頭痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	鼻咽頭炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	体重減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	71	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	死亡	399	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：700	直腸癌	399	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00555		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	血尿	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	頻尿	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	そう痒症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	そう痒症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	そう痒症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：328 リツキシマブ：683	耳下腺炎	131	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00558		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	細菌感染	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	細菌感染	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	湿性咳嗽	125	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	全身健康状態低下	125	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	肺炎	139	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	200	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00601		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	顆粒球数減少	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	白血球数減少	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	トランスアミナーゼ上昇	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	嘔吐	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	下痢	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：570	食道腺癌	1628	-	なし	Grade1	重篤	-	不明
		00608		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：100	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：100	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：100	全身健康状態低下	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：100	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：788	感染	17	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：380 リツキシマブ：100	注入に伴う反応	29	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00609		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	発熱	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	発疹	11	-	あるかもしれない	Grade2	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	ウイルス感染	11	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：668	薬物過敏症	38	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00612		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中ビリルビン増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発疹	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発疹	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発熱	30	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
		00702		女性	8[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	白血球数減少	162	-	あり	Grade3	重篤	-	回復
		00707		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：670	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：670	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	抑うつ気分	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	浮動性めまい	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：670	口内乾燥	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	脾腫	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：670	胃障害	-	-	-	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	胃障害	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	胃障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	胃障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	自殺企図	73	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：670	薬物毒性	73	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：670	前立腺癌	482	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00717		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	1477	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00730		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：164 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：800	過敏症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：800	発疹	-	-	あるかもしれ	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：800	口内乾燥	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：800	異常感	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：800	失神	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：800	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：800	低血圧	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：700	浮腫	139	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	139	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：700	失神	139	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00736		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	骨痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	高血圧	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	落ち着きのなさ	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	睡眠障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	回転性めまい	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	1033	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00737		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	ウイルス感染	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	発疹	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	サイトメガロウイルス感染	-	-	なし	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	便秘	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	口内炎	-	-	なし	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	便秘	8	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	尿路感染	8	-	-	-	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	サイトメガロウイルス感染	32	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	サイトメガロウイルス感染	51	-	なし	-	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	粘膜の炎症	51	-	なし	-	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	口内炎	51	-	なし	Grade3	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	急性心不全	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	呼吸困難	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	肺塞栓症	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	細菌性気管支炎	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00744		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	口腔ヘルペス	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	体重減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	椎間板突出	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	四肢痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	無力症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：266 リツキシマブ：555	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：260 リツキシマブ：540	リンパ腫	605	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00748		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	静脈炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	前立腺癌	964	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
		00753		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	細菌感染	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	細菌感染	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	細菌感染	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	細菌性尿路感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	発熱	75	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	白血球減少症	75	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：650	尿路感染	75	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00762		男性	8[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	新生物	1009	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00774		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	細菌感染	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	咳嗽	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	嘔吐	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	下痢	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：638	非ホジキンリンパ腫	261	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00775		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	不整脈	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	心障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	失見当識	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	失見当識	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	肺障害	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	胸水	76	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	認知障害	76	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	全身健康状態低下	76	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：324 リツキシマブ：675	呼吸不全	125	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00779		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	不整脈	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	心障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	結腸癌	195	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：378 リツキシマブ：787	死亡	1192	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00788		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：400 リツキシマブ：800	非ホジキンリンパ腫	460	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00810		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	大腸菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	四肢痛	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：286 リツキシマブ：596	一過性脳虚血発作	23	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	変形性関節症	115	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：581	リンパ腫	262	-	-	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00835		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	前立腺癌	716	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00837		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：288 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：288 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：288 リツキシマブ：600	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：563	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：563	下痢	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：384 リツキシマブ：600	尿路感染	57	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：270 リツキシマブ：563	骨髄異形成症候群	233	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
		00850		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	血栓症	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：330 リツキシマブ：690	肺障害	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	急性腎不全	416	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：690	尿路性敗血症	416	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00857		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	心障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	尿路感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	口腔灼熱感症候群	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	口腔灼熱感症候群	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	灼熱感	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	便秘	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	おくび	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	ほてり	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	関節腫脹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	四肢痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	四肢痛	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	便秘	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	便秘	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	便秘	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	高血圧	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：800	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：800	胃炎	445	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00863		男性	4[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	四肢痛	38	-	あるかもしれない	Grade2	重篤	-	回復
		00872		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：740	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：740	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：700	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：700	全身健康状態低下	84	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：700	リンパ腫	161	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00873		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：298 リツキシマブ：619	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：232 リツキシマブ：619	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	血小板数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：232 リツキシマブ：619	脱毛症	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：232 リツキシマブ：619	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：158 リツキシマブ：589	食欲減退	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：232 リツキシマブ：619	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：232 リツキシマブ：619	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：158 リツキシマブ：589	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	発熱	119	-	あるかもしれない	Grade2	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	悪寒	119	-	-	-	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	体重減少	134	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	全身健康状態低下	134	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	嘔吐	134	-	あるかもしれない	Grade1	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：589	下痢	134	-	あるかもしれない	Grade2	重篤	-	回復
		00876		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：667	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	トランスアミナーゼ上昇	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	トランスアミナーゼ上昇	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	疲労	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	悪寒	12	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	胆嚢切除	12	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：326 リツキシマブ：679	発熱	12	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00878		女性	5[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	鼻乾燥	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	頭痛	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	睡眠障害	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	皮膚乾燥	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	頭痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	皮膚乾燥	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	頭痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	寝汗	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	T細胞性リンパ腫	257	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00879		男性	4[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	大腸炎	66	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00884		女性	8[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	血中クレアチニン増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	発疹	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	視力障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	視力障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：660	非ホジキンリンパ腫	298	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	10502		男性	5[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	不整脈	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	食欲障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	頭痛	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	食欲障害	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	そう痒症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	腎臓痛	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	回転性めまい	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	紅斑	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	腎臓痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	回転性めまい	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	腎臓痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	便秘	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	紅斑	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	リンパ節症	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	浮動性めまい	17	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	眼振	17	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00147		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	便秘	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	虫垂炎	99	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：645	リンパ腫	2250	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00218		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：175 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：175 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：175 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：175 リツキシマブ：600	発熱	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	発熱	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：175 リツキシマブ：600	過敏症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	過敏症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：175 リツキシマブ：600	低血圧	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：175 リツキシマブ：600	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：600	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：600	腎癌	1528	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00410		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	扁平上皮癌	2080	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	注意力障害	2263	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	全身健康状態低下	2263	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	扁平上皮癌	2266	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	死亡	2282	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00414		女性	7[redacted]	ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：240 リツキシマブ：600	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	白血球数減少	119	-	あり	Grade3	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	発熱	119	-	-	Grade2	重篤	-	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：280 リツキシマブ：600	四肢痛	119	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00415		男性	6[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	心障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	鼻咽頭炎	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	細菌感染	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	細菌感染	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	カンジダ症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：100 リツキシマブ：650	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	関節痛	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	下痢	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	下痢	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	気管支肺炎	30	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00424		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	悪性新生物	-	-	なし	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	扁平上皮癌	1354	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：700	死亡	2037	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00426		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれ	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	咳嗽	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	リンパ腫	134	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00427		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	血尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	水腎症	9	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：360 リツキシマブ：750	胆石症	26	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00428		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	単純ヘルペス	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	細菌感染	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	鎖骨下静脈血栓症	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：750	医療機器関連感染	88	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	悪性新生物	292	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：350 リツキシマブ：700	死亡	1125	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00433		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	好中球減少症	-	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	傾眠	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	疲労	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	傾眠	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	傾眠	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	腺癌	233	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	死亡	1540	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						ベンダムスチン：340 リツキシマブ：700	肺炎	1540	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00434		女性	6[redacted]	ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：620	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：302 リツキシマブ：630	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：630	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：630	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：630	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：300 リツキシマブ：620	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：302 リツキシマブ：630	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	細菌性尿路感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	疲労	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：620	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：298 リツキシマブ：630	発疹	9	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
		00437		男性	7[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	肺炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	肺炎	30	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：700	死亡	1249	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00442	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	インフルエンザ	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：675	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						ベンダムスチン：320 リツキシマブ：625	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-