| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 血栓性静脈炎 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：625 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 低血圧 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 低血圧 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 発熱 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：625 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 発熱 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 転倒 | 86 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 上腕骨骨折 | 86 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：675 | 非ホジキンリンパ腫 | 1628 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00444 | | 男性 | 7[redacted] | リツキシマブ：772.5 | 不整脈 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 低血圧 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 過敏症 | 1 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 悪寒 | 1 | - | あり | - | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | チアノーゼ | 1 | - | あり | - | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 呼吸困難 | 1 | - | あり | - | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 腹部膿瘍 | 1 | - | あるかもしれない | - | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 呼吸数減少 | 1 | - | あり | - | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 悪性新生物 | 210 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 不明 |
| | | | | | | リツキシマブ：772.5 | 死亡 | 1150 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00447 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれ | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ない | | | | |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 発疹 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 膀胱刺激症状 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 疲労 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 疼痛 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 膀胱刺激症状 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 疲労 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 疼痛 | - | - | あるかもし | - | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ない | | | | |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 疲労 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 疼痛 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 関節痛 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 筋肉痛 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 下痢 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 下痢 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 口内炎 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 口内炎 | - | - | あるかもしれ | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ない | | | | |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 口内炎 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：375<br>リツキシマブ：790 | 死亡 | 1406 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00450 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 血中ビリルビン増加 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 血中ビリルビン増加 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：180 | 血中ビリルビン増加 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 血中ビリルビン増加 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260 | 血中ビリルビン増加 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700 | | | | | | | | |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：180 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：180 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 疲労 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 便秘 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 咳嗽 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：180 | 疼痛 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 疼痛 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：180 | 発熱 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 発熱 | 30 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 悪寒 | 63 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | C－反応性蛋白増加 | 63 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 背部痛 | 63 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 頻脈 | 63 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：700 | 発熱 | 63 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260<br>リツキシマブ：180 | 細菌感染 | 94 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260 | 好中球減少症 | 155 | - | あり | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260 | 肺扁平上皮癌、病期不明 | 623 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 不明 |
| | | | | | | ベンダムスチン：260 | 肺炎 | 722 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00452 | | 男性 | 5[redacted] | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 過敏症 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 発疹 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 下痢 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 死亡 | 290 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00454 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：360 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：720 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：130<br>リツキシマブ：720 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：130<br>リツキシマブ：720 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：360 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：360 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：360 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：720 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：130<br>リツキシマブ：720 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：130<br>リツキシマブ：720 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：360 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：720 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：360 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：720 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：130<br>リツキシマブ：720 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：130<br>リツキシマブ：720 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：360 | 悪寒 | 29 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：360 | 発熱 | 29 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00458 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：670 | 心障害 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：670 | 帯状疱疹 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：670 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：670 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：670 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：670 | 帯状疱疹 | 60 | - | あるかもしれない | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：300 | リンパ腫 | 1050 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00460 | | 女性 | 7■ | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 過敏症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 過敏症 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 発疹 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 発熱 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 発熱 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 肋間神経痛 | 70 | - | なし | Grade2 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：280<br>リツキシマブ：600 | 死亡 | 413 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00462 | | 男性 | 8■ | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | 心障害 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | 過敏症 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | 発疹 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | 便秘 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：167<br>リツキシマブ：694 | リンパ腫 | 144 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00465 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | ノロウイルス性胃腸炎 | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 過敏症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 白血球破砕性血管炎 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 血管炎 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 嘔吐 | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 下痢 | - | - | なし | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 口内炎 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 咳嗽 | 109 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：348<br>リツキシマブ：724 | 発熱 | 109 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00466 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：665 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：665 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：665 | 発疹 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：665 | 疼痛 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：320<br>リツキシマブ：665 | 非ホジキンリンパ腫 | 1419 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00475 | | 男性 | 6[redacted] | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 細菌感染 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 過敏症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 過敏症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 発疹 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 発疹 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 下痢 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 肺障害 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 発熱 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 発熱 | 10 | - | - | Grade2 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 全身性皮疹 | 10 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 肺塞栓症 | 35 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 51 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | ギラン・バレー症候群 | 57 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 下痢 | 132 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 呼吸困難 | 132 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00484 | | 男性 | 6[redacted] | ベンダムスチン：324<br>リツキシマブ：675 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：324<br>リツキシマブ：675 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：324<br>リツキシマブ：675 | 不整脈 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | 口腔真菌感染 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：324<br>リツキシマブ：675 | 過敏症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：324<br>リツキシマブ：675 | 細菌感染 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | 褥瘡性潰瘍 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | 全身健康状態低下 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | 便秘 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | 口内炎 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：324<br>リツキシマブ：675 | 上部消化管出血 | 12 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：324<br>リツキシマブ：675 | 嘔吐 | 12 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：290<br>リツキシマブ：615 | 非ホジキンリンパ腫 | 79 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00486 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 細菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 細菌感染 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330<br>リツキシマブ：700 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 敗血症 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 発熱 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 発熱 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 血中クレアチニン増加 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 過敏症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：560 | 過敏症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 咳嗽 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 呼吸困難 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 喀血 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：560 | 下痢 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：700 | 全身健康状態低下 | 31 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 細菌性肺炎 | 111 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | ベンダムスチン：330 | 非ホジキンリンパ腫 | 339 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00487 | | 男性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：100 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：100 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：100 | 不整脈 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：100 | 心障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：100 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 過敏症 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：340<br>リツキシマブ：700 | 発熱 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：100 | 心室性頻脈 | 45 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：170<br>リツキシマブ：100 | 死亡 | 684 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00492 | | 男性 | 6[redacted] | ベンダムスチン：165<br>リツキシマブ：667 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：152<br>リツキシマブ：633 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：152<br>リツキシマブ：633 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：152<br>リツキシマブ：633 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：152<br>リツキシマブ：633 | リンパ腫 | 68 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00496 | | 女性 | 7[redacted] | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 胸膜炎 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 細菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 細菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 疲労 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 疲労 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 疲労 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 下痢 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 下痢 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 肺障害 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 肺障害 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | ベンダムスチン：300<br>リツキシマブ：700 | 肺炎 | 61 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| CHOP + RITUXIMAB | NHL | 00101 | | 男性 | 6[redacted] | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 不整脈 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 心障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口腔ヘルペス | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ウイルス性鼻炎 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血中クレアチニン増加 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 腹部不快感 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 頭痛 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 四肢痛 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | アフタ性口内炎 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 消化不良 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 便秘 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 味覚異常 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 消化不良 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 傾眠 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 低血圧 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1388<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 前立腺癌 | 1314 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00102 | | 女性 | 6[redacted] | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：668<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：89<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 血中クレアチニン増加 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血中クレアチニン増加 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血中クレアチニン増加 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：668<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：89<br>プレドニゾロン：500 | 過敏症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発疹 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発疹 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発疹 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発疹 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：668<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：89<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 無力症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 背部痛 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 回転性めまい | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 無力症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 回転性めまい | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 倦怠感 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 高カルシウム血症 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2 | 倦怠感 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 寝汗 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 四肢痛 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：668<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：89<br>プレドニゾロン：500 | 鼡径部痛 | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：668<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：89<br>プレドニゾロン：500 | 口腔咽頭痛 | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 背部痛 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：668<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：89<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：638<br>シクロフォスファミド：1275<br>ドキソルビシン：85<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：668<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：89<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 背部痛 | 93 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 背部痛 | 148 | - | - | Grade3 | 重篤 | - | 不明 |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 悪心 | 148 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 不明 |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 全身健康状態低下 | 148 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 不明 |
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脊椎骨折 | 148 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 不明 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：641<br>シクロフォスファミド：1283<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 急性腎不全 | 149 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00109 | | 女性 | 5[redacted] | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 細菌感染 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 細菌性肺炎 | 79 | - | - | Grade2 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：675<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 帯状疱疹 | 101 | - | - | Grade2 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00115 | | 女性 | 4[redacted] | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 腎仙痛 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 近視 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 非ホジキンリンパ腫 | 2039 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00119 | | 男性 | 4[redacted] | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1365<br>ドキソルビシン：91<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1365<br>ドキソルビシン：91<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1365<br>ドキソルビシン：91<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 喉頭癌 | 1749 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00121 | | 女性 | 5[redacted] | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：550<br>シクロフォスファミド：1087<br>ドキソルビシン：72.5<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：50 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：550<br>シクロフォスファミド：1087<br>ドキソルビシン：72.5<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：50 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：550<br>シクロフォスファミド：1087<br>ドキソルビシン：72.5<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：50 | 細菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：550<br>シクロフォスファミド：1087<br>ドキソルビシン：72.5<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：50 | 細菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 便秘 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：550<br>シクロフォスファミド：1087<br>ドキソルビシン：72.5<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：50 | イレウス | 8 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：70<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 死亡 | 1640 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00122 | | 女性 | 7[redacted] | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：900<br>ドキソルビシン：60<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：900<br>ドキソルビシン：60<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：900<br>ドキソルビシン：60<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：900<br>ドキソルビシン：60<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 口内乾燥 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 口内炎 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 体温上昇 | 35 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | リンパ浮腫 | 35 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | 白血球減少症 | 54 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：560<br>シクロフォスファミド：900<br>ドキソルビシン：60<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：300 | リンパ腫 | 2214 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00131 | | 女性 | 6[redacted] | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 無力症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 冷汗 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 労作性呼吸困難 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 頭痛 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 回転性めまい | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 皮膚疼痛 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 無力症 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | うつ病 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 労作性呼吸困難 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 多汗症 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 回転性めまい | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 無力症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 労作性呼吸困難 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 疼痛 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：648<br>シクロフォスファミド：1297<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 上腹部痛 | 38 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱性好中球減少症 | 38 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 全身健康状態低下 | 38 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：660<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 頭痛 | 38 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱性好中球減少症 | 128 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1350<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球減少症 | 128 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | 00134 | | 男性 | 6[redacted] | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血中ビリルビン増加 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 心障害 | - | - | なし | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 腹痛 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 背部痛 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 胃炎 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 疼痛 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 疼痛 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 低血圧 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 不整脈 | 8 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1360<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 失神 | 9 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | 00144 | | 女性 | 6[redacted] | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 細菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 疲労 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 便秘 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 疲労 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 疲労 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | 11 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：724<br>シクロフォスファミド：1425<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | イレウス | 11 | - | - | Grade3 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：667<br>シクロフォスファミド：1373<br>ドキソルビシン：92<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 子宮内膜癌 | 1570 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00149 | WHITE | 女性 | 7[redacted] | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血中ビリルビン増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血中ビリルビン増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血中ビリルビン増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血中ビリルビン増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血中ビリルビン増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 発疹 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 便秘 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 便秘 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 呼吸困難 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 多汗症 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：87<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ウイルス性胃腸炎 | 70 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：88<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱水 | 70 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00160 | | 女性 | 5[redacted] | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口腔ヘルペス | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | おくび | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 全身健康状態低下 | 11 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | 11 | - | - | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00161 | | 男性 | 6[redacted] | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：97<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1410<br>ドキソルビシン：94<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：97<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：97<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1410<br>ドキソルビシン：94<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：97<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1410<br>ドキソルビシン：94<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：97<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1410<br>ドキソルビシン：94<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球減少症 | 9 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1440<br>ドキソルビシン：95<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 好中球減少症 | 9 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：720<br>シクロフォスファミド：1410<br>ドキソルビシン：94<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 非ホジキンリンパ腫 | 352 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00165 | | 女性 | 6[redacted] | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 発疹 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 膀胱痛 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 上腹部痛 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 消化不良 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 血栓症 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1450<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱性好中球減少症 | 52 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00173 | | 女性 | 6[redacted] | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱性好中球減少症 | 33 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：553<br>シクロフォスファミド：1107<br>ドキソルビシン：74<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱性好中球減少症 | 51 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00178 | | 男性 | 6[redacted] | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | オンコビン：2 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：200 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：200 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：200 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：200 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 発熱 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 食欲減退 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 便秘 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 疲労 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 回転性めまい | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：200 | 肺障害 | - | - | なし | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 発熱 | 24 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 白血球増加症 | 24 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 寝汗 | 24 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 全身健康状態低下 | 24 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：1290<br>ドキソルビシン：86<br>オンコビン：2 | 呼吸窮迫 | 24 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00182 | | 男性 | 5[redacted] | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：550 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：550 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 細菌感染 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：550 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 肺障害 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：800<br>シクロフォスファミド：1600<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2 | 胸水 | 23 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | 00187 | | 女性 | 7[redacted] | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 顆粒球数減少 | - | - | - | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 細菌感染 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：100 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：100 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 大腸菌感染 | 121 | - | あり | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 全身健康状態低下 | 121 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1 | 貧血 | 121 | - | あり | Grade2 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：570<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 好中球減少症 | 121 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00189 | | 男性 | 5[redacted] | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口腔真菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 味覚異常 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | しゃっくり | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 体重増加 | - | - | あるかもしれない | - | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球減少症 | 15 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00201 | | 女性 | 5[redacted] | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2 | 血中ビリルビン増加 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：100 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | 口腔ヘルペス | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | ウイルス性上気道感染 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2 | 硬結 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：100 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | 筋骨格痛 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | 膿瘍 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | 創傷治療 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | 口内炎 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2 | 肛門膿瘍 | 14 | - | あるかもしれない | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：100 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | 筋膜炎 | 14 | - | あるかもしれない | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：750<br>シクロフォスファミド：1500<br>ドキソルビシン：100<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：100 | 肺炎 | 14 | - | あるかもしれない | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00203 | | 女性 | 4[redacted] | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：600 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：600 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 発熱 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 発熱 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 発疹 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：600 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 脱毛症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：600 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：670<br>シクロフォスファミド：1335<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | リンパ腫 | 1797 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：600 | | | | | | | | |
| | | 00208 | | 男性 | 6[redacted] | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 不整脈 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1 | 不整脈 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 心障害 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 細菌感染 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口腔カンジダ症 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 口腔カンジダ症 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2 | 発熱 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血中クレアチニン増加 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1650<br>ドキソルビシン：110<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：400 | 口内炎 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1 | 口内炎 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：825<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 肺の悪性新生物 | 1553 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00210 | | 男性 | 6[redacted] | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：575 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：380<br>ドキソルビシン：55<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：575 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：380<br>ドキソルビシン：55<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：575 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | ヘモグロビン減少 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 単純ヘルペス | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 単純ヘルペス | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：575 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 疲労 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 疲労 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 下痢 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 口内炎 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：575 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1400<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 口内炎 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1200<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 口内炎 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：690<br>シクロフォスファミド：1100<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：575 | 爪囲炎 | 106 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00214 | | 女性 | 5[redacted] | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 顆粒球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 不整脈 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | トランスアミナーゼ上昇 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性浮腫 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 悪寒 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血栓症 | - | - | あるかもしれない | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 回転性めまい | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 口内炎 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 低血圧 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 呼吸困難 | 58 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 深部静脈血栓症 | 92 | - | あるかもしれない | Grade4 | 重篤 | - | 未回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2 | リンパ腫 | 1680 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：500 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 多臓器不全 | 1680 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | | | | | リツキシマブ：650<br>シクロフォスファミド：1300<br>ドキソルビシン：90<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | アスペルギルス症 | 1680 | - | なし | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00220 | | 男性 | 6[redacted] | リツキシマブ：100<br>リツキシマブ：635<br>シクロフォスファミド：1470<br>ドキソルビシン：98<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：1100 | 血中ビリルビン増加 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：735<br>シクロフォスファミド：1470<br>ドキソルビシン：98<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：720<br>ドキソルビシン：48<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：735<br>シクロフォスファミド：1470<br>ドキソルビシン：98<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：735<br>シクロフォスファミド：1470<br>ドキソルビシン：98<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：720<br>ドキソルビシン：48<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：100<br>リツキシマブ：635<br>シクロフォスファミド：1470<br>ドキソルビシン：98<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：1100 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：735<br>シクロフォスファミド：1470<br>ドキソルビシン：98<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 発熱 | 40 | - | - | Grade3 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：735<br>シクロフォスファミド：1470<br>ドキソルビシン：98<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球減少症 | 40 | - | あり | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | | | | | リツキシマブ：700<br>シクロフォスファミド：720<br>ドキソルビシン：48<br>オンコビン：1<br>プレドニゾロン：500 | 死亡 | 861 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 死亡 |
| | | 00229 | | 女性 | 6[redacted] | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：300 | 血小板数減少 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：400 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：400 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | 血小板数減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | 血小板数減少 | - | - | なし | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：428 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：300 | 白血球数減少 | - | - | あり | Grade3 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：400 | 白血球数減少 | - | - | なし | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：400 | 白血球数減少 | - | - | なし | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | 白血球数減少 | - | - | なし | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | 白血球数減少 | - | - | なし | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：300 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：400 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | プレドニゾロン：400 | | | | | | | | |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：60<br>プレドニゾロン：400 | ヘモグロビン減少 | - | - | あるかもしれない | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：428 | 脱毛症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：300 | 脱毛症 | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：400 | 脱毛症 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：428 | 末梢性ニューロパチー | - | - | あり | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：428 | 嘔吐 | - | - | あるかもしれない | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：300 | 嘔吐 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：600<br>シクロフォスファミド：1250<br>ドキソルビシン：80<br>プレドニゾロン：300 | 痔核 | 43 | - | - | Grade4 | 重篤 | - | 回復 |
| | | 00242 | | 女性 | 7[redacted] | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血中ビリルビン増加 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 顆粒球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 血小板数減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade4 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：50<br>オンコビン：1.4<br>プレドニゾロン：500 | 白血球数減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：50<br>オンコビン：1.4<br>プレドニゾロン：500 | ヘモグロビン減少 | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：50<br>オンコビン：1.4<br>プレドニゾロン：500 | 末梢性感覚ニューロパチー | - | - | - | Grade1 | 非重篤 | - | - |

| 投与群 | 病型 | 症例番号 | 人種 | 性 | 年齢 | 投与量 | 有害事象（基本語）[*1] | 有害事象発現日[*2]（投与●日目） | 持続期間又は消失日 | 因果関係 | 重症度 | 重篤/非重篤の別 | 治験薬の処置（継続、投与中止等） | 転帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 過敏症 | - | - | あり | Grade1 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1130<br>ドキソルビシン：75<br>オンコビン：2<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：50<br>オンコビン：1.4<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：50<br>オンコビン：1.4<br>プレドニゾロン：500 | 脱毛症 | - | - | - | Grade3 | 非重篤 | - | - |
| | | | | | | リツキシマブ：563<br>シクロフォスファミド：1000<br>ドキソルビシン：50<br>オンコビン：1.4<br>プレドニゾロン：500 | 下痢 | - | - | - | Grade2 | 非重篤 | - | - |