投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1130 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	35	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：563 シクロフォスファミド：1130 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺炎	35	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00248		女性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	蛋白尿	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	全身健康状態異常	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	30	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00306		男性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	死亡	79	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00308		女性	7[redacted]	リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	胸水	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	胸水	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	138	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嚥下障害	169	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	胸痛	169	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	171	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：580 シクロフォスファミド：1160 ドキソルビシン：78 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	悪性新生物	308	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00318		男性	7[redacted]	リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	無力症	153	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	食欲減退	153	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	心不全	466	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00319		男性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	全身健康状態低下	71	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	心不全	82	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
		00320		女性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	ウイルス性気管支炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	真菌性気管支炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	過敏症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	疲労	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	頭痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 プレドニゾロン：8	浮腫	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内乾燥	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：100 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	口内炎	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	血小板数減少	40	-	あり	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	過敏症	40	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：8	リンパ腫	427	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00511		男性	7[redacted]	リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75.6 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75.6 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1134 ドキソルビシン：75.6 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	15	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	浮動性めまい	15	-	あるかもしれない	-	重篤	-	回復
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	転倒	15	-	あるかもしれない	-	重篤	-	回復
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	腎癌	239	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2	前立腺癌	319	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1140 ドキソルビシン：76 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	1220	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00512		女性	5[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：200	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	細菌感染	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	発疹	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：200	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	椎間板突出	52	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00513		男性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	-	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00516		男性	6[redacted]	リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1340 ドキソルビシン：90 オンコビン：1	失神	14	-	なし	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
		00519		女性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	病的骨折	146	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00526		女性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	上腹部痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疼痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	疼痛	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	疼痛	-	-	あるかもしれない	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	疼痛	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	疼痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	便秘	98	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	無力症	98	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5	関節痛	98	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：400								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	背部痛	98	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：400	疼痛	112	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00531		女性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ウイルス性扁桃炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	腎不全	335	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00539		男性	6[redacted]	リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	真菌性上気道感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2	悪性黒色腫	669	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
		00543		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	心障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	細菌感染	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	カンジダ症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	カンジダ症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌性肺炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	肺障害	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	低血圧	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	14	-	あり	Grade3	重篤	-	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺炎	14	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	58	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	敗血症	58	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血中ブドウ糖減少	76	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	132	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血尿	132	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	直腸出血	132	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00564		女性	7[redacted]	リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：88 オンコビン：1	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：88 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：88 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：88 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 ドキソルビシン：88 オンコビン：1	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：88 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：500 ドキソルビシン：88 オンコビン：1	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 ドキソルビシン：88 オンコビン：1	発熱	36	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00569		女性	6[redacted]	リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：53 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：50 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：30 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：30 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1070 ドキソルビシン：71 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：53 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：50 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1070 ドキソルビシン：71 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：53 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：50 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：30 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：30 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1070 ドキソルビシン：71 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：800 ドキソルビシン：50 プレドニゾロン：500	背部痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	骨痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1070 ドキソルビシン：71 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	咳嗽	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 シクロフォスファミド：1070 ドキソルビシン：71 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	35	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00605	WHITE	男性	7[redacted]	リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	不整脈	-	-	なし	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	心障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	好中球減少症	-	-	なし	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	心筋梗塞	5	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：725 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	胆嚢炎	48	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	冠動脈疾患	121	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00610		男性	7[redacted]	リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：730 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：97.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	結腸癌	366	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00611		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：712 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：712 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：712 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：712 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	感染	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	背部痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	背部痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	体重減少	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	帯状疱疹	77	-	あり	Grade3	重篤	-	回復
						リツキシマブ：712 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	坐骨神経痛	132	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
		00613		女性	7[redacted]	リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血尿	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	粘膜の炎症	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	粘膜の炎症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	背部痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ブドウ糖増加	32	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ミオパチー	32	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00703		男性	3[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ウイルス性咽頭炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	咳嗽	94	-	なし	Grade1	重篤	-	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	94	-	なし	-	重篤	-	回復
		00706		女性	6[redacted]	リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	結腸癌	146	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	胆嚢癌	428	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	死亡	884	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00710		男性	7[redacted]	リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	過敏症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1080 ドキソルビシン：72 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	薬物過敏症	1	-	あり	Grade2	重篤	-	回復
		00727		女性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	尿路感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	862	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00729		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：500	気管支炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顔面不全麻痺	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	結膜炎	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌性気管支炎	14	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	好中球減少症	14	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：500	前立腺癌	1109	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00732		女性	6[redacted]	リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	器質化肺炎	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	器質化肺炎	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	器質化肺炎	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋力低下	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	閉塞性細気管支炎	62	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：670 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	851	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00735		女性	8[redacted]	リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	全身健康状態低下	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	白血球数減少	11	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：690	全身健康状態低下	11	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	白血球数減少	32	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	発熱	32	-	あり	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	顆粒球数減少	97	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	白血球数減少	97	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	消化管感染	97	-	あり	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：750 ドキソルビシン：50 オンコビン：2 プレドニゾロン：585	肺炎	97	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00739		女性	7[redacted]	リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性浮腫	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	多発ニューロパチー	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	粘膜の炎症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1245 ドキソルビシン：83 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	寝汗	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：622 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	回転性めまい	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：593 シクロフォスファミド：1165 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	650	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00747		女性	6[redacted]	リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	精神病性障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	低血圧	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心血管障害	11	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	気管支炎	32	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	好中球減少症	32	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：604 シクロフォスファミド：1208 ドキソルビシン：81 オンコビン：2 プレドニゾロン：200	乳癌	1156	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
		00749		女性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	帯状疱疹	-	-	-	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不安	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	鼻咽頭炎	51	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	体温上昇	51	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	51	-	あるかもしれない	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	51	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	炎症マーカー上昇	53	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺浸潤	53	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	インフルエンザ	53	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	体温上昇	53	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	小水疱性皮疹	53	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00757		男性	6[redacted]	リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	腎出血	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：623 シクロフォスファミド：1230 ドキソルビシン：82 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	非ホジキンリンパ腫	293	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00760		男性	7[redacted]	リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	単純ヘルペス	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	カンジダ症	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	真菌性食道炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口腔真菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2	血中クレアチニン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：769 シクロフォスファミド：1538 ドキソルビシン：103 プレドニゾロン：500	前立腺癌	578	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00764		女性	7[redacted]	リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	口腔ヘルペス	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	咳嗽	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肛門周囲痛	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	肛門周囲痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	多汗症	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	膵神経内分泌腫瘍	229	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
		00781		女性	6[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	1289	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00782		男性	6[redacted]	リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	味覚異常	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	頚部痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	非ホジキンリンパ腫	508	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00799		女性	7[redacted]	リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	腹痛	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	葉状肉腫	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：667.5 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：653 シクロフォスファミド：1305 ドキソルビシン：87 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	乳癌	982	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00801		男性	5[redacted]	リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	真菌性性器感染	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺の悪性新生物	852	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00807		女性	7[redacted]	リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	細菌感染	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	無力症	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋肉痛	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋肉痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋肉痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	筋肉痛	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	嘔吐	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	口内炎	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嚥下障害	8	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	頭痛	8	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋肉痛	8	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪心	8	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	8	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	出血性膀胱炎	90	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	排尿困難	90	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	悪心	90	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：660	嘔吐	90	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	排尿困難	122	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1056 ドキソルビシン：70.4 オンコビン：2 プレドニゾロン：10 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：30 プレドニゾロン：100 プレドニゾロン：500	血尿	122	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00820		女性	4[redacted]	リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	イレウス	13	-	あり	Grade4	重篤	-	未回復
		00824		男性	6[redacted]	リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪寒	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嚥下障害	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	味覚異常	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋骨格痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋骨格痛	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	局所腫脹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪寒	134	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	134	-	-	Grade4	重篤	-	回復