投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	全身健康状態低下	134	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	リンパ腫	244	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪性新生物	244	-	-	Grade4	重篤	-	不明
		00829		男性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	細菌感染	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：2800	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：2100	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：2100	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	肺障害	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	64	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	血中乳酸脱水素酵素増加	64	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	腎機能障害	64	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	心障害	64	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	呼吸困難	64	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1418 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：125 プレドニゾロン：150 プレドニゾロン：200	扁平上皮癌	261	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00833		男性	5[redacted]	リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪心	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪心	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	前立腺癌	907	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
		00845		男性	7[redacted]	リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1388 ドキソルビシン：93 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：683 シクロフォスファミド：1365 ドキソルビシン：91 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1388 ドキソルビシン：93 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1388 ドキソルビシン：93 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：683 シクロフォスファミド：1365 ドキソルビシン：91 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：683 シクロフォスファミド：1365 ドキソルビシン：91 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：683 シクロフォスファミド：1365 ドキソルビシン：91 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：683 シクロフォスファミド：1365 ドキソルビシン：91 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1388 ドキソルビシン：93 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球減少症	15	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：683 シクロフォスファミド：1365 ドキソルビシン：91 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血栓症	70	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
		00849		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	胃腸障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱性好中球減少症	81	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00852		女性	4[redacted]	リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	心障害	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	細菌感染	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中クレアチニン増加	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	汎血球減少症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肺障害	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	敗血症	7	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00853		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	食欲減退	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	体重減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	23	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	リンパ腫	225	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00855		女性	5[redacted]	リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						オンコビン：2								
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	蛋白尿	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						オンコビン：2								
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：633 シクロフォスファミド：1267 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	下痢	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	下痢	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	白血球数減少	5	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00859		女性	4[redacted]	リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	急性呼吸窮迫症候群	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	13	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	気管支肺アスペルギルス症	20	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺炎	20	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
		00862		女性	6[redacted]	リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	口腔カンジダ症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：710 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	溢血	3	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：710 ドキソルビシン：95 プレドニゾロン：400	上腹部痛	24	-	なし	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	全身健康状態低下	35	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	食欲減退	35	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	低血圧	35	-	あるかもしれない	Grade3	重篤	-	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：1 プレドニゾロン：50	非ホジキンリンパ腫	585	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00865		女性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：797 ドキソルビシン：53 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	カンジダ症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	真菌性腸炎	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：797 ドキソルビシン：53 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	大腸菌性尿路感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：797 ドキソルビシン：53 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	疲労	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	好中球減少症	30	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1328 ドキソルビシン：89 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	尿路感染	30	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	好中球減少性感染	53	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：664 シクロフォスファミド：1062 ドキソルビシン：71 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	悪心	53	-	あるかもしれない	Grade1	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	好中球減少性感染	94	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：720 ドキソルビシン：48 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	感染	115	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00869		男性	5[redacted]	シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：700	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1515 ドキソルビシン：101 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1515 ドキソルビシン：101 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：700	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1515 ドキソルビシン：101 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104 プレドニゾロン：400	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104	脱毛症	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：780 シクロフォスファミド：1560 ドキソルビシン：104	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱性好中球減少症	56	-	-	Grade4	重篤	-	回復
		00871		男性	4[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	104	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	104	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00880		男性	6[redacted]	リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	腸球菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	結膜炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	粘膜の炎症	3	-	あり	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	好中球減少症	3	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	尿路感染	3	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：637.5 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	3	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00889		女性	7[redacted]	リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口腔カンジダ症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	低血圧	-	-	あるかもしれない	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	呼吸困難	1	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	胸水	1	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	55	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：638 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱性好中球減少症	55	-	-	Grade4	重篤	-	死亡
	MCL	10503		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋膿瘍	203	-	-	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00404		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	不整脈	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺炎	2229	-	-	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00407		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	胸部不快感	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	胸部不快感	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	胸部不快感	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心筋梗塞	163	-	-	Grade4	重篤	-	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	前立腺癌	395	-	なし	Grade4	重篤	-	不明
		00408		女性	7[redacted]	リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	帯状疱疹	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	細菌感染	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：686 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1370 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	好中球減少症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	腎新生物	76	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：687 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	細菌性副鼻腔炎	101	-	なし	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：656 シクロフォスファミド：1335 ドキソルビシン：89 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	死亡	1985	-	-	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
		00411		女性	6[redacted]	リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血小板数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	心障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔ヘルペス	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	発熱	-	-	なし	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血中クレアチニン増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	血尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	発疹	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	トランスアミナーゼ上昇	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	腫瘍崩壊症候群	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：400	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：720 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：675 シクロフォスファミド：1440 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	非ホジキンリンパ腫	109	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00416		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	625	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00418		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	結腸癌	422	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
		00420		男性	7[redacted]	リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	ウイルス性上気道感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	味覚異常	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	感覚鈍麻	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	感覚鈍麻	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	浮腫	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 プレドニゾロン：500	肺炎	1094	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00422		男性	7[redacted]	リツキシマブ：727 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：727 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：727 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	死亡	1886	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	骨髄異形成症候群の転化	1886	-	なし	-	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	1927	-	なし	-	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	汎血球減少症	1927	-	なし	-	重篤	-	死亡
		00430		女性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	心障害	-	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	細菌感染	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	発熱	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：70 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：300								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	白血球数減少	12	-	あり	Grade1	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	便秘	12	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：300	脱水	12	-	-	Grade4	重篤	-	未回復
		00435		男性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	細菌感染	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	敗血症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中クレアチニン増加	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	肺障害	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	低血圧	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌性肺炎	4	-	あるかもしれない	Grade2	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	処置後出血	75	-	なし	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	大腸炎	153	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	イレウス	153	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	死亡	914	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
		00436		男性	5[redacted]	リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：1150	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：1150	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2	嘔吐	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：1100								
						リツキシマブ：650 シクロフォスファミド：1700 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：1100	心筋梗塞	499	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00446		男性	6[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	嚥下障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘルペスウイルス感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	心不全	311	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	腎不全	311	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00451		女性	7[redacted]	リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	不整脈	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	血中アルカリホスファターゼ増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	蛋白尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	血尿	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	過敏症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	過敏症	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2	嘔吐	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	口内炎	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	肺障害	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：500 シクロフォスファミド：1150 ドキソルビシン：75 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	頻脈	1	-	あり	Grade1	重篤	-	回復
		00459		男性	7[redacted]	リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	発疹	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	咳嗽	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	筋骨格系胸痛	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	視力低下	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	浮動性めまい	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	傾眠	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顔面腫脹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	緑内障	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	尿失禁	-	-	-	-	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	鼻漏	-	-	-	-	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	鼻漏	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	悪性新生物	263	-	-	Grade4	重篤	-	不明
		00463		男性	6[redacted]	リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血中ビリルビン増加	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	細菌感染	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	トランスアミナーゼ上昇	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	口内炎	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱	-	-	-	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	全身健康状態低下	76	-	あり	Grade4	重篤	-	未回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	有熱性骨髄無形成	76	-	あり	Grade4	重篤	-	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
		00468		男性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発疹	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2	脱毛症	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	爪囲炎	-	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	基底細胞癌	889	-	なし	Grade4	重篤	-	未回復
		00473		男性	6[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血中ビリルビン増加	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	血中ビリルビン増加	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：600								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	B型肝炎	1396	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	大葉性肺炎	1396	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00480		男性	7[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	白血球数減少	-	-	-	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2	発疹	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	溢血	2	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1425 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	発熱性好中球減少症	15	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
		00481		女性	7[redacted]	リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：200	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	血小板数減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：200								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1190 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	ヘモグロビン減少	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：200	発熱	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1190 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	過敏症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1	過敏症	-	-	-	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：500								
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：200	過敏症	3	-	あり	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1190 ドキソルビシン：80 オンコビン：2 プレドニゾロン：500	下痢	28	-	-	Grade4	重篤	-	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1200 ドキソルビシン：80 オンコビン：1 プレドニゾロン：500	リンパ腫	535	-	なし	Grade4	重篤	-	死亡
		00565		男性	6[redacted]	リツキシマブ：890 シクロフォスファミド：1780 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2	顆粒球数減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：890 シクロフォスファミド：1780 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2	白血球数減少	-	-	あり	Grade4	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：600								
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	白血球数減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade2	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：600								
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	脱毛症	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	脱毛症	-	-	あり	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	肺障害	-	-	なし	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	肺障害	-	-	-	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：600	肺障害	-	-	なし	Grade1	非重篤	-	-
						リツキシマブ：860 シクロフォスファミド：1725 ドキソルビシン：115 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	発熱	-	-	あり	Grade3	非重篤	-	-
						リツキシマブ：890 シクロフォスファミド：1780 ドキソルビシン：120 オンコビン：2	胸水	5	-	なし	Grade4	重篤	-	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：750								
						リツキシマブ：890 シクロフォスファミド：1780 ドキソルビシン：120 オンコビン：2 プレドニゾロン：750	肺障害	5	-	なし	Grade2	重篤	-	回復

*1 MedDRA/J Ver 13.0
*2 有害事象発現日は、投与開始日を 1 日目として起算

表 2.7.4.7- 5 重篤な有害事象を発現した症例一覧（C18083/3064/NL/MN 試験）

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
BENDAMUSTINE-RITUXIMAB	NHL	001701	WHITE	男性	8[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	咳嗽	3	97	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	疲労	35	7	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	食欲減退	35	20	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	便秘	35	23	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	皮膚乾燥	35	23	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	疲労	41	14	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	消化不良	41	17	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	疲労	54	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 ベンダムスチン：186 リツキシマブ：776	剥脱性発疹	76	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 ベンダムスチン：186 リツキシマブ：776	下痢	78	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	白血球数減少	120	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	好中球数減少	120	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	白血球数減少	127	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	好中球数減少	127	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	白血球数増加	133	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：776	好中球減少症	133	16	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	白血球数減少	148	9	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	好中球減少症	148	9	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	肋骨骨折	155	-	なし	Grade2	重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	肺水腫	155	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	胸水	155	6	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	低酸素症	155	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	白血球数増加	156	20	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	末梢性浮腫	157	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あ

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														り）
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	胸水	160	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	ヘモグロビン減少	169	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	発疹	171	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	白血球数減少	175	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：765	好中球減少症	175	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	001801	WHITE	男性	6[redacted]		慢性腎不全	-2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
							血中マグネシウム減少	-1	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	単径部痛	29	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	悪心	29	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	下痢	29	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	下痢	38	3	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	悪心	41	2	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	下痢	46	4	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	胃腸炎	46	13	あるかもしれない	Grade2	重篤	減量	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	腹痛	54	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	過小食	54	5	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	悪心	54	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	無力症	54	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	体重減少	54	5	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：203 リツキシマブ：844	下痢	69	31	多分あり	Grade2	非重篤	減量	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：844	胃腸炎	71	3	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：844	前立腺炎	99	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：844	好中球減少症	126	3	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164 リツキシマブ：844	好中球減少症	132	6	あるかもしれない	Grade3	非重篤	投与中断	回復
	NHL	002409	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	注入に伴う反応	1	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	低マグネシウム血症	1	92	不明	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	注入に伴う反応	1	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	下痢	8	113	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	疲労	13	36	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	浮動性めまい	15	50	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	起立性低血圧	46	1	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	無力症	49	12	不明	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	疲労	49	13	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	脱水	50	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：154 リツキシマブ：640	貧血	50	78	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	体重減少	64	-	不明	Grade2	非重篤	減量	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	下痢	121	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	低マグネシウム血症	121	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	悪心	125	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	浮動性めまい	125	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	起立性低血圧	125	1	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	貧血	127	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：146 リツキシマブ：640	心停止	134	1	不明	Grade5	重篤	投与中止	死亡
	NHL	002502	WHITE	女性	8[redacted]	ベンダムスチン：135 リツキシマブ：548	食欲減退	1	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：548	便秘	15	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：548	低血圧	15	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	無力症	34	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	上気道感染	62	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	疲労	69	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	疼痛	69	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	気管支炎	77	5	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	慢性閉塞性肺疾患	77	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	呼吸不全	77	5	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	不眠症	81	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：544	肺塞栓症	85	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	気道うっ血	90	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	ＩＮＲ増加	90	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	各種物質毒性	95	10	なし	Grade2	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	吐血	95	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	喀血	95	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	十二指腸炎	97	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	喀血	115	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	腹膜ヘルニア	116	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	呼吸困難	118	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	ＩＮＲ減少	118	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：131 リツキシマブ：548	好中球減少症	125	60	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	貧血	146	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	発声障害	146	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	鼻出血	146	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	筋骨格系胸痛	146	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	上気道感染	146	38	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：129 リツキシマブ：536	肺炎	170	11	なし	Grade3	重篤	なし	回復
	NHL	003005	WHITE	女性	7[redacted]	ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	悪心	2	14	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	悪心	15	164	あるかもしれ	Grade1	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	好中球減少症	99	11	多分あり	Grade4	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	好中球減少症	110	4	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	口腔内潰瘍形成	176	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	悪心	178	3	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	胃食道逆流性疾患	178	3	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	嘔吐	178	3	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	食欲減退	186	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	体重減少	186	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	血小板減少症	186	6	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	貧血	186	8	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	脱水	186	10	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	嘔吐	186	12	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	低マグネシウム血症	186	13	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	イレウス	186	15	あるかもしれない	Grade3	重篤	投与中止	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	悪心	186	15	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	低リン酸血症	187	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	低カリウム血症	187	6	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	高血糖	187	42	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	低カルシウム血症	188	27	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	便秘	189	1	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	耳感染	189	12	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	尿路感染	189	12	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	うつ病	191	10	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	血小板減少症	192	23	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	頭痛	195	5	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	頚部痛	196	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：167 リツキシマブ：698	筋痙縮	196	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	003020	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	8	14	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	白血球減少症	8	33	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	消化不良	12	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	血小板減少症	22	6	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	22	12	多分あり	Grade2	非重篤	投与中断	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	血小板減少症	28	6	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	34	7	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	血小板減少症	34	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	白血球減少症	41	7	多分あり	Grade4	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	41	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	48	6	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	白血球減少症	48	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	54	2	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	白血球減少症	55	14	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	血小板減少症	55	29	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	55	7	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	白血球減少症	69	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	69	7	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	白血球減少症	76	7	多分あり	Grade4	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	76	7	多分あり	Grade4	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	血小板減少症	83	7	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	貧血	83	7	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	好中球減少症	83	36	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	心嚢液貯留	85	7	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	血小板減少症	89	30	多分あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	左室機能不全	91	-	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：192 リツキシマブ：799	心嚢液貯留	92	6	あるかもしれない	Grade3	重篤	投与中止	回復(後遺症

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														あり）
	NHL	003023	WHITE	男性	6■	ベンダムスチン：189 リツキシマブ：800	不眠症	1	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：189 リツキシマブ：800	悪心	2	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：189 リツキシマブ：788	貧血	101	58	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：189 リツキシマブ：788	低ナトリウム血症	149	2	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：189 リツキシマブ：788	発熱	149	3	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：189 リツキシマブ：788	尿路感染	149	4	なし	Grade3	重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：189 リツキシマブ：788	尿路感染	153	7	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：189 リツキシマブ：788	尿路感染	348	16	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	003032	WHITE	男性	7■	ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	薬物過敏症	1	1	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	振戦	3	13	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	歯の知覚過敏	12	18	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	好中球減少症	22	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	発声障害	53	5	不明	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	口腔咽頭痛	53	5	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	歯肉腫脹	77	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	血小板減少症	92	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	白血球減少症	92	36	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	貧血	92	43	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	副鼻腔炎	101	12	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	副鼻腔炎	113	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	咳嗽	116	9	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	慢性気管支炎	122	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	血小板減少症	134	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	脱水	136	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	嘔吐	136	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	ウイルス性消化管感染	136	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	悪心	136	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	不眠症	141	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	貧血	148	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復