投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	血小板減少症	148	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	気管気管支炎	167	4	なし	Grade3	重篤	なし	回復
	NHL	003101	WHITE	男性	5[redacted]		造影剤アレルギー	-5	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	注入に伴う反応	1	2	なし	Grade2	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	そう痒性皮疹	18	75	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	疲労	32	65	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	便秘	59	34	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	疲労	122	14	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	悪寒	127	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	発熱	127	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	毛包炎	128	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	恥骨上痛	128	2	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：800	ウイルス性上気道感染	128	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	MCL	003501	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	悪心	2	4	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	便秘	6	7	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	注入に伴う反応	29	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	悪心	29	2	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	嘔吐	29	3	あり	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	発熱	30	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	血小板減少症	30	1	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	不安	31	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	不眠症	31	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	血小板減少症	31	8	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	悪心	31	10	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	便秘	32	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	潮紅	32	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	便秘	57	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	疲労	57	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	悪心	57	3	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	味覚異常	85	79	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	便秘	88	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	疲労	88	7	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	悪心	88	7	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	便秘	114	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	疲労	114	5	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	悪心	114	5	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	上気道感染	126	11	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	便秘	143	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	疲労	143	6	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	悪心	143	6	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	004107	WHITE	男性	5[redacted]	ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	疲労	1	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	好中球減少症	22	71	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	サイトカイン放出症候群	29	57	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	腹痛	35	2	不明	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：750	蜂巣炎	64	8	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：750	好中球減少症	99	8	あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：750	好中球減少症	106	15	あり	Grade4	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：750	好中球減少症	120	12	あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：750	腹痛	131	2	不明	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：750	好中球減少症	176	-	あり	Grade3	非重篤	なし	未回復
	MCL	004702	WHITE	男性	7[redacted]	ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	発熱	13	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	疲労	19	66	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	頭痛	29	57	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	胸膜痛	34	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	多汗症	39	47	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	呼吸困難	60	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	悪性胸水	79	7	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	疲労	85	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	肺の悪性新生物	85	184	なし	Grade3	重篤	投与中止	軽快
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：833	肺の悪性新生物	268	1	なし	Grade5	重篤	なし	死亡

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	004802	WHITE	男性	5[redacted]	ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	食欲減退	8	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	便秘	8	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	悪心	8	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	発疹	10	20	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	発疹	10	20	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	発熱	29	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	疲労	29	29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	注入に伴う反応	29	8	なし	Grade3	重篤	投与中止	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：225.9 リツキシマブ：940	血小板減少症	30	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	005407	WHITE	女性	7[redacted]	ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	動悸	7	28	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	頻脈	7	28	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	便秘	9	6	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	錯乱状態	9	26	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	憩室炎	9	26	なし	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	発熱	9	26	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	腹痛	9	26	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：630	胃食道逆流性疾患	24	53	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	005701	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：156 リツキシマブ：650	眼瞼障害	42	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：156 リツキシマブ：650	関節痛	42	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：156 リツキシマブ：650	憩室炎	42	11	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：156 リツキシマブ：650	憩室炎	85	8	なし	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：156 リツキシマブ：650	末梢性ニューロパチー	92	-	あり	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：156 リツキシマブ：650	肉腫	105	98	なし	Grade3	重篤	投与中止	回復(後遺症あり)
	MCL	006602	WHITE	男性	6■	ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	悪寒	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	悪寒	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	多汗症	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	洞性頻脈	2	28	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	便秘	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	低血圧	29	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	悪心	30	56	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
							挫傷	-	2010-06-23	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
							口内乾燥	-	2010-06-23	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							冷感	-	2010-06-23	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	体重減少	56	121	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	血中ブドウ糖増加	57	48	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	頻脈	57	85	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	帯状疱疹	69	17	あり	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	帯状疱疹	69	164	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	転倒	82	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	裂傷	82	32	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	悪心	86	27	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	鼻閉	87	55	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	直腸出血	102	4	不明	Grade3	重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	末梢性ニューロパチー	102	11	なし	Grade3	重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	血中ブドウ糖増加	104	21	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	発熱	105	1	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	直腸出血	106	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	口内乾燥	113	29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	末梢性ニューロパチー	113	120	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	帯状疱疹	113	120	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	うつ病	122	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	発熱性好中球減少症	122	3	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	白血球数減少	123	12	あり	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	ヘモグロビン減少	124	4	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	徐脈	141	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	食欲減退	141	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	無力症	141	92	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	転倒	164	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	擦過傷	164	41	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	悪心	169	-	あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	創傷感染	174	31	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	半月板障害	175	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	脱毛症	176	-	あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	上気道感染	204	15	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	擦過傷	204	29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	好中球減少症	213	13	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	白血球数減少	213	20	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	上気道感染	218	15	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	無力症	232	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	末梢性ニューロパチー	232	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	帯状疱疹	232	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	帯状疱疹	232	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	白血球数減少	232	29	あり	Grade4	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：225 リツキシマブ：950	上気道感染	232	86	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
	NHL	006609	WHITE	男性	7[redacted]	ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	心電図ＱＴ延長	2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	咳嗽	2	157	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	左室機能不全	4	4	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	血中カリウム減少	6	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	筋肉痛	32	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	悪心	32	1	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	喘鳴	45	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	インフルエンザ様疾患	45	11	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	食欲減退	57	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	体重減少	57	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	良性前立腺肥大症	74	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	疲労	77	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	うっ血性心不全	77	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	肺炎	77	2	あるかもしれない	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	筋骨格系胸痛	113	30	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	血中リン減少	141	29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	快感消失	169	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：650	うつ病	169	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	006610	WHITE	女性	3[redacted]	ベンダムスチン：204.3	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：850								
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	悪心	1	43	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	背部痛	10	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	骨痛	10	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	血尿	10	3	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	尿閉	10	3	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	腹水	10	4	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	側腹部痛	43	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	腹痛	70	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	悪心	85	8	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	腹痛	98	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	腹痛	119	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	腹痛	167	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：204.3 リツキシマブ：850	悪心	167	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
	MCL	006612	WHITE	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	嘔吐	3	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	食欲減退	3	17	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	疲労	3	17	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	下痢	3	83	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	味覚異常	4	16	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	悪心	8	1	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	灼熱感	8	50	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	灼熱感	8	50	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	カテーテル留置部位疼痛	29	1	あり	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	四肢痛	30	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	四肢痛	30	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	血中マグネシウム減少	30	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	低血圧	30	3	あるかもしれない	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	腎尿細管壊死	30	5	あり	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	感染	30	5	あるかもしれない	Grade4	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	急性腎不全	30	17	あり	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2	失神	46	2	なし	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：970								
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	血中クレアチニン増加	46	16	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：232.2 リツキシマブ：970	第一度房室ブロック	46	149	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：193.5 リツキシマブ：970	体重減少	57	-	なし	Grade2	非重篤	減量	未回復
						ベンダムスチン：193.5 リツキシマブ：970	腹痛	57	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：193.5 リツキシマブ：970	頚部痛	57	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：193.5 リツキシマブ：970	薬物過敏症	57	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：193.5 リツキシマブ：970	口腔咽頭痛	58	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：193.5 リツキシマブ：970	悪心	61	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181.5 リツキシマブ：-	味覚異常	99	15	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	015516	WHITE	女性	7[redacted]		歯膿瘍	-14	13	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
							血小板減少症	-1	9	不明	Grade4	非重篤	なし	回復(後

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														遺症あり）
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	悪心	1	113	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	不眠症	3	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	頭痛	5	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	心雑音	5	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	鼻漏	5	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	血小板減少症	15	29	多分あり	Grade4	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	血小板減少症	43	8	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	頬粘膜のあれ	56	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	レッチング	58	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	発熱	58	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	悪寒	58	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	冷感	84	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	低カリウム血症	89	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	湿性咳嗽	89	12	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	間質性肺疾患	89	18	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	低酸素症	89	52	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	変形性関節症	99	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	変形性脊椎症	99	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	労作性呼吸困難	112	29	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	嘔吐	113	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	悪心	113	30	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	脱毛症	120	-	あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	末梢性浮腫	120	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	筋肉痛	120	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	末梢性ニューロパチー	120	21	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	関節痛	140	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	末梢性ニューロパチー	140	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	帯状疱疹	168	99	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：188 リツキシマブ：780	帯状疱疹	168	99	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	015707	WHITE	男性	4[redacted]	ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	咽喉刺激感	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	腹痛	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	腹痛	2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	便秘	3	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	消化不良	3	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	疲労	3	181	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	悪心	3	181	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	発熱	11	4	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	咳嗽	11	145	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	眼部腫脹	12	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	薬物過敏症	14	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	好中球減少症	50	14	あり	Grade4	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	表在性異物	60	33	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	動悸	79	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	骨痛	92	92	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	動悸	95	4	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	前立腺炎	127	29	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	前立腺炎	155	29	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：185 リツキシマブ：780	小腸閉塞	168	3	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
	NHL	016001	WHITE	男性	5[redacted]	ベンダムスチン： 178.2 リツキシマブ：740	皮膚真菌感染	1	57	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 178.2 リツキシマブ：740	霧視	18	87	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 178.2 リツキシマブ：740	季節性アレルギー	20	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン： 178.2 リツキシマブ：740	口内炎	27	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン： 178.2 リツキシマブ：740	発熱性好中球減少症	27	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 178.2 リツキシマブ：740	咳嗽	27	31	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：178.2 リツキシマブ：740	低γグロブリン血症	28	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
							食欲減退	-	2009-12-01	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：178.2 リツキシマブ：740	サイトメガロウイルス感染	57	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：178.2 リツキシマブ：740	好中球減少症	57	2	あり	Grade2	非重篤	減量	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：144 リツキシマブ：740	発熱性好中球減少症	70	6	あり	Grade4	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：144 リツキシマブ：740	口内炎	71	5	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：144 リツキシマブ：740	貧血	89	9	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：144 リツキシマブ：740	発熱性好中球減少症	89	9	なし	Grade2	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：144 リツキシマブ：740	血小板減少症	89	9	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：144 リツキシマブ：740	真菌感染	89	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：144 リツキシマブ：740	電解質失調	90	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：113 リツキシマブ：740	貧血	118	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：113 リツキシマブ：740	白血球減少症	132	-	あり	Grade1	非重篤	投与中断	未回復
						ベンダムスチン：113 リツキシマブ：740	好中球減少症	132	-	不明	Grade2	非重篤	投与中断	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	020003	WHITE	男性	8[redacted]	ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	低血圧	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	下肢静止不能症候群	1	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	末梢性浮腫	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	転倒	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	挫傷	1	2009-11	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	運動失調	2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：468.76	口内乾燥	29	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：468.76	術後創感染	29	36	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5	注入に伴う反応	29	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：468.76								
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：468.76	注入に伴う反応	29	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：468.76	注入に伴う反応	29	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	関節痛	64	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	悪寒	64	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	多汗症	64	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	悪寒	79	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：166.5 リツキシマブ：694	口内炎	94	10	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：138.8 リツキシマブ：694	好中球減少症	133	57	あり	Grade4	非重篤	投与中止	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：138.8 リツキシマブ：694	発熱性好中球減少症	136	8	あり	Grade3	重篤	投与中断	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：111 リツキシマブ：694	好中球減少症	232	49	多分あり	Grade4	重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：111 リツキシマブ：694	アフタ性口内炎	251	44	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：111 リツキシマブ：694	好中球減少症	281	27	多分あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：111 リツキシマブ：694	好中球減少症	308	106	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：111 リツキシマブ：694	好中球減少症	454	16	多分あり	Grade4	重篤	なし	回復
	NHL	020005	WHITE	男性	4[redacted]	ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	味覚異常	1	-	あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	聴覚過敏	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	疲労	1	5	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	羞明	1	63	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	咳嗽	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	潮紅	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	筋骨格系胸痛	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	発疹	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	消化不良	3	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪心	3	58	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	嘔吐	3	58	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	熱傷	25	46	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪寒	29	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	29	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	注入に伴う反応	57	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	熱感	57	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	疲労	85	5	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪心	85	6	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	四肢痛	110	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	鼻炎	114	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	悪寒	131	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	疲労	143	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	多汗症	153	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	肺炎	159	4	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	肺塞栓症	159	4	あるかもしれない	Grade4	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	肺塞栓症	162	127	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：207 リツキシマブ：862.5	高血圧	165	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	020007	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	悪寒	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	胸部不快感	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	潮紅	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	そう痒症	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	傾眠	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	嘔吐	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	発熱	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	皮膚熱感	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	胸部不快感	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	呼吸困難	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	疲労	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	悪心	2	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	頭痛	2	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	粘膜の炎症	6	2	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	末梢性浮腫	12	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	四肢痛	12	3	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	四肢痛	12	24	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	振戦	19	17	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	頭痛	26	2	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	悪心	26	31	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	嘔吐	26	31	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	血管穿刺部位血腫	26	96	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	傾眠	26	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	好中球減少症	77	42	あり	Grade3	重篤	減量	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	交通事故	84	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復（後

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														遺症あり）
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	筋骨格痛	84	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	関節痛	125	14	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	疲労	138	4	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	疲労	149	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	便秘	150	3	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	悪心	151	21	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	関節痛	152	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	インフルエンザ様疾患	155	5	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	関節腫脹	158	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン： 127.5 リツキシマブ：637	末梢性浮腫	178	40	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 127.5	好中球減少症	230	8	あり	Grade3	非重篤	投与中断	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：637								
	NHL	020010	WHITE	男性	6[redacted]		上気道感染	-1	5	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	頭痛	1	36	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	不眠症	2	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	便秘	2	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	霧視	2	35	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	皮膚疼痛	3	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	流涙増加	4	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	悪心	11	7	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	肺炎	11	7	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	呼吸困難	26	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6	食欲減退	26	11	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：765								
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	浮動性めまい	26	11	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	疲労	26	11	なし	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	非心臓性胸痛	26	11	なし	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	胸水	30	-	なし	Grade2	非重篤	投与中断	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	便秘	31	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	傾眠	37	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	食欲減退	37	48	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	薬物過敏症	37	3	なし	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	頭痛	38	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	悪心	38	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	肺炎	38	10	あるかもしれ	Grade3	重篤	投与中断	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	全身性浮腫	39	41	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	低カリウム血症	40	4	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	錯乱状態	41	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	薬物過敏症	44	2	なし	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	疲労	45	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	白血球減少症	46	7	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	好中球減少症	46	7	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	血小板減少症	46	7	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	聴力低下	47	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	胃食道逆流性疾患	47	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	発声障害	47	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	悪心	47	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	筋力低下	48	8	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	注入に伴う反応	72	2	なし	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	血小板減少症	72	3	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	脱毛症	99	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	錯感覚	101	30	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	錯感覚	130	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	血中マグネシウム減少	154	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：183.6 リツキシマブ：765	低カリウム血症	439	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	020014	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：132 リツキシマブ：551	下痢	19	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：132 リツキシマブ：551	筋肉痛	19	3	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：132 リツキシマブ：551	顎痛	19	3	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：132 リツキシマブ：551	注入に伴う反応	28	46	なし	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：132 リツキシマブ：476	口内炎	35	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：132 リツキシマブ：476	錯感覚	40	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：132 リツキシマブ：476	舌潰瘍	52	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	020102	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	頭痛	1	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	悪心	1	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	嘔吐	1	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	疲労	2	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	筋肉痛	17	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	悪心	29	3	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	発熱	29	1	あり	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	嘔吐	57	1	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	嘔吐	85	1	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	悪心	85	3	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	悪心	113	6	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	口腔内潰瘍形成	121	16	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	発熱	136	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	ヘモグロビン減少	167	2	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	労作性呼吸困難	167	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	赤芽球癆	189	168	多分あり	Grade4	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：126.9 リツキシマブ：529	便秘	367	4	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	020311	WHITE	女性	7[redacted]	ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	疲労	2	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	食欲減退	2	89	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	末梢性ニューロパチー	33	58	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	浮動性めまい	43	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	好中球減少症	111	8	あり	Grade3	非重篤	投与中断	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	低血圧	147	28	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	発熱性好中球減少症	161	2	あり	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	好中球減少症	161	2	多分あり	Grade4	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：710	下痢	163	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	020610	WHITE	男性	3[redacted]	ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	咽喉絞扼感	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	口腔咽頭痛	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	悪心	1	169	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
							便秘	-	2010-10-15	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	消化不良	29	141	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														あり）
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	ざ瘡	30	62	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	肺炎	49	38	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	疲労	103	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	発熱	103	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	寝汗	103	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	副鼻腔炎	107	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	好中球減少症	112	9	多分あり	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	皮膚炎	143	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	好中球減少症	157	5	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	発熱	162	1	あり	Grade1	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	好中球減少症	162	14	あり	Grade3	重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：184 リツキシマブ：765	好中球減少症	175	90	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	030103	WHITE	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：172 リツキシマブ：720	注入に伴う反応	1	2	なし	Grade2	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：720	背部痛	2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	不明

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：720	嗜眠	2	171	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：720	悪寒	13	4	なし	Grade1	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：720	発熱	13	4	なし	Grade1	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：720	発疹	13	4	なし	Grade1	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	発熱	29	2	多分あり	Grade3	重篤	投与中断	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：- ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	悪寒	29	2	多分あり	Grade3	重篤	投与中断	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	腹部膨満	59	55	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	食欲亢進	59	55	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	不眠症	59	55	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	悪心	114	30	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	注入部位冷感	114	1	あるかもしれ	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	注入部位冷感	115	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
							発疹	-	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
							記憶障害	-	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	不明
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：708	注入部位冷感	142	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	030305	WHITE	男性	4[redacted]	ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	疲労	1	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	悪寒	1	2	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	悪心	1	7	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	咳嗽	1	29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	呼吸困難	8	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	便秘	29	57	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	不安	29	141	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	不眠症	29	141	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	しゃっくり	58	8	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	尿路感染	71	12	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	下痢	142	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：181 リツキシマブ：754	菌血症	147	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
	NHL	030311	WHITE	男性	5[redacted]	ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	発疹	11	10	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	食欲減退	14	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	嘔吐	16	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	肺炎	16	5	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	頭痛	17	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	疼痛	17	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	便秘	17	7	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	坐骨神経痛	19	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	注入に伴う反応	29	1	なし	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	不安	43	71	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	呼吸困難	43	71	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	疲労	57	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	眼乾燥	57	98	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	眼部腫脹	57	98	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：790	発疹	110	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	030505	WHITE	男性	7[redacted]	ベンダムスチン： 151.7 リツキシマブ：632.3	サイトカイン放出症候群	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 151.7 リツキシマブ：632.3	錯乱状態	1	3	あるかもしれない	Grade4	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン： 151.7 リツキシマブ：632.3	末梢性浮腫	114	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン： 151.7 リツキシマブ：632.3	注射部位血管外漏出	231	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	030506	WHITE	男性	5[redacted]		疲労	-7	-	多分あり	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン： 164.6 リツキシマブ：685.8	不眠症	27	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン： 164.6 リツキシマブ：685.8	筋骨格痛	30	182	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン： 164.6 リツキシマブ：685.8	末梢性感覚ニューロパチー	31	2	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	注入に伴う反応	58	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	便秘	59	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	腹痛	86	1	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	悪心	86	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	不安	120	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	発熱	131	7	多分あり	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中ブドウ糖増加	149	-	不明	Grade3	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	胸膜痛	160	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	便秘	178	2	あるかもしれない	Grade2	重篤	なし	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	腹痛	184	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	悪心	184	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中カリウム減少	184	28	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	胃食道逆流性疾患	184	29	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	便秘	186	22	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中マグネシウム減少	186	24	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	好中球数減少	187	3	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	咳嗽	189	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	低酸素症	189	-	あるかもしれない	Grade4	重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	低血圧	189	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	貧血	189	23	不明	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	トロポニン増加	190	22	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	激越	191	18	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	肺水腫	191	21	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	194	19	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	好中球数減少	196	11	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中リン減少	200	9	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	血中アルブミン減少	202	10	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：164.6 リツキシマブ：685.8	低血圧	202	11	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
	NHL	030509	WHITE	女性	4[redacted]		呼吸困難	-6	2011-02	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	注入に伴う反応	1	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	注入に伴う反応	1	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	注入に伴う反応	1	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	悪心	1	3	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	上気道感染	18	6	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	脱毛症	28	59	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	消化不良	29	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	急性熱性好中球性皮膚症	29	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	便秘	78	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	逆流性胃炎	147	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	頭痛	147	2	多分あり	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：155.7 リツキシマブ：648.7	悪心	147	2	多分あり	Grade1	重篤	なし	回復
	NHL	030604	WHITE	女性	5[redacted]	ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	疲労	1	7	あり	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	悪心	1	182	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	関節腫脹	2	2	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	喘息	2	15	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	動悸	3	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	胸部不快感	8	9	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	口腔内潰瘍形成	8	29	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	薬物過敏症	30	3	不明	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	上腹部痛	36	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	筋骨格系胸痛	60	2	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	四肢痛	76	69	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	口腔内潰瘍形成	80	2	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4	腋窩痛	83	8	不明	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：622.5								
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	感覚鈍麻	87	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	筋肉痛	92	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
							外陰部腟カンジダ症	-	2010-08-20	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	感覚鈍麻	111	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	筋骨格痛	113	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	筋緊張	113	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	嗜眠	134	34	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	筋緊張	150	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：149.4 リツキシマブ：622.5	口腔内潰瘍形成	165	3	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	030605	WHITE	女性	5[redacted]	ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	下肢静止不能症候群	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	歯膿瘍	11	5	不明	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	下痢	13	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	下痢	14	4	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	胃腸音異常	26	46	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	鼓腸	26	46	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	発疹	51	21	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	腹部膨満	57	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	便秘	86	5	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	腹痛	86	8	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	悪心	86	8	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8	筋骨格痛	100	12	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：795								
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	腹痛	113	4	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	便秘	113	4	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	便秘	141	9	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190.8 リツキシマブ：795	気管支炎	156	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	030701	OTHER	男性	3[redacted]	ベンダムスチン：171 リツキシマブ：735	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：735	肝臓痛	18	2009	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：735	悪心	28	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：735	嘔吐	29	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712	嘔吐	57	1	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
							下気道感染	-	2009-11-29	なし	Grade2	非重篤	投与中断	回復
							下気道感染	-	2009-12-31	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712	悪心	91	1	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712	頭痛	98	2	不明	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712	好中球減少症	99	8	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：712	好中球減少症	127	7	あるかもしれない	Grade4	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：712	好中球減少症	134	4	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：712	上腹部痛	135	2010-01	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：712	肺炎	166	4	なし	Grade3	重篤	なし	回復
	NHL	030702	OTHER	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	低カルシウム血症	1	2	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	低カリウム血症	1	2	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	背部痛	1	3	なし	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	そう痒症	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	頭痛	2	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
							注入部位静脈炎	-	2010-01	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	悪心	30	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	血液培養陽性	30	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	嘔吐	30	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	胆石症	30	4	なし	Grade2	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	側腹部痛	44	2010-01	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	背部痛	49	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	好中球減少症	51	7	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	好中球減少症	57	5	あるかもしれない	Grade4	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	四肢痛	91	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	注入に伴う反応	92	1	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	好中球減少症	106	9	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：713	好中球減少症	142	15	あるかもしれない	Grade4	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：716	高血圧	170	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	MCL	030803	WHITE	男性	7[redacted]	ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	下痢	9	3	不明	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	悪心	9	4	不明	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	嘔吐	9	4	不明	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	疲労	11	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	歯肉痛	11	23	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	食欲減退	11	51	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	注入に伴う反応	33	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	便秘	53	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	好中球減少症	61	2	多分あり	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	悪心	90	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	そう痒症	90	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	医療機器合併症	90	57	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	冷感	113	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	食欲減退	146	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	咳嗽	146	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	呼吸困難	146	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	031003	WHITE	男性	5[redacted]		皮膚炎	-5	84	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：750	痔核	1	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：750	注入に伴う反応	1	2	なし	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：750	便秘	29	51	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：190 リツキシマブ：750	多尿	29	51	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	031502	WHITE	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	上腹部痛	13	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	排尿困難	41	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	頭痛	56	57	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	睡眠障害	62	-	不明	Grade1	非重篤	なし	不明
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	結膜炎	90	23	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：187 リツキシマブ：780	前立腺炎	133	3	不明	Grade2	重篤	なし	回復
	NHL	031702	WHITE	女性	6[redacted]		頭痛	-1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	口内乾燥	2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	四肢痛	2	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	便秘	5	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	疲労	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	悪心	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	腹痛	29	155	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	動悸	34	150	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	副鼻腔うっ血	46	114	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	錯感覚	90	23	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	下腹部痛	114	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	発熱性好中球減少症	114	6	あり	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	下痢	124	29	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	口腔カンジダ症	131	38	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	皮膚真菌感染	148	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	好中球減少症	189	20	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	好中球減少症	208	17	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	好中球減少症	224	162	あるかもしれ	Grade1	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	好中球減少症	385	64	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	四肢痛	395	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：171 リツキシマブ：712.5	好中球減少症	448	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	031804	WHITE	女性	2[redacted]		下痢	-7	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	悪心	3	4	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	発疹	13	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	筋痙縮	19	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	背部痛	19	3	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	薬物過敏症	29	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	薬物過敏症	29	1	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	発熱	29	5	多分あり	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	悪心	29	117	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152	そう痒症	29	124	あるか	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：634				もしれない				
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	頭痛	29	212	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	不眠症	30	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：152 リツキシマブ：634	好中球減少症	36	21	多分あり	Grade4	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：139 リツキシマブ：634	体重減少	57	126	なし	Grade2	非重篤	減量	回復
						ベンダムスチン：139 リツキシマブ：634	低血圧	85	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：139 リツキシマブ：634	悪寒	86	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：139 リツキシマブ：634	嗅覚錯誤	87	156	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：139 リツキシマブ：634	好酸球増加症	120	21	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：139 リツキシマブ：634	溢出	142	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：139 リツキシマブ：634	疲労	142	40	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	031808	WHITE	女性	5[redacted]		非心臓性胸痛	-7	31	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	薬物過敏症	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	不安	1	59	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	悪心	1	221	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	嘔吐	4	2	多分あり	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	便秘	4	4	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	悪心	4	6	多分あり	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	頭痛	6	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	咳嗽	9	37	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	悪心	10	23	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	低酸素症	24	1	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	嘔吐	24	7	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	胸水	24	69	なし	Grade3	重篤	投与中断	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	疲労	29	220	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	低アルブミン血症	37	1	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	悪心	37	50	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	カテーテル留置部位疼痛	38	52	なし	Grade4	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	浮動性めまい	45	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	低血圧	45	35	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	嘔吐	49	3	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	嘔吐	52	1	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	発熱	61	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	口腔咽頭痛	61	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	発熱	62	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	シュードモナス感染	62	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	嘔吐	66	1	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	医療機器関連の血栓症	67	26	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	血中アルカリホスファターゼ増加	87	21	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	87	21	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	87	21	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	87	21	あるかもしれ	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
										ない				
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	嘔吐	89	133	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	胸水	93	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	四肢痛	126	12	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	便秘	136	83	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	悪心	136	99	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	インフルエンザ様疾患	138	27	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	関節痛	164	57	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	萎縮性外陰腟炎	219	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：160 リツキシマブ：667.5	咳嗽	246	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	040102	WHITE	男性	5[redacted]	ベンダムスチン：210 リツキシマブ：873	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：210 リツキシマブ：873	痛風	13	15	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：210 リツキシマブ：862	注入に伴う反応	28	1	なし	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：210 リツキシマブ：862	門脈血栓症	38	11	不明	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	040104	WHITE	男性	8■	ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	腫瘍崩壊症候群	5	3	多分あり	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	好中球減少症	48	11	多分あり	Grade4	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	関節痛	63	-	不明	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	発疹	91	30	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	痛風	91	30	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	下痢	140	3	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	皮膚病変	147	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：214 リツキシマブ：893	歯膿瘍	162	8	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
	MCL	040107	WHITE	男性	6■	ベンダムスチン：163 リツキシマブ：697	落ち着きのなさ	1	1	なし	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：163 リツキシマブ：272	注入に伴う反応	29	4	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：163 リツキシマブ：100	注入に伴う反応	57	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：163 リツキシマブ：-	注入に伴う反応	141	1	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	040108	WHITE	男性	6■	ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	感染による慢性閉塞性気道疾患の増悪	5	7	不明	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	感染による慢性閉塞性気道疾患の増悪	23	6	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	血小板数減少	27	9	あるかもしれない	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	発熱性好中球減少症	37	11	あり	Grade3	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	不眠症	43	4	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	舌潰瘍	58	6	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	上気道感染	58	6	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：198 リツキシマブ：825	慢性閉塞性肺疾患	75	9	あるかもしれない	Grade1	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：198 リツキシマブ：825	ニューモシスティスジロヴェシ感染	86	19	多分あり	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：198 リツキシマブ：825	慢性閉塞性肺疾患	86	27	あるかもしれない	Grade1	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：198 リツキシマブ：825	硝子体浮遊物	90	1	不明	Grade1	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：198 リツキシマブ：825	血中クレアチニン増加	98	-	不明	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：198 リツキシマブ：825	血中カリウム増加	98	8	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
	NHL	040114	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：180	悪心	1	-	多分あ	Grade2	非重篤	なし	未回

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：746				り				復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	注入に伴う反応	2	1	多分あり	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	注入に伴う反応	3	1	多分あり	Grade1	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	カンジダ症	12	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	ウイルス感染	25	2	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	ウイルス感染	26	3	多分あり	Grade1	重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	26	11	あるかもしれない	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	口腔カンジダ症	34	11	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	胸膜痛	37	1	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	憩室炎	75	6	多分あり	Grade2	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	憩室炎	81	12	多分あり	Grade2	非重篤	投与中断	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	憩室炎	93	8	多分あり	Grade2	重篤	投与中断	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	憩室炎	101	-	多分あり	Grade2	非重篤	投与中断	未回復
						ベンダムスチン：180 リツキシマブ：746	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	132	8	あるかもしれない	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：746	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	170	1	多分あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：746	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	171	7	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：170 リツキシマブ：746	低カリウム血症	176	6	不明	Grade3	非重篤	なし	回復
	NHL	040203	WHITE	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：150 リツキシマブ：600	薬物過敏症	29	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：600	悪心	29	3	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：600	嘔吐	29	3	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：600	頭痛	36	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：150 リツキシマブ：600	乳房痛	55	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155 リツキシマブ：650	そう痒症	57	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：155 リツキシマブ：650	錯感覚	69	13	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														遺症あり）
	NHL	040501	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	発熱	10	3	あり	Grade1	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	発熱	14	2	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	口腔内潰瘍形成	24	5	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	外陰部腟カンジダ症	26	6	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	胃食道逆流性疾患	28	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	上気道感染	30	8	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	肛門の炎症	33	2010-01	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	粘膜の炎症	58	4	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	好中球減少症	113	7	あり	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：135.9 リツキシマブ：566.25	カンジダ症	120	6	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	040506	WHITE	女性	6[redacted]	ベンダムスチン：160.2 リツキシマブ：667.5	好中球減少症	57	12	あり	Grade4	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：160.2 リツキシマブ：667.5	発熱性好中球減少症	61	3	あり	Grade4	重篤	投与中断	回復
	NHL	040509	WHITE	男性	5[redacted]	ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	頭痛	5	4	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	ウイルス感染	47	3	不明	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：200 リツキシマブ：836	そう痒性皮疹	130	-	多分あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	050401	WHITE	女性	5[redacted]	ベンダムスチン：134 リツキシマブ：150	アナフィラキシーショック	1	1	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：134 リツキシマブ：150	リンパ球減少症	6	7	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：134 リツキシマブ：150	リンパ球減少症	25	34	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	好中球減少症	41	7	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	62	7	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	好中球減少症	69	5	あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	69	9	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	好中球減少症	74	4	あり	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	78	3	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	81	4	あるかもしれない	Grade4	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	好中球減少症	81	4	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	背部痛	84	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	85	7	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	好中球減少症	85	18	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	92	18	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	97	33	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	97	33	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	好中球減少症	110	6	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	116	7	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：133 リツキシマブ：555	好中球減少症	123	7	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	斑状丘疹状皮疹	135	38	多分あり	Grade2	非重篤	投与中断	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	リンパ球減少症	137	7	あるかもしれない	Grade4	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	リンパ球減少症	144	7	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	好中球減少症	144	14	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	リンパ球減少症	151	11	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	好中球減少症	158	4	あり	Grade4	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	リンパ球減少症	162	7	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	リンパ球減少症	169	10	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：142.2 リツキシマブ：592	好中球減少症	169	10	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：118.5 リツキシマブ：555	斑状丘疹状皮疹	175	22	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：118.5 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	186	21	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：118.5 リツキシマブ：555	好中球減少症	200	7	あり	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：121.5 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	207	7	あるかもしれない	Grade4	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：121.5 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	214	9	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：121.5 リツキシマブ：555	好中球減少症	214	14	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：121.5 リツキシマブ：555	リンパ球減少症	228	-	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	未回復
	MCL	050703	WHITE	男性	5[redacted]		勃起不全	-	2010-11-18	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
							四肢痛	-15	45	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							末梢性浮腫	-15	77	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	疼痛	3	237	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	鼻閉	16	2010-10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	口腔咽頭痛	16	2010-10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	16	7	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	22	26	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	白血球減少症	42	6	あり	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	好中球減少症	42	6	あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：171.9 リツキシマブ：716	貧血	42	21	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	70	8	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	77	7	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	好中球減少症	77	7	あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	83	18	あり	Grade1	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	100	15	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	114	15	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	128	15	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	142	15	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	156	8	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	163	22	あり	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	慢性閉塞性肺疾患	175	30	不明	Grade2	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	184	34	あり	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	好中球減少症	191	7	あり	Grade1	非重篤	なし	回復
							頭痛	-	2011-05	不明	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	慢性閉塞性肺疾患	204	70	不明	Grade3	非重篤	なし	軽快
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	リンパ球減少症	217	-	あり	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：172 リツキシマブ：716	慢性閉塞性肺疾患	273	114	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
	NHL	060001	WHITE	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	上腹部痛	1	1	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	悪心	3	-	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	便秘	3	2	あるかもしれない	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	カテーテル留置部位疼痛	5	10	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	無力症	31	9	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	歯痛	41	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	無力症	50	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	頭痛	51	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	腹部膨満	51	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	腹痛	56	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	腹部膨満	56	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	血中乳酸脱水素酵素増加	84	-	なし	Grade3	非重篤	投与中止	不明
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	脾腫	87	1	なし	Grade4	重篤	投与中止	回復
						ベンダムスチン：162 リツキシマブ：675	急性呼吸不全	138	1	なし	Grade5	重篤	なし	死亡
	NHL	060102	OTHER	男性	6[redacted]		胸水	-2	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：153 リツキシマブ：637	帯状疱疹	2	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	070001	OTHER	男性	6[redacted]	ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	脂肪織炎	10	38	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	急性中耳炎	13	42	不明	Grade2	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	ＩＮＲ増加	19	39	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	白血球減少症	19	44	あるかもしれない	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	鼓膜穿孔	20	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：143 リツキシマブ：596	カンジダ症	21	26	不明	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	回転性めまい	37	1	不明	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	直腸出血	40	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	鉄欠乏性貧血	43	20	不明	Grade3	非重篤	なし	不明
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	好中球減少症	57	3	あり	Grade3	重篤	なし	回復(後

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														遺症あり)
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	肺炎	57	6	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	呼吸不全	57	6	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
						ベンダムスチン：135 リツキシマブ：562.5	敗血症性ショック	61	2	あるかもしれない	Grade5	重篤	なし	死亡
	NHL	070003	OTHER	女性	4[redacted]	ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	咳嗽	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	発疹	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	頭痛	18	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	28	15	多分あり	Grade2	非重篤	投与中断	軽快
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	発疹	43	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	白血球減少症	49	3	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9	リンパ球減少症	49	3	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復(後

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：678.75								遺症あり）
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	好中球減少症	49	3	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復（後遺症あり）
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	鼻咽頭炎	62	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復（後遺症あり）
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	乳房腫瘤	70	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	気管支痙攣	70	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	咽頭炎	70	14	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	疲労	74	2	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	白血球減少症	77	15	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	好中球減少症	77	15	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	リンパ球減少症	77	36	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	体重減少	98	88	多分あり	Grade1	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	白血球減少症	105	3	多分あり	Grade4	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	消化管感染	105	5	あるかもしれない	Grade3	重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	好中球減少症	105	8	多分あり	Grade4	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	頭痛	115	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：162.9 リツキシマブ：678.75	口腔ヘルペス	124	17	あるかもしれない	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.75 リツキシマブ：678.75	疲労	129	2	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.75 リツキシマブ：678.75	好中球減少症	153	4	多分あり	Grade3	非重篤	投与中断	回復
						ベンダムスチン：135.75 リツキシマブ：678.75	頭痛	155	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.75 リツキシマブ：678.75	疲労	158	2	多分あり	Grade3	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.75 リツキシマブ：678.75	疲労	160	3	多分あり	Grade2	非重篤	なし	回復
						ベンダムスチン：135.75	接触性皮膚炎	167	15	不明	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：678.75								
RITUXIMAB-CHOP	MCL	000901	WHITE	女性	6[redacted]	リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	1	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	1	139	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔咽頭痛	8	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	8	4	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	8	41	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	22	48	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	69	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胃食道逆流性疾患	69	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	消化不良	69	43	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	季節性アレルギー	76	15	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	77	9	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	001903	WHITE	男性	4[redacted]	リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	気管支痙攣	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	振戦	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肋軟骨炎	8	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	喘鳴	16	77	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	16	112	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不安	17	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	17	5	なし	Grade4	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：773 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：- プレドニゾロン：100	頭痛	22	71	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：773 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：- プレドニゾロン：100	悪心	22	71	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：773 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	57	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：773 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	65	28	なし	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：773 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	65	28	なし	Grade1	非重篤	なし	回復