投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：773 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	71	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：770 シクロフォスファミド：1540 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	直腸出血	100	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：770 シクロフォスファミド：1540 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	味覚異常	106	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	003006	WHITE	女性	5[redacted]	リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	4	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔咽頭痛	4	130	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹部膨満	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	8	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱水	8	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	8	8	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	非心臓性胸痛	19	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うつ病	19	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：78 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うつ病	21	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	28	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	49	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	49	85	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	105	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	112	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：585 シクロフォスファミド：1170 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上腹部痛	112	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	003008	WHITE	男性	5[redacted]	リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血圧	1	29	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	しゃっくり	2	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	認知障害	2	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	感覚鈍麻	6	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	6	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	非心臓性胸痛	11	2	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入部位血栓	11	12	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	12	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	25	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	27	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	皮膚乾燥	29	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：788 シクロフォスファミド：1575 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	感覚鈍麻	29	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	003021	WHITE	女性	4[redacted]	リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	薬物過敏症	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血圧	8	25	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	8	36	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	8	36	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	外陰膣真菌感染	8	36	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	嘔吐	8	36	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	舌痛	8	50	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	11	124	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	膣膿瘍	18	26	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	霧視	56	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	流涙増加	64	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血圧	64	2	なし	Grade3	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	潮紅	64	71	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 ドキソルビシン：110 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血圧	66	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	004601	WHITE	女性	5[redacted]	リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胸痛	5	1	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	5	1	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	5	2	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	7	20	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	嘔吐	13	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	14	35	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	27	35	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	49	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	発熱	59	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	悪心	59	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	嘔吐	59	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	食欲減退	59	12	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	62	9	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	寝汗	85	55	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	疲労	112	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	処置合併症	133	2	なし	Grade1	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	四肢痛	135	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：690 シクロフォスファミド：1380 ドキソルビシン：92 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	錯感覚	135	35	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	MCL	005001	WHITE	男性	6[redacted]	リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	5	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	5	102	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	11	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	しゃっくり	15	50	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	15	92	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：889 シクロフォスファミド：1778 ドキソルビシン：119 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	36	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	50	57	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	直腸出血	57	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：881 シクロフォスファミド：1763 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	71	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔ヘルペス	85	43	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	106	43	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	106	355	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	113	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	125	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	134	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	155	8	なし	Grade4	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脊椎圧迫骨折	155	59	なし	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	背部痛	155	403	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	過敏症	156	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	鼻乾燥	158	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肺塞栓症	169	292	なし	Grade4	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	呼吸困難	175	25	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	神経痛	176	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：885 シクロフォスファミド：1770 ドキソルビシン：118 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	178	16	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	MCL	005402	WHITE	男性	8[redacted]	リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	2	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	8	2	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	8	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	8	3	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	8	7	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	8	42	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	8	42	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	10	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	10	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	10	6	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	眼感染	10	6	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	15	6	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	21	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1360 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中クレアチニン増加	21	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	22	21	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	29	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	29	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	43	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	57	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節滲出液	57	15	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	四肢痛	57	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	57	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	滑膜炎	60	-	なし	Grade1	非重篤	なし	不明
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	滑液嚢腫	60	25	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	半月板障害	60	25	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	63	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	点状出血	63	29	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	71	7	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	78	6	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：1000 ドキソルビシン：68 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	84	7	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	91	6	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	91	8	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	91	8	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	97	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱水	97	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	呼吸困難	97	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	97	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	98	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	99	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	99	6	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	105	4	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板減少症	109	25	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：680 シクロフォスファミド：680 ドキソルビシン：46 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血圧	126	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	005706	WHITE	男性	5[redacted]	リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：- プレドニゾロン：100	便秘	2	89	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋肉痛	23	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	夜間頻尿	23	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	23	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	23	21	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	41	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	小腸閉塞	107	10	なし	Grade3	重篤	なし	回復
							切開部位感染	-	2011-09-16	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：96 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	処置による疼痛	116	70	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
	NHL	006613	WHITE	女性	5[redacted]	リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：100	腹痛	3	13	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：100	関節痛	5	11	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：100	不安	8	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：100	白血球減少症	8	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：20	味覚異常	8	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：20 プレドニゾロン：100	好中球減少症	8	15	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	四肢痛	43	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	丘疹	43	21	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	43	21	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	50	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	50	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	63	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	63	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	非心臓性胸痛	69	3	なし	Grade2	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	70	8	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	左脚ブロック	70	118	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	心電図ＱＴ延長	70	118	なし	Grade2	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	105	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道咳症候群	105	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	140	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：840 シクロフォスファミド：1690 ドキソルビシン：113 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	心電図ＱＴ延長	187	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	MCL	015501	WHITE	男性	7[redacted]	リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胸膜炎	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	1	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	インフルエンザ様疾患	1	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低酸素症	1	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発声障害	5	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	排尿困難	8	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔カンジダ症	8	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	8	99	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	12	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	14	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	歯感染	15	2	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱水	15	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	8	なし	Grade4	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	22	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球増加症	22	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	22	43	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	レンサ球菌性咽頭炎	49	16	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	感覚鈍麻	62	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	尿路閉塞	64	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋骨格痛	105	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：660 シクロフォスファミド：1320 ドキソルビシン：88 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	帯状疱疹	105	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	030307	WHITE	女性	5[redacted]	リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道感染	13	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	22	29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下気道感染	31	5	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下気道感染	35	30	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：818 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	異常感覚	57	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	71	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	72	49	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	静脈穿刺不良	100	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：836 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	113	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	031001	WHITE	男性	4[redacted]	リツキシマブ：743 シクロフォスファミド：1485 ドキソルビシン：99 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	1	135	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：743 シクロフォスファミド：1485 ドキソルビシン：99 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：743 シクロフォスファミド：1485 ドキソルビシン：99 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	8	128	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：743 シクロフォスファミド：1485 ドキソルビシン：99 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注意力障害	22	114	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：743 シクロフォスファミド：1485 ドキソルビシン：99 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	26	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1485 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	57	14	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1485 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	74	62	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	胸部不快感	96	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	031503	WHITE	女性	6[redacted]		上腹部痛	-16	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	感覚鈍麻	20	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔咽頭痛	20	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	41	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	41	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	感覚鈍麻	41	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	単純ヘルペス	41	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	四肢静脈血栓症	91	-	なし	Grade2	非重篤	なし	不明
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	96	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	101	4	なし	Grade2	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	創傷	102	-	なし	Grade1	非重篤	なし	不明
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	外陰部腟カンジダ症	102	-	なし	Grade1	非重篤	なし	不明
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	102	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	102	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	112	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：626 シクロフォスファミド：1300 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	159	4	なし	Grade2	重篤	なし	回復
	NHL	031807	WHITE	男性	5[redacted]	リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	14	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中クレアチニン増加	14	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	14	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	14	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	3	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋肉痛	24	101	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	25	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	味覚異常	27	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	浮動性めまい	27	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	27	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注意力障害	27	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	27	97	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：750 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	鎖骨骨折	61	17	なし	Grade3	重篤	なし	回復
	NHL	040101	WHITE	女性	6[redacted]		足骨折	-15	35	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	喘息	3	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	3	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	嘔吐	3	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うっ血性心不全	4	20	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下気道感染	4	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	15	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：90	表在性血栓性静脈炎	39	53	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：844 シクロフォスファミド：1500 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	食道痙攣	130	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	040111	WHITE	男性	4[redacted]		不眠症	-	2011-03-16	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	21	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	43	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	抑うつ気分	43	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1400 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	61	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	69	18	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1450 ドキソルビシン：95 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	82	26	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ジストニー	108	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1350 ドキソルビシン：90 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中カリウム減少	109	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復
	NHL	040306	WHITE	男性	6[redacted]		背部痛	-10	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	9	4	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	10	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	単径部感染	16	48	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	44	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	44	94	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：700 シクロフォスファミド：1420 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	57	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	050202	WHITE	女性	5[redacted]	リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔咽頭痛	2	23	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	4	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うつ病	4	39	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	嚥下痛	8	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	11	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	27	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	27	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	27	8	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	35	2011-01	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	43	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	44	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	63	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	94	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肛門周囲痛	112	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	112	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	133	2011-03	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	136	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胃腸炎	166	12	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	左室機能不全	209	4	なし	Grade3	重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：705 シクロフォスファミド：1410 ドキソルビシン：94 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	左室機能不全	213	-	なし	Grade1	重篤	なし	未回復
	NHL	050702	WHITE	女性	4[redacted]	リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	8	21	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	15	1	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	15	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
							粘膜の炎症	-	2010-11-08	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							疼痛	-	2011-01-25	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	40	17	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	43	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	43	10	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	体重増加	56	66	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不安	57	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	66	57	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	71	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	77	24	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	アフタ性口内炎	77	45	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血圧	79	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	毛包炎	79	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	80	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	93	23	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	93	42	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	100	4	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	103	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	103	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	115	8	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	120	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	121	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	121	2	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	121	6	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	体重増加	121	14	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	122	5	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	122	5	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	122	20	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	122	29	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	四肢痛	122	71	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	副鼻腔炎	125	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発疹	126	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	126	9	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	126	37	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	体重増加	134	29	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	135	16	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うつ病	135	91	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	150	13	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	150	13	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	150	13	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	体重増加	162	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	162	8	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	162	8	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	166	4	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	166	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	166	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	168	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	169	9	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	169	9	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	169	9	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	169	24	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	177	16	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	177	16	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	177	23	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	199	27	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	206	20	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	206	20	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：772 シクロフォスファミド：1545 ドキソルビシン：103 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	206	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	MCL	050901	WHITE	女性	6[redacted]		傾眠	-26	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							無力症	-4	5	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	そう痒性皮疹	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	眼そう痒症	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67	悪心	1	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						オンコビン：2 プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	1	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	1	21	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	5	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	11	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	22	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	22	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	35	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2	白血球減少症	36	7	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	36	7	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	51	7	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	51	7	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	57	7	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道感染	58	13	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肛門感染	78	3	なし	Grade3	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	78	3	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	78	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2	好中球減少症	78	3	なし	Grade4	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肛門感染	81	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ節炎	101	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口内炎	101	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔内潰瘍形成	101	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	108	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	鼻部不快感	108	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	流涙増加	108	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	115	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2	好中球減少症	115	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	舌潰瘍	116	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	119	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	122	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：650.02 シクロフォスファミド：1300.05 ドキソルビシン：86.67 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	122	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	MCL	051102	OTHER	女性	5[redacted]	リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	7	86	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	9	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	10	2	なし	Grade3	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	10	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	11	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	12	7	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	排尿困難	13	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	14	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低血圧	17	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	19	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	排尿困難	22	47	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	65	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頚部痛	72	25	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	気道感染	122	27	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	122	37	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 ドキソルビシン：85 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	アフタ性口内炎	140	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	MCL	060303	OTHER	男性	4[redacted]		咽頭膿瘍	-23	87	なし	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	1	131	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	13	10	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2	貧血	13	24	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：645 シクロフォスファミド：1290 ドキソルビシン：86 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	13	98	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	78	12	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	103	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	β２ミクログロブリン増加	110	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2	咽頭炎	117	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	124	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：630 シクロフォスファミド：1260 ドキソルビシン：84 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咽頭炎	124	8	なし	Grade2	重篤	なし	回復
	MCL	070304	WHITE	男性	7[redacted]	リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	吐血	7	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	7	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	メレナ	8	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	15	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うっ血性心不全	19	11	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	19	2010-12	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上室性頻脈	28	2	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2	胸水	29	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	潮紅	30	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	うっ血性心不全	30	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：97 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不安	42	108	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	心房細動	48	1	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：- オンコビン：2	真菌感染	56	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	転倒	58	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：727.5 シクロフォスファミド：1455 ドキソルビシン：- オンコビン：2 プレドニゾロン：100	橈骨骨折	58	18	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
RITUXIMAB-CVP	NHL	000405	WHITE	男性	7[redacted]	リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道感染	37	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道感染	60	4	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	心停止	62	1	なし	Grade4	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	転倒	62	1	なし	Grade4	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	失神	62	1	なし	Grade4	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頚椎骨折	62	9	なし	Grade4	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頚部痛	62	53	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	63	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血糖	63	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2	体重減少	63	25	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	尿閉	63	31	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯乱状態	70	18	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1655 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	尿路感染	104	11	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	003014	WHITE	男性	4[redacted]	リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	15	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	15	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	副鼻腔炎	15	29	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	24	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	浮動性めまい	36	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	36	6	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	41	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	57	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	57	5	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2	好中球減少症	62	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	76	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	呼吸困難	76	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	顎痛	76	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	76	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	顔面腫脹	76	10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1710 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	78	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：855 シクロフォスファミド：1283 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	92	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
	NHL	005801	WHITE	男性	3[redacted]	リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不眠症	5	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	5	18	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板数減少	9	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	9	41	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中アルカリホスファターゼ増加	20	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2	血中ブドウ糖増加	20	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球数減少	20	17	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹部膨満	21	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球数減少	22	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	27	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	胸部不快感	27	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	呼吸困難	27	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	27	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ節症	27	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	背部痛	27	3	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中アルカリホスファターゼ増加	40	42	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	50	13	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	蜂巣炎	54	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2	ヘモグロビン減少	64	7	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	71	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中アルカリホスファターゼ増加	82	22	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	82	22	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中アルカリホスファターゼ増加	104	6	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	104	6	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	104	6	なし	Grade3	非重篤	なし	軽快

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	104	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	110	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	110	7	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中アルカリホスファターゼ増加	110	43	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	117	14	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	131	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	006603	WHITE	女性	5[redacted]	リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2	注入に伴う反応	1	2	なし	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	認知障害	5	38	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	5	49	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	副鼻腔炎に伴う頭痛	5	81	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	7	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	7	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	8	15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
							皮膚色素過剰	-	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
							そう痒症	-	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋萎縮	21	106	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	潮紅	22	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腹痛	22	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血圧	22	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	副鼻腔うっ血	22	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	くしゃみ	22	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
							四肢痛	-	2010-08-03	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	認知障害	43	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	歯感染	43	22	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	43	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中尿酸増加	43	63	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下腹部痛	50	56	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	50	77	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：575 シクロフォスファミド：1150 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	挫傷	63	23	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	65	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球数減少	71	15	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球数減少	71	35	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋骨格痛	85	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：600 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上気道感染	97	9	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	007401	WHITE	女性	7[redacted]	リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1420 オンコビン：1.5	精神運動亢進	42	34	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1420 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：100	心房細動	64	2	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：710 シクロフォスファミド：1420 オンコビン：1.5 プレドニゾロン：- プレドニゾロン：100	原発性異型肺炎	131	11	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	MCL	015503	WHITE	女性	8[redacted]	リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	疲労	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	背部痛	5	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	悪心	7	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3	嘔吐	7	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	悪心	9	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	嘔吐	9	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	食道炎	10	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	腹痛	11	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	便秘	11	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	肺炎	11	25	なし	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	下痢	16	20	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	脱毛症	35	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	便秘	37	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	骨痛	45	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	不眠症	63	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	関節痛	69	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3	食欲減退	70	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	カンジダ症	70	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	発熱	70	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	好中球減少症	70	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：610 シクロフォスファミド：1210 オンコビン：2.3 プレドニゾロン：100	体重減少	70	9	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	020009	WHITE	女性	7[redacted]	リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	認知障害	2	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	2	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	心筋梗塞	2	1	なし	Grade4	重篤	なし	回復
							筋肉痛	-	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	15	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	高血糖	22	2	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	25	73	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	53	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	109	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	109	46	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	112	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：668 シクロフォスファミド：1335 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	消化不良	116	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	020302	ASIAN	女性	5[redacted]	リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	下痢	2	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	腹痛	3	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	便秘	3	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4	呼吸困難	3	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	口内乾燥	4	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	脱毛症	5	185	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	歯感染	12	11	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1700 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	14	4	なし	Grade4	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1500 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	好中球減少症	36	14	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	好中球減少症	91	8	なし	Grade4	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	99	91	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	潮紅	101	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	筋肉痛	102	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：640 シクロフォスファミド：1300 オンコビン：2.4 プレドニゾロン：100	好中球減少症	140	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
	NHL	020602	WHITE	女性	5[redacted]		側腹部痛	-	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
							高血糖	-	2010-05	なし	Grade2	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	サイトカイン放出症候群	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	4	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	7	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
							高血糖	-	2010-06-11	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	81	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	労作性呼吸困難	100	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	100	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低酸素症	100	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2	感染	100	2	なし	Grade3	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	140	5	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	144	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：820 シクロフォスファミド：1640 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	好中球減少症	162	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	030401	WHITE	男性	6[redacted]	リツキシマブ：922 シクロフォスファミド：1845 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血小板数増加	29	7	なし	-	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：922 シクロフォスファミド：1845 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球数増加	29	14	なし	-	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：922 シクロフォスファミド：1845 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球数増加	29	14	なし	-	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：922 シクロフォスファミド：1845 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	術後創感染	35	67	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：922 シクロフォスファミド：1845 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中ブドウ糖増加	43	-	なし	Grade3	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：922 シクロフォスファミド：1845 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	血中アルブミン減少	43	42	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：922 シクロフォスファミド：1845 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	錯感覚	43	131	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	030501	WHITE	男性	6[redacted]	リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2	便秘	2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	インフルエンザ様疾患	2	14	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	2	42	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口内乾燥	22	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	22	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	不安	24	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発声障害	51	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	呼吸困難	60	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	粘膜の炎症	64	67	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	83	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：768 シクロフォスファミド：1550 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	腎細胞癌	95	-	なし	Grade4	重篤	なし	未回復
	NHL	030502	WHITE	女性	6[redacted]	リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	鼻炎	2	105	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	29	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2	上気道感染	29	36	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	気管支痙攣	59	2010-05	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	呼吸困難	59	2010-05	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	98	2	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	歯の脱落	99	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	体重減少	106	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	133	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	133	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：698 シクロフォスファミド：1395 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	副鼻腔炎	133	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	MCL	030507	WHITE	男性	8[redacted]	リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	憩室炎	11	13	なし	Grade2	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	15	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	15	3	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	剥脱性発疹	16	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2	便秘	18	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性浮腫	18	5	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	43	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	憩室穿孔	43	36	なし	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	消化不良	48	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	処置による疼痛	60	9	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：708.1 シクロフォスファミド：1888.3 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	62	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	030602	WHITE	男性	2[redacted]	リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	顎痛	4	111	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	激越	12	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	背部痛	13	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	14	93	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	26	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2	悪心	27	81	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	関節痛	28	10	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性感覚ニューロパチー	28	74	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：- プレドニゾロン：100	疲労	65	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：- プレドニゾロン：100	口腔咽頭痛	84	2010-08	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	107	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	127	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下腹部痛	135	20	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	135	110	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	顎痛	144	94	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	背部痛	149	5	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	149	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821.25 シクロフォスファミド：1642.5 オンコビン：2	体重増加	149	95	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
	NHL	030610	WHITE	女性	6[redacted]	リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1960 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1960 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	18	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1960 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	足関節部骨折	114	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1960 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	深部静脈血栓症	174	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：735 シクロフォスファミド：1960 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	表在性血栓性静脈炎	174	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
	NHL	031101		女性	3[redacted]		便秘	-	2010-11-11	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	味覚異常	1	192	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	1	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	14	20	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	14	3	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2	そう痒症	16	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	23	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							紅色汗疹	-	2010-06-15	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	32	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	45	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	眼部腫脹	45	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	63	8	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	71	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋力低下	91	102	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	脱毛症	99	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：732 シクロフォスファミド：1465 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	119	8	なし	Grade3	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
	NHL	031103		男性	5[redacted]		味覚異常	-	2010-11-10	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							造影剤アレルギー	-12	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	舌痛	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	怒り	13	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	22	21	なし	Grade1	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：- プレドニゾロン：100	皮膚病変	43	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：- プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	43	141	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：- プレドニゾロン：100	注入部位静脈炎	85	22	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：- プレドニゾロン：100	咳嗽	125	23	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：-	上腹部痛	147	33	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：- プレドニゾロン：100	耳鳴	163	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：825 シクロフォスファミド：1650 オンコビン：- プレドニゾロン：100	頭蓋内動脈瘤	170	-	なし	Grade1	重篤	なし	未回復
	MCL	031302	WHITE	男性	7[redacted]		筋痙縮	-	2011-04-29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1600 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発疹	1	167	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1600 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	便秘	2	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1600 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	浮腫	2	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：800 シクロフォスファミド：1600 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	7	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：- プレドニゾロン：100	背部痛	20	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							健忘	-	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	非心臓性胸痛	41	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	41	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	77	2	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	下痢	101	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	歩行障害	126	21	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱性好中球減少症	158	7	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	失禁	158	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頻尿	158	7	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	側腹部痛	159	1	不明	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：821 シクロフォスファミド：1642 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	カテーテル留置部位紅斑	159	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	NHL	031501	WHITE	男性	4[redacted]	リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2	末梢性浮腫	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	術後創感染	9	35	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	22	1	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	頭痛	23	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	上腹部痛	43	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疼痛	43	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	44	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	霧視	45	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	眼痛	45	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	皮膚病変	57	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	喘鳴	64	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	痔核	64	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2	頭痛	65	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	糖尿	66	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	咳嗽	86	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入に伴う反応	86	2	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	末梢性ニューロパチー	107	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：1000 シクロフォスファミド：2000 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	疲労	114	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
	NHL	031802	WHITE	男性	6[redacted]	リツキシマブ：900 シクロフォスファミド：1750 オンコビン：2 プレドニゾロン：80	疲労	2	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：900 シクロフォスファミド：1750 オンコビン：2 プレドニゾロン：80 プレドニゾロン：100	下気道感染	4	6	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：908 シクロフォスファミド：1750 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪心	43	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：908 シクロフォスファミド：1750 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	筋肉痛	43	29	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：938 シクロフォスファミド：1750 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	発熱	100	4	なし	Grade1	重篤	なし	回復
	NHL	040113	WHITE	女性	7[redacted]	リツキシマブ：536 シクロフォスファミド：1100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	霧視	1	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：536 シクロフォスファミド：1100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	注入部位反応	2	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
							不眠症	-	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
							腹圧性尿失禁	-	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：536 シクロフォスファミド：1100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肋骨骨折	40	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：536 シクロフォスファミド：1100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肋骨骨折	41	4	なし	Grade2	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：536 シクロフォスファミド：1100 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	肋骨骨折	45	-	なし	Grade2	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：536 シクロフォスファミド：1100 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	錯感覚	65	-	なし	Grade1	非重篤	なし	未回復
						リツキシマブ：536 シクロフォスファミド：1100 オンコビン：1 プレドニゾロン：100	ヘモグロビン減少	77	10	なし	Grade2	非重篤	なし	回復(後遺症あり)

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
	NHL	050402	WHITE	男性	6[redacted]	リツキシマブ：648.75 シクロフォスファミド：1297.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	斑状丘疹状皮疹	45	1	なし	Grade2	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：648.75 シクロフォスファミド：1297.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	斑状丘疹状皮疹	46	5	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：648.75 シクロフォスファミド：1297.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	斑状丘疹状皮疹	65	6	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：648.75 シクロフォスファミド：1297.5 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	インフルエンザ	92	14	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：673.5 シクロフォスファミド：1275 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	リンパ球減少症	111	7	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
	NHL	060101	OTHER	男性	6[redacted]	リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	悪寒	1	1	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 オンコビン：2	四肢膿瘍	9	112	なし	Grade3	重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	50	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	50	8	なし	Grade4	非重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：1275 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	貧血	50	85	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：957 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	白血球減少症	57	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：637 シクロフォスファミド：957 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	好中球減少症	57	8	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
	MCL	070103	WHITE	男性	7[redacted]		リンパ腫	-6	287	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
							リンパ腫	-5	286	なし	Grade1	非重篤	なし	回復（後遺症

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
														あり)
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	激越	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	失見当識	1	1	なし	Grade2	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	倦怠感	1	281	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	注入に伴う反応	1	1	なし	Grade3	重篤	なし	回復
						リツキシマブ：34.5 シクロフォスファミド：- オンコビン：- プレドニゾロン：-	食欲減退	4	278	なし	Grade1	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
	NHL	070303	OTHER	女性	7[redacted]	リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	無力症	6	6	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	食欲減退	6	6	なし	Grade3	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	汎血球減少症	6	6	なし	Grade4	非重篤	なし	回復(後遺症あり)
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	糖尿病性昏睡	7	5	なし	Grade4	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	低アルブミン血症	7	5	なし	Grade2	非重篤	なし	不明
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	敗血症性ショック	7	5	なし	Grade4	重篤	なし	軽快
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	口腔カンジダ症	8	4	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2	皮膚潰瘍	8	4	なし	Grade2	非重篤	なし	回復

投与群	病型	症例番号	人種	性	年齢	投与量	有害事象（基本語）[*1]	有害事象発現日[*2]（投与●日目）	持続期間又は消失日	因果関係	重症度	重篤/非重篤の別	治験薬の処置（継続、投与中止等）	転帰
						プレドニゾロン：100								
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	斑状出血	9	3	なし	Grade1	非重篤	なし	回復
						リツキシマブ：525 シクロフォスファミド：1050 オンコビン：2 プレドニゾロン：100	敗血症性ショック	11	1	なし	Grade5	重篤	なし	死亡

*1 MedDRA/J Ver 15.0
*2 有害事象発現日は、投与開始日を 1 日目として起算