2.3.P 製剤[1]（イナビル吸入懸濁用 160 mg セット、吸入剤）

イナビル吸入懸濁用 160 mg セットは、凍結乾燥製剤であるイナビル吸入懸濁用 160 mg と添付のネブライザ吸入器を組み合わせた製剤である。

組成（1 バイアル中）・性状

販売名	有効成分	添加剤	性状
イナビル吸入懸濁用 160 mg セット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 166.1 mg（ラニナミビルオクタン酸エステルとして 160 mg）	チロキサポール	白色の粉末を含む塊

ネブライザ吸入器を添付

安定性

試験	保存条件	包装形態	保存期間	結果
長期保存試験	25°C/60%RH	無色ガラスバイアル ブチルゴム栓 キャップ	0、3、6、9、12、18、24、(30、36) ヵ月 (　)：現在継続中	24 ヵ月まで安定
加速試験	40°C/75%RH	無色ガラスバイアル ブチルゴム栓 キャップ	0、3、6 ヵ月	安定
苛酷試験（光）	2000 lx (D65 ランプ) 25°C、横倒し	無色ガラスバイアル ブチルゴム栓 キャップ	0、60 万 lx·h、120 万 lx·h[a]	安定

a: 総近紫外放射エネルギー200 W· h/m² 以上

[1] 「2.3.P 製剤」の項をまとめて記載した。