2.3.S 原薬[a]


一般的名称： エトラシモド L-アルギニン（Etrasimod L-Arginine）

化学名： L-Argininium
[(3*R*)-7-{[4-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy}-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[*b*]indol-3-yl]acetate

分子式： $C_{26}H_{26}F_3NO_3 \cdot C_6H_{14}N_4O_2$

分子量： 631.69

構造式：



性状： 白色～淡褐色の固体

分配係数（log P）：6.8～9.0（1-オクタノール／水）

[a]「2.3.S 原薬」の項をまとめて示し，新薬承認情報提供時に置き換えた。

2.3.P 製剤[a]

組成・性状：

販売名	ベルスピティ錠2mg
有効成分	1錠中エトラシモドとして2 mg （エトラシモドL-アルギニン2.762 mg）
外観	緑色のフィルムコーティング錠
添加物	D-マンニトール，結晶セルロース，デンプングリコール酸ナトリウム，ステアリン酸マグネシウム，ポリビニルアルコール（部分けん化物），酸化チタン，マクロゴール 4000，タルク，青色 2 号アルミニウムレーキ，黄色 4 号アルミニウムレーキ，青色 1 号アルミニウムレーキ

安定性：ベルスピティ錠 2 mg のブリスター包装品は，室温で保存するとき 36 箇月間安定である。

[a] 「2.3.P 製剤」の項をまとめて示し，新薬承認情報提供時に置き換えた。