# 1.7 同種同効品一覧表

各製品の最新の添付文書を参照すること

小野薬品工業株式会社
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

## 同種同効品一覧表

| | | | |
|---|---|---|---|
| **販売名** | オプジーボ®点滴静注 20mg<br>オプジーボ®点滴静注 100mg<br>オプジーボ®点滴静注 120mg<br>オプジーボ®点滴静注 240mg | ヤーボイ®点滴静注液 20mg<br>ヤーボイ®点滴静注液 50mg | 5-FU 注 250mg<br>5-FU 注 1000mg |
| **一般名** | ニボルマブ（遺伝子組換え） | イピリムマブ（遺伝子組換え） | フルオロウラシル |
| **会社名** | 小野薬品工業株式会社 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | 協和キリン株式会社 |
| **効能<br>又は<br>効果** | ○悪性黒色腫<br>○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌<br>○非小細胞肺癌における術前補助療法<br>○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌<br>○再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫<br>○再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌<br>○治癒切除不能な進行・再発の胃癌<br>○切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫<br>○悪性中皮腫（悪性胸膜中皮腫を除く）<br>○治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌<br>○根治切除不能な進行・再発の食道癌<br>○食道癌における術後補助療法<br>○原発不明癌<br>○尿路上皮癌における術後補助療法<br>○根治切除不能な尿路上皮癌<br>○根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍<br>○切除不能な肝細胞癌 | ○根治切除不能な悪性黒色腫<br>○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌<br>○治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌<br>○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌<br>○切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫<br>○根治切除不能な進行・再発の食道癌<br>○切除不能な肝細胞癌 | ○下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解<br>胃癌、肝癌、結腸・直腸癌、乳癌、膵癌、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌<br>ただし、下記の疾患については、他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併用することが必要である。<br>食道癌、肺癌、頭頸部腫瘍<br>○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法<br>頭頸部癌、食道癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌<br>○レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法<br>結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌 |
| **添付文書<br>改訂日<br>（版数）** | － | － | 2024 年 6 月<br>（第 4 版） |
| **備考** | 申請薬剤 | 申請薬剤 | ONO-4538-87/CA2098HW 試験の対照薬 |

**同種同効品一覧表（続き 1）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **販売名** | エルプラット®点滴静注液 50mg<br>エルプラット®点滴静注液 100mg<br>エルプラット®点滴静注液 200mg | アービタックス®注射液 100mg<br>アービタックス®注射液 500mg | トポテシン®点滴静注 40mg<br>トポテシン®点滴静注 100mg |
| **一般名** | オキサリプラチン | セツキシマブ（遺伝子組換え） | イリノテカン塩酸塩水和物 |
| **会社名** | 高田製薬株式会社 | メルクバイオファーマ株式会社 | アルフレッサ ファーマ株式会社 |
| **効能又は効果** | ○治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌<br>○結腸癌における術後補助療法<br>○治癒切除不能な膵癌<br>○胃癌<br>○小腸癌 | ○*RAS* 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌<br>○頭頸部癌 | ○小細胞肺癌<br>○非小細胞肺癌<br>○子宮頸癌<br>○卵巣癌<br>○胃癌（手術不能又は再発）<br>○結腸・直腸癌（手術不能又は再発）<br>○乳癌（手術不能又は再発）<br>○有棘細胞癌<br>○悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）<br>○小児悪性固形腫瘍<br>○治癒切除不能な膵癌 |
| **添付文書改訂日（版数）** | 2025 年 4 月<br>（第 5 版） | 2025 年 1 月<br>（第 5 版） | 2023 年 8 月<br>（第 1 版） |
| **備考** | ONO-4538-87/CA2098HW 試験の対照薬 | ONO-4538-87/CA2098HW 試験の対照薬 | ONO-4538-87/CA2098HW 試験の対照薬 |

**同種同効品一覧表（続き 2）**

| 販売名 | アイソボリン®点滴静注用 25mg<br>アイソボリン®点滴静注用 100mg | アバスチン®点滴静注用 100mg/4mL<br>アバスチン®点滴静注用 400mg/16mL | キイトルーダ®点滴静注 100mg |
|---|---|---|---|
| 一般名 | レボホリナートカルシウム水和物 | ベバシズマブ（遺伝子組換え） | ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） |
| 会社名 | ファイザー株式会社 | 中外製薬株式会社 | MSD 株式会社 |
| 効能<br>又は<br>効果 | ○レボホリナート・フルオロウラシル療法<br>胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強<br>○レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法<br>結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強 | ○治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌<br>○扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌<br>○手術不能又は再発乳癌<br>○悪性神経膠腫<br>○卵巣癌<br>○進行又は再発の子宮頸癌<br>○切除不能な肝細胞癌 | ○悪性黒色腫<br>○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌<br>○非小細胞肺癌における術前・術後補助療法<br>○再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫<br>○根治切除不能な尿路上皮癌<br>○がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）<br>○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌<br>○腎細胞癌における術後補助療法<br>○再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌<br>○根治切除不能な進行・再発の食道癌<br>○治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌<br>○PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌<br>○ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法<br>○進行・再発の子宮体癌<br>○がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量（TMB-High）を有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）<br>○進行又は再発の子宮頸癌<br>○局所進行子宮頸癌<br>○再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型 B 細胞リンパ腫<br>○治癒切除不能な進行・再発の胃癌<br>○治癒切除不能な胆道癌<br>○切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫 |
| 添付文書<br>改訂日<br>（版数） | 2023 年 3 月<br>（第 1 版） | 2025 年 4 月<br>（第 6 版） | 2025 年 5 月<br>（第 24 版） |
| 備考 | ONO-4538-87/CA2098HW 試験の対照薬 | ONO-4538-87/CA2098HW 試験の対照薬 | － |

**同種同効品一覧表（続き 3）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **販売名** | ベクティビックス®点滴静注 100mg<br>ベクティビックス®点滴静注 400mg | ティーエスワン®配合カプセル T20<br>ティーエスワン®配合カプセル T25<br>ティーエスワン®配合顆粒 T20<br>ティーエスワン®配合顆粒 T25 | ゼローダ®錠 300 |
| **一般名** | パニツムマブ（遺伝子組換え） | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | カペシタビン |
| **会社名** | 武田薬品工業株式会社 | 大鵬薬品工業株式会社 | チェプラファーム株式会社 |
| **効能又は効果** | *KRAS* 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | 胃癌、結腸・直腸癌、頭頸部癌、非小細胞肺癌、手術不能又は再発乳癌、膵癌、胆道癌、ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法 | ○手術不能又は再発乳癌<br>○結腸・直腸癌<br>○胃癌 |
| **添付文書改訂日（版数）** | 2023 年 4 月<br>（第 1 版） | 2025 年 1 月<br>（第 4 版） | 2024 年 2 月<br>（第 3 版） |
| **備考** | － | 同一成分を含有する製剤として、ティーエスワン®配合 OD 錠 T20、同 OD 錠 T25 も市販されている。 | － |

＊＊2024年6月改訂（第4版）
＊2024年3月改訂（第3版、効能変更、用法変更及び用量変更）
貯　　法：2～8℃に保存
有効期間：3年

DF

| 日本標準商品分類番号 |
|---|
| 874223 |

劇薬、
処方箋医薬品注）

抗悪性腫瘍剤

フルオロウラシル注射液

# 5-FU注250mg
# 5-FU注1000mg

## 5-FU Injection

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

| | 250mg | 1000mg |
|---|---|---|
| 承認番号 | 22500AMX00515 | 22300AMX00065 |
| 販売開始 | 2013年6月 | 2011年6月 |

## 1．警告

1.1 本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。
適応患者の選択にあたっては、各併用薬剤の電子添文を参照して十分注意すること。
また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

1.2 メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法、レボホリナート・フルオロウラシル療法は本剤の細胞毒性を増強する療法であり、これらの療法に関連したと考えられる死亡例が認められている。これらの療法は高度の危険性を伴うので、投与中及び投与後の一定期間は患者を医師の監督下に置くこと。[8.1参照]

1.3 頭頸部癌及び食道癌に対して、本剤を含むがん化学療法と放射線照射を併用する場合に重篤な副作用や放射線合併症が発現する可能性があるため、放射線照射とがん化学療法の併用治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで実施すること。[8.3参照]

1.4 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤との併用により、重篤な血液障害等の副作用が発現するおそれがあるので、併用を行わないこと。[2.2、10.1参照]

## 2．禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者

2.2 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中の患者及び投与中止後7日以内の患者［1.4、10.1参照］

## 3．組成・性状

### 3.1 組成

| 販売名 | | 5-FU注250mg | 5-FU注1000mg |
|---|---|---|---|
| 容量（1瓶中） | | 5mL | 20mL |
| 有効成分 | 日局フルオロウラシル | 250mg | 1000mg |
| 添加剤 | トロメタモール | 423.5mg | 1694mg |

### 3.2 製剤の性状

| 販売名 | 5-FU注250mg | 5-FU注1000mg |
|---|---|---|
| 色・性状 | 無色～微黄色の澄明な注射液 | |
| pH | 8.2～8.6 | |
| 浸透圧比 | 約4 | |

## ＊4．効能又は効果

○下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解
胃癌、肝癌、結腸・直腸癌、乳癌、膵癌、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌
ただし、下記の疾患については、他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併用することが必要である。
食道癌、肺癌、頭頸部腫瘍

○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
頭頸部癌、食道癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌

○レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法
結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌

## 5．効能又は効果に関連する注意

〈治癒切除不能な膵癌〉

5.1 レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を実施する場合、以下の点に注意すること。

5.1.1 患者の病期、全身状態、*UGT1A1*注）遺伝子多型等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.2、17.1.3参照]

5.1.2 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

注）イリノテカン塩酸塩水和物の活性代謝物（SN-38）の主な代謝酵素の一分子種である。

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

＊5.2 他の抗悪性腫瘍剤との併用療法及びレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法において、本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

## 6．用法及び用量

### 6.1 単独で使用する場合

1）フルオロウラシルとして、通常、成人には1日5～15mg/kgを最初の5日間連日1日1回静脈内に注射又は点滴静注する。以後5～7.5mg/kgを隔日に1日1回静脈内に注射又は点滴静注する。

2）フルオロウラシルとして、通常、成人には1日5～15mg/kgを隔日に1日1回静脈内に注射又は点滴静注する。

3）フルオロウラシルとして、通常、成人には1日5mg/kgを10～20日間連日1日1回静脈内に注射又は点滴静注する。

4）フルオロウラシルとして、通常、成人には1日10～20mg/kgを週1回静脈内に注射又は点滴静注する。

また、必要に応じて動脈内に通常、成人には1日5mg/kgを適宜注射する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 6.2 他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併用する場合

フルオロウラシルとして、通常、成人には1日5～10mg/kgを他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併用し、6.1の方法に準じ、又は間歇的に週1～2回用いる。

### ＊6.3 頭頸部癌、食道癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法の場合

他の抗悪性腫瘍剤との併用療法において、通常、成人にはフルオロウラシルとして1日1000mg/m$^2$（体表面積）までを、4～5日間連日で持続点滴する。投与を繰り返す場合に

は少なくとも3週間以上の間隔をあけて投与する。本剤単独投与の場合には併用投与時に準じる。
なお、年齢、患者の状態などにより適宜減量する。

6.4 結腸・直腸癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法

1)通常、成人にはレボホリナートとして1回100mg/m$^2$(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/m$^2$(体表面積)を静脈内注射、さらにフルオロウラシルとして600mg/m$^2$(体表面積)を22時間かけて持続静注する。これを2日間連続して行い、2週間ごとに繰り返す。

2)通常、成人にはレボホリナートとして1回250mg/m$^2$(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして2600mg/m$^2$(体表面積)を24時間持続静注する。1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬する。これを1クールとする。

3)通常、成人にはレボホリナートとして1回200mg/m$^2$(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/m$^2$(体表面積)を静脈内注射、さらにフルオロウラシルとして2400～3000mg/m$^2$(体表面積)を46時間持続静注する。これを2週間ごとに繰り返す。

なお、年齢、患者の状態などにより適宜減量する。

6.5 小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法

通常、成人にはレボホリナートとして1回200mg/m$^2$(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/m$^2$(体表面積)を静脈内注射、さらにフルオロウラシルとして2400mg/m$^2$(体表面積)を46時間持続静注する。これを2週間ごとに繰り返す。
なお、年齢、患者の状態などにより適宜減量する。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

〈頭頸部癌、食道癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法〉

＊7.1 本剤の投与量、投与スケジュール、併用薬等について、国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。

〈治癒切除不能な膵癌〉

7.2 オキサリプラチン、イリノテカン塩酸塩水和物、レボホリナートとの併用療法(FOLFIRINOX法)を行う場合には、次の投与可能条件、減量基準及び減量時の投与量を参考にすること。

7.2.1 2クール目以降の投与可能条件

投与予定日に確認し、当該条件を満たす状態へ回復するまで投与を延期するとともに、「7.2.2 減量基準」及び「7.2.3 減量時の投与量」を参考に、投与再開時に減量すること。

| 種類 | 程度 |
|---|---|
| 好中球数 | 1,500/mm$^3$以上 |
| 血小板数 | 75,000/mm$^3$以上 |

7.2.2 減量基準

前回の投与後にいずれかの程度に該当する副作用が発現した場合は、該当する毎に、以下の減量方法に従って、投与レベルを1レベル減量する(「7.2.3 減量時の投与量」を参考にすること)。また、いずれかの程度に該当する好中球減少又は血小板減少が発現した場合は、以降の本剤急速静脈内投与を中止する。

| 副作用[注1)] | 程度 | 減量方法 |
|---|---|---|
| 好中球減少 | 以下のいずれかの条件を満たす場合：<br>1)2クール目以降の投与可能条件を満たさず投与を延期<br>2)500/mm$^3$未満が7日以上持続<br>3)感染症又は下痢を併発し、かつ1,000/mm$^3$未満<br>4)発熱性好中球減少症 | イリノテカン塩酸塩水和物を優先的に減量する。ただし、イリノテカン塩酸塩水和物の投与レベルがオキサリプラチンより低い場合は、イリノテカン塩酸塩水和物と同じレベルになるまでオキサリプラチンを減量する。 |
| 下痢 | 発熱(38℃以上)を伴う | |
| | グレード3[注2)]以上 | 本剤持続静注を減量する。 |
| 血小板減少 | 以下のいずれかの条件を満たす場合：<br>1)2クール目以降の投与可能条件を満たさず投与を延期<br>2)50,000/mm$^3$未満 | オキサリプラチンを優先的に減量する。ただし、オキサリプラチンの投与レベルがイリノテカン塩酸塩水和物より低い場合は、オキサリプラチンと同じレベルになるまでイリノテカン塩酸塩水和物を減量する。 |
| 総ビリルビン上昇 | 2.0mg/dL超3.0mg/dL以下 | イリノテカン塩酸塩水和物を120mg/m$^2$に減量する。 |
| | 3.0mg/dL超 | イリノテカン塩酸塩水和物を90mg/m$^2$に減量する。 |
| 粘膜炎<br>手足症候群 | グレード3[注2)]以上 | 本剤持続静注を減量する。 |

注1)複数の副作用が発現した場合は、薬剤毎に減量が最大となる基準を適用すること。
注2)CTCAE version 4.0。

7.2.3 減量時の投与量

オキサリプラチン85mg/m$^2$、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m$^2$、本剤持続静注2,400mg/m$^2$で投与を開始した場合

| 投与レベル | オキサリプラチン | イリノテカン塩酸塩水和物 | 本剤持続静注 |
|---|---|---|---|
| −1 | 65mg/m$^2$ | 150mg/m$^2$ | 1,800mg/m$^2$ |
| −2 | 50mg/m$^2$ | 120mg/m$^2$ | 1,200mg/m$^2$ |
| −3 | 中止 | 中止 | 中止 |

## 8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8.1 骨髄機能抑制、激しい下痢等の重篤な副作用が起こることがあるので、定期的(特に投与初期は頻回)に臨床検査(血液検査、肝機能・腎機能検査等)を行うなど患者の状態を十分に観察すること。
特に、本剤の効果を増強する薬剤を併用した療法(メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法、レボホリナート・フルオロウラシル療法等)を実施する場合には、致命的な経過をたどることがあるので各薬剤の電子添文を熟読すること。[1.2、9.1.1、9.1.2、11.1.1、11.1.3参照]

8.2 感染症・出血傾向の発現又は悪化に十分注意すること。

〈頭頸部癌及び食道癌〉

8.3 本剤を含むがん化学療法と放射線照射を併用する場合(特に同時併用する場合)に、重篤な副作用や放射線合併症が発現する可能性があるため、本剤の適切な減量を検討すること。放射線照射野内の皮膚炎・皮膚の線維化・口内炎、経口摂取量低下、血液毒性、唾液減少等が、放射線照射単独の場合と比較して高度となることが知られているので、血液毒性出現時の感染対策、長期の栄養管理、疼痛コントロール、放射線照射時の粘膜浮腫により気道狭窄が増悪した場合の管理等について十分な注意、対応を行うこと。[1.3参照]

〈小腸癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

＊8.4 レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法において、本剤を使用する際には、関連文献(「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：フルオロウラシル(小腸癌)」もしくは「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：フルオロウラシル(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)」等)を熟読すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1.1 骨髄機能抑制のある患者

骨髄機能をより強く抑制するおそれがある。[8.1、11.1.3参照]

#### 9.1.2 感染症を合併している患者

骨髄機能抑制により感染症が悪化するおそれがある。[8.1、11.1.3参照]

#### 9.1.3 心疾患又はその既往歴のある患者

症状が悪化するおそれがある。

#### 9.1.4 消化管潰瘍又は出血のある患者

症状が悪化するおそれがある。

#### 9.1.5 水痘患者

致命的な全身障害があらわれるおそれがある。

### 9.2 腎機能障害患者

副作用が強くあらわれるおそれがある。

### 9.3 肝機能障害患者

副作用が強くあらわれるおそれがある。

### 9.4 生殖能を有する者

小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮すること。

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。動物実験(ラット、マウス)で多指症、口蓋裂等の催奇形作用が報告されている。

### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。

### 9.7 小児等

副作用の発現に特に注意し、慎重に投与すること。小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 9.8 高齢者

用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。生理機能が低下していることが多く、特に骨髄機能抑制、消化器障害(激しい下痢、口内炎等)、皮膚障害、精神神経系の副作用があらわれやすい。

## 10. 相互作用

### 10.1 併用禁忌(併用しないこと)

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(ティーエスワン)[1.4、2.2参照] | 早期に重篤な血液障害や下痢、口内炎等の消化管障害等が発現するおそれがあるので、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中及び投与中止後少なくとも7日以内は本剤を投与しないこと。 | ギメラシルがフルオロウラシルの異化代謝を阻害し、血中フルオロウラシル濃度が著しく上昇する。 |

### 10.2 併用注意(併用に注意すること)

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| フェニトイン | 構音障害、運動失調、意識障害等のフェニトイン中毒があらわれることがある。 | 機序は不明であるが、フェニトインの血中濃度を上昇させる。 |
| ワルファリンカリウム | ワルファリンカリウムの作用を増強させることがあるので、凝固能の変動に注意すること。 | 機序は不明である。 |
| トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 | 重篤な骨髄抑制等の副作用が発現するおそれがある。 | 本剤との併用により、トリフルリジンのDNA取り込みが増加する可能性がある。<br>チピラシル塩酸塩がチミジンホスホリラーゼを阻害することにより、本剤の代謝に影響を及ぼす可能性がある。 |
| 他の抗悪性腫瘍剤放射線照射 | 骨髄機能抑制、消化管障害等の副作用が増強することがある。 | 副作用が相互に増強される。 |

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 激しい下痢(頻度不明)

脱水症状まで至ることがある。このような症状があらわれた場合には投与を中止し、補液等の適切な処置を行うこと。[8.1参照]

#### 11.1.2 重篤な腸炎(頻度不明)

出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等があらわれることがある。激しい腹痛・下痢等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### 11.1.3 骨髄機能抑制(頻度不明)

汎血球減少、白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少等があらわれることがある。[8.1、9.1.1、9.1.2参照]

#### 11.1.4 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)

発疹、呼吸困難、血圧低下等の症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### 11.1.5 白質脳症等を含む精神神経障害(頻度不明)

白質脳症(初期症状:歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ等)、また、錐体外路症状、言語障害、運動失調、眼振、意識障害、痙攣、顔面麻痺、見当識障害、四肢末端のしびれ感、せん妄、記憶力低下、自発性低下、尿失禁等の精神神経症状があらわれることがある。

#### 11.1.6 うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症、心室性頻拍(いずれも頻度不明)

#### 11.1.7 重篤な腎障害(頻度不明)

急性腎障害、ネフローゼ症候群等があらわれることがある。なお、腎障害の知られている抗悪性腫瘍剤(シスプラチン、メトトレキサート等)との併用時には特に注意すること。

#### 11.1.8 間質性肺炎(頻度不明)

発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状があらわれた場合には投与を中止し、胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### 11.1.9 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

AST、ALT、Al-P、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれ、肝不全まで至ることがある。劇症肝炎があらわれることがある。

#### 11.1.10 肝硬変(頻度不明)

#### 11.1.11 消化管潰瘍、重症な口内炎(いずれも頻度不明)

#### 11.1.12 急性膵炎(頻度不明)

腹痛、血清アミラーゼ上昇等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### ＊＊11.1.13 意識障害を伴う高アンモニア血症(頻度不明)

高アンモニア血症が発症した患者において、乳酸アシドーシスを併発したとの報告がある。

#### 11.1.14 肝動脈内投与における肝・胆道障害(頻度不明)

胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等があらわれることがあるので、造影等により薬剤の分布領域をよく確認すること。

#### 11.1.15 手足症候群(頻度不明)

手掌・足蹠の紅斑、疼痛性発赤腫脹、知覚過敏等があらわれることがある。

#### 11.1.16 嗅覚障害(頻度不明)

嗅覚障害(長期投与症例に多い)があらわれ、嗅覚脱失まで至ることがある。

#### 11.1.17 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)

#### 11.1.18 溶血性貧血(頻度不明)

### 11.2 その他の副作用

| | 5%以上 | 0.1~5%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 消化器[a)] | 食欲不振、下痢、悪心・嘔吐 | 味覚異常、口渇、腹部膨満感、腹痛、下血 | 便秘 | 口角炎、舌炎、胸やけ |
| 肝臓 | | | | AST上昇、ALT上昇、ビリルビン上昇等の肝機能検査値異常 |

| | 5%以上 | 0.1～5%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 腎臓 | | 蛋白尿 | | BUN上昇、クレアチニン値上昇、クレアチニン・クリアランス低下 |
| 精神神経系 | 倦怠感 | | | めまい、末梢神経障害(しびれ、知覚異常等) |
| 皮膚[b)] | | 色素沈着、脱毛、浮腫、びらん、水疱、そう痒感、紅潮 | | 爪の異常、光線過敏症 |
| 過敏症 | | 発疹 | | |
| 循環器 | | | | 心電図異常(ST上昇、T逆転、不整脈等)、胸痛、胸内苦悶 |
| 眼 | | | | 流涙、結膜炎 |
| 動脈内投与時 | | | | カテーテル先端付近の動脈壁の変性、血栓形成 |
| その他 | | 発熱、頭痛 | | 糖尿、低カルシウム血症、耐糖能異常 |

a)潰瘍又は出血が疑われる場合には投与を中止すること。
b)動脈内投与により、注入側の皮膚にこれらの症状が強くあらわれることがある。
注)発現頻度は1970年2月までの副作用頻度調査を含む。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤投与時の注意

14.1.1 静脈内投与により、血管痛、静脈炎を起こすおそれがあるので注射部位、注射方法等に十分注意し、注射速度をできるだけ遅くすること。

14.1.2 静脈内投与に際し薬液が血管外に漏れると、注射部位に硬結・壊死を起こすことがあるので、薬液が血管外に漏れないように投与すること。

14.1.3 動脈内投与により、動脈支配領域に疼痛、発赤、紅斑、水疱、びらん、潰瘍等の皮膚障害があらわれ、皮膚・筋壊死にまで至ることがある。また、同領域にしびれ、麻痺等の神経障害があらわれることがある。これらの症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

14.1.4 肝動脈内投与において、標的とする部位以外の動脈への流入により胃・十二指腸潰瘍、出血、穿孔等を起こすことがあるので、造影等によりカテーテルの先端位置、薬剤の分布領域をよく確認し、カテーテルの逸脱・移動、注入速度等に随時注意すること。なお、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 フルオロウラシル系薬剤と他の抗悪性腫瘍剤を併用した患者に、急性白血病(前白血病相を伴う場合もある)、骨髄異形成症候群(MDS)が発生したとの報告がある。


15.1.2 フルオロウラシルの異化代謝酵素であるジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD)欠損等の患者がごくまれに存在し、このような患者にフルオロウラシル系薬剤を投与した場合、投与初期に重篤な副作用(口内炎、下痢、血液障害、神経障害等)が発現するとの報告がある。

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 急速静脈内投与

(1)癌患者5例に5-FU 500mg/bodyをone shot 静注後の平均血中濃度は、15分で15.3、30分で3.9、60分で0.35μg/mLと推移し、投与後90分には検出限界以下になった[1)]。



血中濃度推移(n=5)

(2)癌患者8例に5-FU 9～16mg/kgを単回投与したときの薬物動態パラメータは以下のとおりであった[2)](外国人データ)。

薬物動態パラメータ

| パラメータ / 投与量 | 半減期(min) $T_{1/2}\alpha$ | 半減期(min) $T_{1/2}\beta$ | CL (mL/min) | Vd (L/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 9～16mg/kg | 2.1±0.5 | 18.9±2.2 | 776.8±91.3 | 0.38±0.1 |

mean±SEM, n=8

#### 16.1.2 持続点滴静脈内投与

癌患者14例に5-FU 60mg/kgを1500mLの電解質輸液で希釈し、48時間かけて末梢静脈より持続点滴静注したとき、点滴投与中の5-FU血中濃度は約6時間で定常状態(約0.6μg/mL)に達し、その後持続的に推移した[3)]。

### 16.3 分布

#### 16.3.1 体組織への分布

癌患者に5-FU-2-$^{14}$C 14mg/kgを静脈内投与したとき、4～5時間後の放射比活性は腫瘍、小腸粘膜で高く、次いで肝臓、リンパ節に高い分布を示した[4)](外国人データ)。

#### 16.3.2 蛋白結合率

ヒト血漿蛋白結合率は以下のとおりであった(*in vitro*)。

| 添加濃度(μg/mL) | 1 | 10 | 25 |
|---|---|---|---|
| 血漿蛋白結合率(%) | 7.5 | 10.3 | 9.0 |

平衡透析法による

### 16.4 代謝

癌患者に5-FU-2-$^{14}$C 14mg/kgを静脈内投与したとき、尿中代謝物は投与後45分以内では未変化体の比率が91.5%と高かったが、経時的にα-fluoro-β-ureidopropionic acid及び尿素の比率が増加した[4)](外国人データ)。

### 16.5 排泄

癌患者に5-FU-2-$^{14}$C 15mg/kgを静脈内投与後24時間以内に放射能は呼気中に$CO_2$として57%、尿中に18%排泄された[4)](外国人データ)。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈各種悪性腫瘍〉

#### 17.1.1 国内臨床試験

国内32施設において、各種悪性腫瘍患者を対象とした単独使用例と併用使用例別の成績概要は以下のとおりであった。なお、有効率は日本癌治療学会判定基準の「軽快」、Karnofsky判定基準の「1-A」以上、あるいは各部門判定基準の「やや有効」以上を有効として算定した[5-12)]。

[静脈内投与]

| 対象疾患 | 単独使用例 有効率 (有効例/症例数) | 併用使用例 有効率 (有効例/症例数) |
|---|---|---|
| 胃癌 | 27.3%( 41/150) | 37.8%(202/535) |
| 肝癌 | 22.2%( 2/ 9) | 40.9%( 36/ 88) |
| 結腸・直腸癌 | 41.9%( 13/ 31) | 49.3%( 36/ 73) |
| 乳癌 | 35.1%( 13/ 37) | 58.7%( 37/ 63) |
| 膵癌 | 21.1%( 4/ 19) | 23.1%( 3/ 13) |
| 子宮癌 (頸癌、体癌) | − | 57.1%( 24/ 42) |
| 卵巣癌 | 100.0%( 1/ 1) | 56.0%( 28/ 50) |
| 食道癌 | 33.3%( 2/ 6)[a)] | 12.5%( 2/ 16) |
| 肺癌 | 9.1%( 1/ 11)[a)] | 25.8%( 89/345) |
| 頭頸部腫瘍 | 40.0%( 2/ 5)[a)] | 78.1%( 25/ 32) |

a)参考値(他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併用することが必要なため)

[動脈内投与]

| 対象疾患 | 有効率(有効例/症例数) |
|---|---|
| 胃癌 | 50.0%( 11/ 22) |
| 肝癌 | 52.7%( 29/ 55) |
| 乳癌 | 81.0%( 17/ 21) |
| 肺癌 | 72.7%( 8/ 11) |
| 頭頸部腫瘍 | 75.0%( 18/ 24) |

〈治癒切除不能な膵癌〉

17.1.2 海外第Ⅱ／Ⅲ相試験

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験におけるFOLFIRINOX法群(1クールを2週間として第1日目にオキサリプラチン85mg/m$^2$、ホリナート400mg/m$^2$ 注1)、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m$^2$を点滴静注し、引き続き本剤400mg/m$^2$を急速静脈内投与、本剤2400mg/m$^2$を46時間かけて持続静注)とゲムシタビン塩酸塩(GEM)単独投与群(GEM1000mg/m$^2$の週1回点滴投与を7週連続し、8週目は休薬する。その後は、週1回点滴投与を3週連続し、4週目は休薬として、これを4週毎に繰り返す)の中間解析時の有効性は次表のとおりであった。対象患者はECOG注2) Performance status 0及び1であった。登録において2つの遺伝子多型(*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*)に関する基準は設定されなかった。また、登録時の選択基準として、好中球数(1,500/mm$^3$以上)、総ビリルビン値(施設基準値上限の1.5倍以下)等が設定された[13,14]。

| 投与群 | 例数(ITT) | 生存期間(主要評価項目) | |
|---|---|---|---|
| | | 中央値(月) | ハザード比 P値注3) |
| FOLFIRINOX法 | 127 | 10.5 | 0.62 |
| GEM単独投与 | 128 | 6.9 | P<0.001 |

FOLFIRINOX法群における有害事象発現頻度は100%(166/166例)注4)であった。主な有害事象は、貧血90.4%(150/166例)、疲労87.3%(144/165例)注5)、γ-GTP増加83.7%(139/166例)、血中ALP増加83.0%(137/165例)注5)、好中球数減少79.9%(131/164例)注6)、悪心79.5%(132/166例)、血小板数減少75.2%(124/165例)注5)、下痢73.3%(121/165例)注5)及び末梢性感覚ニューロパチー70.5%(117/166例)であった。[5.1.1参照]

注1)ホリナート400mg/m$^2$はレボホリナート200mg/m$^2$に相当
注2)Eastern Cooperative Oncology Group
注3)log-rank検定
注4)安全性解析対象集団167例のうち、有害事象が収集できなかった1例を除く166例による集計
注5)当該事象に関する安全性情報が収集できなかった1例を除く165例による集計
注6)当該事象に関する安全性情報が収集できなかった2例を除く164例による集計

17.1.3 国内第Ⅱ相試験

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ相臨床試験におけるFOLFIRINOX法(1クールを2週間として第1日目にオキサリプラチン85mg/m$^2$、レボホリナート200mg/m$^2$、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m$^2$を点滴静注し、引き続き本剤400mg/m$^2$を急速静脈内投与、本剤2400mg/m$^2$を46時間かけて持続静注)の有効性は次表のとおりであった。対象患者はECOG注1) Performance status 0及び1であった。2つの遺伝子多型(*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*)について、いずれかをホモ接合体(*UGT1A1*6/*6*、*UGT1A1*28/*28*)又はいずれもヘテロ接合体(*UGT1A1*6/*28*)としてもつ患者は除外された。また、1クール目の投与可能条件として、好中球数(2,000/mm$^3$以上)、総ビリルビン値(施設基準値上限以下)等が設定された。

| 奏効率(有効例/適格例) |
|---|
| 38.9%(14/36) |

FOLFIRINOX法における副作用発現頻度は100%(36/36例)であった。主な副作用は、好中球数減少94.4%(34/36例)、白血球数減少91.7%(33/36例)、血小板数減少及び悪心 各88.9%(32/36例)、貧血及び食欲不振 各86.1%(31/36例)、下痢及びC-反応性タンパク増加 各83.3%(30/36例)、末梢性感覚ニューロパチー75.0%(27/36例)及びリンパ球数減少72.2%(26/36例)であった。[5.1.1参照]

注1)Eastern Cooperative Oncology Group

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

5-FUの抗腫瘍効果は主としてDNAの合成阻害に基づくと考えられており、腫瘍細胞内に取り込まれた5-FUがウラシルと同じ経路で代謝を受けて生じるF-deoxy UMPがチミジル酸合成酵素上で、deoxy UMPと拮抗してチミジル酸の合成を抑制することにより、DNAの合成が阻害されると考えられている。

他方、5-FUはウラシルと同じくRNAにも組み込まれてF-RNAを生成することや、リボゾームRNAの形成を阻害することも知られており、これらのことも本剤の抗腫瘍効果発現に関与すると考えられている[15,16]。

### 18.2 抗腫瘍性

NCI(National Cancer Institute,米国)抗癌剤スクリーニングモデルのいずれに対してもやや有効以上の抗腫瘍性を示した[17](マウス移植腫瘍でのデータ)。

| 実験腫瘍 | | 投与経路 | 抗腫瘍効果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T/C(%) | 効果 | 効果判定基準 |
| 腹水型腫瘍 | Leukemia L1210(白血病) | 腹腔内 | 180 | 2+ | T/C≧125% |
| | Leukemia P388(白血病) | 腹腔内 | 220 | 2+ | ≧120 |
| | Melanoma Bl6(メラノーマ) | 腹腔内 | 140 | + | ≧125 |
| | Lewis Lung carcinoma(肺癌) | 静脈内 | 150 | + | ≧140 |
| | Colon 26(大腸癌) | 腹腔内 | 200 | 2+ | ≧130 |
| 固形腫瘍 | Colon 38(大腸癌) | 皮 下 | 0 | 3+ | ≦ 42 |
| | CD8F$_1$(乳癌) | 皮 下 | 0 | 3+ | ≦ 42 |

効果 { +：やや有効 / 2+：有効 / 3+：著効 }　T/C { 腹水型腫瘍：生存日数の対control比 / 固形腫瘍：腫瘍重量の対control比 }

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名

フルオロウラシル(Fluorouracil)

化学名

5-Fluorouracil


分子式

$C_4H_3FN_2O_2$

分子量

130.08

化学構造式



性状

白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはない。

溶解性

*N,N*-ジメチルホルムアミドに溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール(95)に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

融点

約282℃(分解)

分配係数

$\log P'_{OCT} = -1.00$

(測定法：フラスコシェイキング法、*n*-オクタノール/pH7.4緩衝溶液)

## 22. 包装

〈5-FU注250mg〉

5mL[10瓶]

〈5-FU注1000mg〉

20mL[5瓶]

## 23. 主要文献


1) 菊地金男ほか: 癌と化学療法. 1979; 6: 559-565
2) Christophidis N, et al.: Clinical Pharmacokinetics. 1978; 3: 330-336
3) 小池明彦ほか: 癌と化学療法. 1990; 17: 1309-1314
4) Chaudhuri NK, et al.: Biochem Pharmacol. 1959; 1: 328-341
5) 菊地金男ほか: 癌の臨床. 1967; 13: 670-676
6) 木村禧代二: 癌の臨床. 1968; 14: 184-191
7) 坂部孝ほか: 日大医学雑誌. 1970; 29: 352-366
8) 古江尚ほか: 癌の臨床. 1970; 16: 896-909
9) 田口鐵男ほか: 癌の臨床. 1973; 19: 105-109
10) 斉藤達雄ほか: 最新医学. 1973; 28: 903-911
11) 三浦健ほか: 癌と化学療法. 1974; 1: 595-613
12) 太田和雄ほか: 治療. 1974; 56: 888-894
13) Conroy T, et al.: N Engl J Med. 2011; 364: 1817-1825
14) 社内資料: 膵癌FOLFIRINOX法に関する海外臨床試験
15) Hartmann KU, et al.: J Biol Chem. 1961; 236: 3006-3013
16) Spiegelman S, et al.: Cancer. 1980; 45: 1129-1134
17) Goldin A, et al.: Eur J Cancer. 1981; 17: 129-142


## 24. 文献請求先及び問い合わせ先


協和キリン株式会社　くすり相談窓口
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2
電話 0120-850-150
受付時間 9：00～17：30(土・日・祝日及び弊社休日を除く)

## 26．製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

**協和キリン株式会社**

東京都千代田区大手町1-9-2

**2025年 4 月改訂（第 5 版）
*2024年 4 月改訂（第 4 版）

| 日本標準商品分類番号 |
|---|
| 874291 |

| | エルプラット点滴静注液50mg | エルプラット点滴静注液100mg | エルプラット点滴静注液200mg |
|---|---|---|---|
| 承認番号 | 22100AMX02237 | 22100AMX02236 | 22400AMX01369 |
| 販売開始 | 2010年 6 月 | | 2013年 2 月 |

抗悪性腫瘍剤
オキサリプラチン点滴静注液
毒薬、処方箋医薬品注）

# エルプラット®点滴静注液50mg
# エルプラット®点滴静注液100mg
# エルプラット®点滴静注液200mg

**貯法**：室温保存
**有効期間**：3年

***ELPLAT*® I.V.INFUSION SOLUTION 50mg**
***ELPLAT*® I.V.INFUSION SOLUTION 100mg**
***ELPLAT*® I.V.INFUSION SOLUTION 200mg**

注）注意―医師等の処方箋により使用すること

## 1. 警告

**1.1 本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。**

**1.2 本剤投与後数分以内の発疹、そう痒、気管支痙攣、呼吸困難、血圧低下等を伴うショック、アナフィラキシーが報告されているので、患者の状態を十分に観察し、過敏症状（気管支痙攣、呼吸困難、血圧低下等）が認められた場合には、本剤の投与を直ちに中止し適切な処置を行うこと。また、回復後は本剤を再投与しないこと。［8.4、11.1.2 参照］**

**1.3 本剤はレボホリナート及びフルオロウラシルの静脈内持続投与法等との併用の場合に有用性が認められており、用法及び用量を遵守すること。また、本併用療法において致死的な転帰に至る重篤な副作用があらわれることがあるので、患者の状態を十分観察し、異常が認められた場合には、速やかに適切な処置を行うこと。**

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全のある患者［8.1、9.1.2、11.1.1 参照］
2.2 本剤の成分又は他の白金を含む薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者
2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5 参照］

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

| 販売名 | | エルプラット点滴静注液50mg | エルプラット点滴静注液100mg | エルプラット点滴静注液200mg |
|---|---|---|---|---|
| 容量（1バイアル中） | | 10mL | 20mL | 40mL |
| 有効成分 | オキサリプラチン | 50mg | 100mg | 200mg |

### 3.2 製剤の性状

| 販売名 | エルプラット点滴静注液50mg | エルプラット点滴静注液100mg | エルプラット点滴静注液200mg |
|---|---|---|---|
| pH | 4.0～7.0 | | |
| 浸透圧比 | 約0.04（生理食塩液に対する比） | | |
| 性状（外観） | 無色澄明の液 | | |

## 4. 効能又は効果

○ 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
○ 結腸癌における術後補助療法
○ 治癒切除不能な膵癌
○ 胃癌
○ 小腸癌

## 5. 効能又は効果に関連する注意

〈結腸癌における術後補助療法〉

5.1 国内での術後補助療法に関する検討は行われていない。［17.1.12、17.1.13 参照］
5.2 臨床試験の投与対象及び病期ごとの結果を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.12、17.1.13 参照］

〈治癒切除不能な膵癌〉

5.3 患者の病期、全身状態、UGT1A1注）遺伝子多型等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.14、17.1.15 参照］
注）イリノテカン塩酸塩水和物の活性代謝物（SN-38）の主な代謝酵素の一分子種である。
5.4 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

## 6. 用法及び用量

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、結腸癌における術後補助療法及び胃癌にはA法又はB法を、治癒切除不能な膵癌及び小腸癌にはA法を使用する。なお、患者の状態により適宜減量する。

A法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはオキサリプラチンとして85mg/m$^2$（体表面積）を1日1回静脈内に2時間で点滴投与し、少なくとも13日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。

B法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはオキサリプラチンとして130mg/m$^2$（体表面積）を1日1回静脈内に2時間で点滴投与し、少なくとも20日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

7.1 本剤の用法及び用量は、「17.臨床成績」の項の内容を熟知した上で、本剤と併用する他の抗悪性腫瘍剤に応じて選択すること。［17.1.3-17.1.16 参照］
7.2 国内臨床第Ⅰ相試験において、単剤では130mg/m$^2$（体表面積）の耐容性が認められているが[1]、本剤を単剤で用いた場合は、その有用性は確立していない[2]。［17.1.2 参照］

**7.3** 国内臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験において、本剤は、レボホリナート及びフルオロウラシルの急速静脈内投与法での併用療法は、耐容性が認められているが、その有用性は確立していない[3]。[17.1.1 参照]

**7.4** 米国の添付文書中には、本剤とホリナート及びフルオロウラシルの静脈内持続投与法との併用療法[注1]を行う場合、以下のような投与スケジュール(FOLFOX4法)を2週毎に行うことが推奨されるとの記載がある[4]。

| | |
|---|---|
| 第1日目 | 別々のバッグから5%ブドウ糖注射液250～500mLに溶解した本剤85mg/m²及び5%ブドウ糖注射液に溶解したホリナート200mg/m²[注2]を120分かけて同時に点滴静注する。その後フルオロウラシル400mg/m²を2～4分間で急速静脈内投与し、引き続き5%ブドウ糖注射液500mL(推奨)に溶解したフルオロウラシル600mg/m²を22時間かけて持続静注する。 |
| 第2日目 | ホリナート200mg/m²[注2]を120分かけて点滴静注し、その後フルオロウラシル400mg/m²を2～4分間で急速静脈内投与、引き続き5%ブドウ糖注射液500mL(推奨)に溶解したフルオロウラシル600mg/m²を22時間かけて持続静注する。 |

また、米国の添付文書中には、次表の投与可能条件、減量基準の記載がある。

2サイクル目以降の投与可能条件(投与予定日に確認し、当該条件を満たす状態へ回復するまで投与を延期する)

| 種類 | 程度 |
|---|---|
| 好中球数 | 1,500/mm³以上 |
| 血小板数 | 75,000/mm³以上 |

減量基準(前回の投与後に発現した有害事象により判断する)

| 種類 | 最悪時の程度 | 次回投与量 |
|---|---|---|
| 好中球数 | 500/mm³未満 | 本剤を65mg/m²[注5]又は75mg/m²[注6]に減量<br>フルオロウラシルを20%減量(300mg/m²の急速静脈内投与及び500mg/m²の22時間持続静注) |
| 発熱性好中球減少症[注3] | − | |
| 血小板数 | 50,000/mm³未満 | |
| 消化器系の有害事象(予防的治療の施行にもかかわらず発現) | Grade 3[注4]以上 | |

注1)国内において、ホリナート注射剤の「結腸・直腸癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強」に関する効能・効果は承認されていない。
注2)レボホリナート100mg/m²に相当する。
注3)発熱性好中球減少症が発現した場合は、次回投与量に従い減量する。
注4)「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」の場合はNCI-CTC version 2.0(1998年)。「結腸癌における術後補助療法」の場合はNCI-CTC version 1(1982年)。
注5)「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」の場合。
注6)「結腸癌における術後補助療法」の場合。

**7.5** カペシタビンとの併用療法(XELOX法)を行う場合には、次の投与可能条件及び減量基準を参考にすること。

2サイクル目以降の投与可能条件(投与予定日に確認し、当該条件を満たす状態へ回復するまで投与を延期する)

| 種類 | 程度 |
|---|---|
| 好中球数 | 1,500/mm³以上 |
| 血小板数 | 75,000/mm³以上 |

減量基準

| 種類 | 最悪時の程度 | 次回投与量 |
|---|---|---|
| 前回の投与後に発現した有害事象 | Grade 3[注7]以上 | 1回目発現時:本剤を100mg/m²に減量<br>2回目発現時:本剤を85mg/m²に減量 |

注7)CTCAE version 3.0(2003年)。

**〈結腸癌における術後補助療法〉**

**7.6** レボホリナート及びフルオロウラシルの静脈内持続投与法との併用では投与期間が12サイクル、カペシタビンとの併用では8サイクルを超えた場合の有効性及び安全性は確立していない(投与経験がない)。

**〈治癒切除不能な膵癌〉**

**7.7** イリノテカン塩酸塩水和物、レボホリナート、フルオロウラシルとの併用療法(FOLFIRINOX法)を行う場合には、次の投与可能条件、減量基準及び減量時の投与量を参考にすること。

2サイクル目以降の投与可能条件(投与予定日に確認し、当該条件を満たす状態へ回復するまで投与を延期するとともに、「減量基準」及び「減量時の投与量」を参考に、投与再開時に減量すること。)

| 種類 | 程度 |
|---|---|
| 好中球数 | 1,500/mm³以上 |
| 血小板数 | 75,000/mm³以上 |

減量基準
前回の投与後にいずれかの程度に該当する副作用が発現した場合は、該当する毎に、以下の減量方法に従って、投与レベルを1レベル減量する(「減量時の投与量」を参考にすること)。また、いずれかの程度に該当する好中球減少又は血小板減少が発現した場合は、以降のフルオロウラシル急速静脈内投与を中止する。

| 副作用[注8] | 程度 | 減量方法 |
|---|---|---|
| 好中球減少 | 以下のいずれかの条件を満たす場合:<br>1)2サイクル目以降の投与可能条件を満たさず投与を延期<br>2)500/mm³未満が7日以上持続<br>3)感染症又は下痢を併発し、かつ1,000/mm³未満<br>4)発熱性好中球減少症 | イリノテカン塩酸塩水和物を優先的に減量する。<br>ただし、イリノテカン塩酸塩水和物の投与レベルが本剤より低い場合は、イリノテカン塩酸塩水和物と同じレベルになるまで本剤を減量する。 |
| 下痢 | 発熱(38℃以上)を伴う | |
| | Grade 3[注9]以上 | フルオロウラシル持続静注を減量する。 |
| 血小板減少 | 以下のいずれかの条件を満たす場合:<br>1)2サイクル目以降の投与可能条件を満たさず投与を延期<br>2)50,000/mm³未満 | 本剤を優先的に減量する。<br>ただし、本剤の投与レベルがイリノテカン塩酸塩水和物より低い場合は、本剤と同じレベルになるまでイリノテカン塩酸塩水和物を減量する。 |
| 総ビリルビン上昇 | 2.0mg/dL超3.0mg/dL以下 | イリノテカン塩酸塩水和物を120mg/m²に減量する。 |
| | 3.0mg/dL超 | イリノテカン塩酸塩水和物を90mg/m²に減量する。 |
| 粘膜炎 | Grade 3[注9]以上 | フルオロウラシル持続静注を減量する。 |
| 手足症候群 | | |

注8)複数の副作用が発現した場合は、薬剤毎に減量が最大となる基準を適用すること。
注9)CTCAE version 4.0(2009年)。

減量時の投与量(本剤85mg/m²、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m²、フルオロウラシル持続静注2,400mg/m²で投与を開始した場合)

| 投与レベル | 本剤 | イリノテカン塩酸塩水和物 | フルオロウラシル持続静注 |
|---|---|---|---|
| −1 | 65mg/m² | 150mg/m² | 1,800mg/m² |
| −2 | 50mg/m² | 120mg/m² | 1,200mg/m² |
| −3 | 中止 | 中止 | 中止 |

**〈胃癌における術後補助療法〉**

**7.8** A法を使用した場合の有効性及び安全性は確立していない。

**7.9** カペシタビンとの併用では8サイクルを超えた場合の有効性及び安全性は確立していない(投与経験がない)。

## 8. 重要な基本的注意

**〈効能共通〉**

**8.1** 末梢神経症状、咽頭喉頭感覚異常は、特に低温又は冷たいものへの曝露により誘発又は悪化すること、多くは本剤の投与毎にあらわれるが休薬により回復する場合が多いことを、患者に対して十分に説明するとともに、冷たい飲み物や氷の使用を避け、低温時には皮膚を露出しないよう指導すること。[2.1、9.1.2、11.1.1 参照]

**8.2** 骨髄機能抑制等の重篤な副作用が起こることがあり、ときに致命的な経過をたどることがあるので、定期的に臨床検査(血液検査、肝機能検査、腎機能検査等)を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[9.1.1、9.1.4、11.1.4、11.1.5 参照]

**8.3** 感染症、出血傾向の発現又は増悪に十分注意すること。[9.1.4、11.1.17 参照]

**8.4** 気管支痙攣、呼吸困難、血圧低下等の重篤な過敏症状があらわれることがあり、重篤な過敏症状は本剤を複数回投与した後に発現する場合や、本剤の投与から数時間後に発現する場合があるので、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には直ちに中止し適切な処置を行うこと[5)6)]。[1.2、11.1.2 参照]

**8.5** 悪心、嘔吐、食欲不振等の消化器症状がほとんど全例に起こるので、患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行うこと。

**8.6** 薬剤誘発性血小板減少症があらわれることがあるので、紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等の症状を十分に観察すること。[11.1.6 参照]

**8.7** 溶血性貧血があらわれることがあるので、黄疸等の症状を十分に観察すること。[11.1.7 参照]

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌、小腸癌〉

8.8 本剤を使用する際には、関連文献(「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書」[7)~9)]等)を熟読すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

**9.1.1 骨髄機能抑制のある患者**

骨髄機能抑制が増悪するおそれがある。[8.2、11.1.4 参照]

**9.1.2 感覚異常又は知覚不全のある患者**

末梢神経症状が増悪するおそれがある。[2.1、8.1、11.1.1 参照]

**9.1.3 心疾患を有する患者**

心疾患が増悪するおそれがある。[11.1.10、15.2.2 参照]

**9.1.4 感染症を合併している患者**

本剤の骨髄機能抑制作用により、感染症が増悪するおそれがある。[8.2、8.3、11.1.4、11.1.17 参照]

**9.1.5 水痘患者**

致命的な全身障害があらわれるおそれがある。

### 9.2 腎機能障害患者

観察を十分に行い、発現する副作用に対して適切な処置を行うこと。腎障害患者では、本剤の限外ろ過血漿中白金のクリアランスが減少するが、限外ろ過血漿中白金濃度と臨床における安全性及び有効性との薬力学的関係は明確ではない。[16.6.1 参照]

**9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者**

腎機能が低下しているので、副作用が強くあらわれるおそれがある。

### 9.4 生殖能を有する者

9.4.1 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。[9.5 参照]

9.4.2 パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。細菌を用いた復帰突然変異試験、ほ乳類培養細胞を用いた染色体異常試験及びマウス骨髄細胞を用いた小核試験において、遺伝毒性が報告されている[10)]。

9.4.3 小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮すること。

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験(ラット)において着床期胚に対する致死作用及び胎児の発育遅滞が報告されている[11)]。[2.3、9.4.1 参照]

### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている[12)]。

### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 9.8 高齢者

用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能(骨髄機能、肝機能、腎機能等)が低下している。

## 10. 相互作用

### 10.2 併用注意(併用に注意すること)

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| 他の抗悪性腫瘍剤<br>放射線照射 | 骨髄機能抑制等を増強することがあるので、併用療法を行う場合には、患者の状態を十分に観察し、必要に応じて減量するか又は投与間隔を延長すること。 | 併用により殺細胞作用が増強される。 |

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

**11.1.1 末梢神経症状**

手、足や口唇周囲部の感覚異常又は知覚不全(末梢神経症状：96.6%)が本剤の投与直後からほとんど全例にあらわれる。また、咽頭喉頭の絞扼感(咽頭喉頭感覚異常：6.3%)があらわれることがある。末梢神経症状の悪化や回復遅延が認められると、手、足等がしびれて文字を書きにくい、ボタンをかけにくい、飲み込みにくい、歩きにくい等の感覚性の機能障害(頻度不明)があらわれることがあるので、感覚性の機能障害があらわれた場合には減量、休薬、中止等の適切な処置を行うこと。感覚性の機能障害が外国では累積投与量850mg/m$^2$で10%、1,020mg/m$^2$で20%に認められたと報告されている。[2.1、8.1、9.1.2 参照]

**11.1.2 ショック、アナフィラキシー**

発疹、そう痒、気管支痙攣、呼吸困難、血圧低下等を伴うショック(頻度不明)、アナフィラキシー(頻度不明)があらわれることがあるので、過敏症状(気管支痙攣、呼吸困難、血圧低下等)が認められた場合には、投与を直ちに中止し適切な処置を行うこと。[1.2、8.4 参照]

**11.1.3 間質性肺炎**(0.6%)、**肺線維症**(頻度不明)

発熱、咳嗽、呼吸困難等の臨床症状を十分に観察し、異常が認められた場合には投与を中止し、胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

**11.1.4 骨髄機能抑制**

汎血球減少(頻度不明)、血小板減少(51.4%)、白血球減少(44.0%)、好中球減少(59.4%)、発熱性好中球減少症(4.6%)、貧血(32.6%)があらわれることがある。[8.2、9.1.1、9.1.4 参照]

**11.1.5 溶血性尿毒症症候群**

血小板減少、溶血性貧血、腎不全を主徴とする溶血性尿毒症症候群(頻度不明)があらわれることがある。[8.2 参照]

**11.1.6 薬剤誘発性血小板減少症**

免疫学的機序を介した血小板減少症(0.6%)があらわれることがある。[8.6 参照]

**11.1.7 溶血性貧血**

免疫学的機序を介したクームス試験陽性の溶血性貧血(頻度不明)があらわれることがある。[8.7 参照]

**11.1.8 視野欠損、視野障害、視神経炎、視力低下**

視野欠損(0.6%)、視野障害(頻度不明)、視神経炎(頻度不明)、視力低下(頻度不明)等の視覚障害があらわれることがある。

**11.1.9 血栓塞栓症**(3.4%)

**11.1.10 心室性不整脈**(頻度不明)、**心筋梗塞**(頻度不明)
[9.1.3、15.2.2 参照]

**11.1.11 肝静脈閉塞症(VOD)**(頻度不明)

肝静脈閉塞症等の肝障害による門脈圧亢進、食道胃静脈瘤、脾腫、血小板減少症の発症に注意すること。

**11.1.12 急性腎障害**

間質性腎炎(頻度不明)、尿細管壊死(頻度不明)等により、急性腎障害(頻度不明)等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、腎機能検査値(BUN、血清クレアチニン値等)に異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

**11.1.13 白質脳症(可逆性後白質脳症症候群を含む)**(頻度不明)

歩行時のふらつき、舌のもつれ、痙攣、頭痛、錯乱、視覚障害等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

**11.1.14 高アンモニア血症**

意識障害を伴う高アンモニア血症(頻度不明)があらわれることがある。

**11.1.15 横紋筋融解症**(頻度不明)

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

**11.1.16 難聴**

難聴(頻度不明)、耳鳴(0.6%)等があらわれることがある。

**11.1.17 感染症**

肺炎(0.6%)、敗血症(1.1%)等の感染症があらわれることがある。[8.3、9.1.4 参照]

**11.1.18 肝機能障害**

AST上昇(38.9%)、ALT上昇(32.6%)、ビリルビン上昇(6.3%)等を伴う肝機能障害があらわれることがある。

### 11.2 その他の副作用

| | 5%以上 | 5%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|
| 精神神経系 | 味覚異常、頭痛、神経痛、コリン作動性症候群 | 不眠、浮動性めまい、回転性眩暈、傾眠、うつ病、失神、不安、構語障害、不随意性筋収縮 | 深部腱反射欠損、不全失語症、失調、神経過敏、レルミット徴候、脳神経麻痺、線維束攣縮、脳神経障害、めまい、頭重感、振戦、こわばり、硬直、筋骨格硬直、記憶障害、筋骨格系胸痛 |
| 消化器 | 悪心注)(80.0%)、下痢(56.0%)、嘔吐注)(49.1%)、食欲不振(89.1%)、口内炎(35.4%)、便秘、しゃっくり、腹痛、歯肉炎 | 胃部不快感、腸閉塞、上腹部痛、腹部膨満感、下腹部痛、腹部不快感、大腸炎、歯周病、胃炎、歯肉出血、歯痛、心窩部不快感、口内乾燥、腹水、齲歯、鼓腸、胃食道逆流性疾患、胃腸音異常、痔核、下部消化管出血、食道炎、消化不良、歯の異常 | 直腸炎、しぶり腹、腸内ガス、胃重圧感、腸壁気腫症、門脈ガス血症、消化管壊死、メレナ、胃痛、粘膜の炎症、胃腸障害、肛門周囲痛、膵炎、口腔内痛 |
| 腎臓 | 蛋白尿、BUN上昇、尿糖、尿沈渣異常 | クレアチニン上昇、血尿、尿ウロビリノーゲン異常、頻尿、膀胱炎、側腹部痛、尿量減少 | 排尿困難、尿失禁、腎機能障害 |
| 肝臓 | ALP上昇、LDH上昇 | γ-GTP上昇 | |
| 血液 | 白血球分画の変動(42.3%) | 白血球増加、血小板増加 | プロトロンビン時間延長 |
| 循環器 | 高血圧 | 低血圧、ほてり、頻脈、血管障害、上室性不整脈 | アダムス・ストークス症候群、動悸 |
| 呼吸器 | 鼻出血、鼻咽頭炎 | 呼吸困難、咳嗽、上気道感染、発声障害、咽頭炎、鼻粘膜障害 | 肺障害、嗄声、低酸素症、息切れ、喀血 |
| 電解質 | 血清カリウムの異常、血清ナトリウムの異常、血清クロールの異常 | 血清カルシウムの異常、血中リン減少 | |
| 眼 | | 流涙、視覚障害、結膜炎、眼球周囲痛、眼のそう痒感、眼の異常感、涙道閉塞 | 涙器障害、白内障、眼乾燥、眼瞼下垂 |
| 皮膚 | 脱毛、手足症候群(32.0%)、色素沈着、口唇炎 | 潮紅、多汗、皮膚乾燥、爪の障害、爪囲炎、皮下出血、寝汗、ざ瘡様皮膚炎 | 色素変化、紫斑、顔面潮紅、皮膚剥脱、顔面のほてり、皮膚障害、ヘルペス性皮膚炎 |
| 過敏症 | 発疹、薬物過敏症 | そう痒症、じん麻疹、紅斑、鼻炎 | 紅斑性皮疹、血管浮腫、アレルギー性鼻炎、気管支痙攣 |
| 投与部位 | 注射部位反応 | 血管炎、注射部位血管外漏出 | 血管痛 |
| その他 | 倦怠感、疲労(60.0%)、発熱、アルブミン減少、CRP上昇、体重減少、総蛋白減少 | 浮腫、感染、末梢性浮腫、脱水、コレステロール上昇、関節痛、悪寒、胸部不快感、背部痛、四肢痛、筋痛、鼻汁、胸痛、尿路感染、腰痛、熱感、胸部圧迫感、臀部痛、疼痛、骨痛、体重増加、下肢異常感 | 代謝障害、膣出血、戦慄、多臓器不全、腫瘍穿孔、高血糖、感冒、アミラーゼ上昇、出血、CK上昇、カテーテル関連感染、筋脱力、代謝性アシドーシス、乳汁漏出症 |

注)処置として制吐剤等の投与を行うこと。
副作用発現頻度は、国内臨床試験(175例)に基づき算出した。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

**14.1.1** 本剤は15℃以下で保存した場合、結晶を析出することがある。析出した場合は振盪するなどして、溶解させた後に使用すること。[20.2 参照]

**14.1.2** 本剤は細胞毒性を有するため、調製時には手袋を着用することが望ましい。皮膚に薬液が付着した場合には、直ちに石鹸及び多量の流水で洗い流すこと。眼、粘膜に薬液が付着した場合には、直ちに多量の流水でよく洗い流すこと。

**14.1.3** 本剤は、錯化合物であるので、他の抗悪性腫瘍剤とは混合調製しないこと。

**14.1.4** 本剤を5%ブドウ糖注射液に注入し、250～500mLとすること。

**14.1.5** 本剤は塩化物含有溶液により分解するため、生理食塩液等の塩化物を含む輸液との配合を避けること。

**14.1.6** 本剤は塩基性溶液により分解するため、塩基性溶液との混和は行わないこと。[14.2.1 参照]

**14.1.7** 本剤のような白金化合物は、アルミニウムとの接触により分解することが報告されているため、本剤の調製時にアルミニウムが用いられている機器(注射針等)は使用しないこと。[14.2.2 参照]

**14.1.8** 本剤は希釈後、できるだけ速やかに投与すること。

### 14.2 薬剤投与時の注意

**14.2.1** 塩基性溶液と同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。[14.1.6 参照]

**14.2.2** 本剤の投与時にアルミニウムが用いられている機器(注射針等)は使用しないこと。[14.1.7 参照]

**14.2.3** 静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れると、注射部位に硬結・壊死を起こすことがあるので、薬液が血管外に漏れないように慎重に投与すること。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

**15.1.1** 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用により、骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病、神経内分泌癌等の二次性悪性腫瘍が発生したとの報告がある。

**15.1.2** 欧州などで実施された原発巣治癒切除後のStageⅡ又はⅢの結腸癌を対象とした第Ⅲ相試験[4)13)14)]において、肝酵素上昇が本剤とホリナート及びフルオロウラシルの静脈内持続投与法との併用療法(FOLFOX4法)の投与群で57%(629/1,108例)、ホリナート及びフルオロウラシルの静脈内持続投与法(LV5FU2法)の投与群で34%(379/1,111例)、アルカリホスファターゼ上昇がFOLFOX4投与群で42%(467/1,108例)、LV5FU2投与群で20%(222/1,111例)と、いずれもFOLFOX4投与群で高頻度に発現することが報告されている。[17.1.12 参照]

### 15.2 非臨床試験に基づく情報

**15.2.1** 本剤のがん原性試験は実施していないが、細菌を用いた復帰突然変異試験、ほ乳類培養細胞を用いた染色体異常試験及びマウス骨髄細胞を用いた小核試験において、いずれも陽性の結果が報告されており[10)]、がん原性を有する可能性がある。

**15.2.2** 単回静脈内投与によるサル安全性薬理試験並びに毒性試験において、9.1mg/kg以上の用量で、投与後QTc延長や心筋壊死が観察されたとの報告がある[15)]。[9.1.3、11.1.10 参照]

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 単回及び反復投与

結腸・直腸癌患者67例(単独投与)[注1)注2)]から得られた626時点の限外ろ過血漿中白金濃度測定値を用いて、薬物動態パラメータに影響を及ぼしうる患者側因子を検討した。限外ろ過血漿中白金濃度を3コンパートメントモデルにて解析した結果、そのクリアランスは、

クレアチニンクリアランス(CrCL、mL/min)と相関を示した。

結腸・直腸癌患者18例(レボホリナート及びフルオロウラシルの急速静脈内投与法との併用投与)から得られた108時点の限外ろ過血漿中白金濃度測定値を用いて、レボホリナート及びフルオロウラシルとの併用の影響を検討した結果、中心コンパートメント分布容積に影響が認められた。


単独投与67例とレボホリナート及びフルオロウラシルとの併用投与18例を合わせた85例から得られた、計734点の限外ろ過血漿中白金濃度データについて、薬物動態パラメータに影響を及ぼしうる患者因子を組み込んだ3コンパートメントモデルに、レボホリナート及びフルオロウラシルとの併用の影響を組み込んだモデルにて解析した結果は次表のとおりであった[16]。

限外ろ過血漿中白金の母集団平均パラメータ

| | |
|---|---|
| CL(L/hr/m$^2$) | 3.00+0.00827×CrCL |
| 肝転移のある場合 | 1.13×CL |
| 女性の場合 | 1.09×CL |
| $V_1$(L/m$^2$) | 7.70 |
| 65歳以上の場合 | 1.22×$V_1$ |
| レボホリナート及びフルオロウラシルを併用した場合 | 1.26×$V_1$ |
| $V_{ss}$(L/m$^2$) | 656(レボホリナート及びフルオロウラシル併用の場合658) |

CL:クリアランス、$V_1$:中心コンパートメント分布容積、$V_{ss}$:定常状態の分布容積

例えば、肝転移のない65歳未満の男性患者(想定CrCL=100mL/min)に85mg/m$^2$で本剤とレボホリナート及びフルオロウラシルを併用した場合、限外ろ過血漿中白金の薬物動態パラメータはCL=3.83(L/hr/m$^2$)、$V_1$=9.7(L/m$^2$)、$V_{ss}$=658(L/m$^2$)、$t_{1/2}\alpha$=0.26(hr)、$t_{1/2}\beta$=27.6(hr)、$t_{1/2}\gamma$=392(hr)、$T_{max}$=2.0(hr)、$C_{max}$=931(ng/mL)、AUC=10.9(μg・hr/mL)と算出される。




### 16.3 分布

ラットに$^{14}$C-標識体7mg/2MBq/kgを単回静脈内投与し、投与後504時間まで経時的に組織内放射能濃度を測定した。投与後15分では腎の放射能濃度が最も高かった。各組織の$T_{1/2}$は130時間以上であり、いずれも血漿の$T_{1/2}$(約36時間)より長かった[17]。

### 16.4 代謝

生体内におけるオキサリプラチンの活性体変換は非酵素的な物理化学的過程を経て起こる(生体内変換)。ヒトにおいてオキサリプラチンの血漿中主生体内変換体はジクロロ1,2-ジアミノシクロヘキサン(DACH)白金、モノアクオモノクロロDACH白金、ジアクオDACH白金であった[18]。

### 16.5 排泄

**16.5.1** 日本人の固形癌患者6例に本剤130mg/m$^2$を2時間点滴投与した際の投与後24時間までの尿中排泄率は、全白金量33.9±8.8%(平均±標準偏差)であった[1]。

**16.5.2** 消化器癌患者5例に本剤130mg/m$^2$を2時間点滴投与し、48時間後からフルオロウラシル300mg/m$^2$/日を12週間点滴静注した際の投与後120時間までの尿中排泄率及び糞中排泄率は、それぞれ全白金量の53.8±9.1%及び2.1±1.9%(いずれも平均±標準偏差)であった(外国人データ)[19]。

### 16.6 特定の背景を有する患者

#### 16.6.1 腎機能障害患者

成人癌患者29例の腎機能を、クレアチニンクリアランスを指標として≧60mL/min、40～59mL/min、20～39mL/min、<20mL/minに分類した際の、本剤単独投与時(60～130mg/m$^2$)[注1)注2)]限外ろ過血漿中白金のAUCは次表のとおりであった(外国人データ)[20]。[9.2参照]

クレアチニンクリアランス別の本剤単独投与時限外ろ過血漿中白金のAUC

| クレアチニンクリアランス | 投与量 | 症例数 | AUC*(μg・hr/mL) |
|---|---|---|---|
| ≧60mL/min | 130mg/m$^2$ | 11 | 16.4±5.02 |
| 40～59mL/min | 105mg/m$^2$ | 3 | 32.7±16.2 |
| | 130mg/m$^2$ | 6 | 39.7±11.5 |
| 20～39mL/min | 80mg/m$^2$ | 1 | 29.5 |
| | 105mg/m$^2$ | 2 | 42.0±1.25 |
| | 130mg/m$^2$ | 5 | 44.6±14.6 |
| <20mL/min | 60mg/m$^2$ | 1 | 32.2 |

*平均±標準偏差

注1)本剤の承認された1回用量は、85mg/m$^2$(体表面積)又は130mg/m$^2$(体表面積)である。

注2)本剤の用法及び用量は、他の抗悪性腫瘍剤との併用において承認されている。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉

#### 17.1.1 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験

化学療法未治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅰ/Ⅱ相試験における併用療法(本剤85mg/m$^2$を第1、15日に、フルオロウラシル急速静脈内投与400mg/m$^2$及びレボホリナート250mg/m$^2$を第1、8、15日に投与し、13日間休薬する方法)の推奨投与量での有効性は次表のとおりであった[3]。

| 奏効率(有効例/適格例) |
|---|
| 64.3%(9/14) |

安全性評価症例18例中18例(100.0%)に副作用が認められた。主な副作用は、末梢神経症状18例(100.0%)、食欲不振17例(94.4%)、好中球減少15例(83.3%)、血小板減少14例(77.8%)、悪心14例(77.8%)、注射部位反応14例(77.8%)、嘔吐12例(66.7%)、ALT上昇11例(61.1%)、白血球減少10例(55.6%)、下痢10例(55.6%)、AST上昇10例(55.6%)、疲労8例(44.4%)であった(承認時)。[7.3参照]

#### 17.1.2 国内第Ⅱ相試験

フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍薬で治療抵抗性を示した進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅱ相試験における本剤単独療法(本剤130mg/m$^2$を点滴投与することを3週毎に繰り返す[注1)])の有効性は次表のとおりであった[2]。

| 奏効率(有効例/適格例) | 生存期間中央値 |
|---|---|
| 8.8%(5/57) | 338日(11.1か月) |

安全性評価症例57例に認められた主な副作用は、末梢神経症状57例(100%)、食欲不振51例(89.5%)、悪心45例(78.9%)、嘔吐35例(61.4%)、血小板減少29例(50.9%)、AST上昇28例(49.1%)、疲労28例(49.1%)、白血球減少25例(43.9%)であった。[7.2参照]

注1)本剤の用法及び用量は、他の抗悪性腫瘍剤との併用において承認されている。

#### 17.1.3 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験

化学療法未治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅰ/Ⅱ相試験におけるXELOX法[注2)]又はXELOX法+ベバシズマブ[注3)]の推奨投与量での有効性は次表のとおりであった[21]。

| 投与レジメン | 奏効率(有効例/適格例) |
|---|---|
| XELOX法 | 66.7%(4/6) |
| XELOX法+ベバシズマブ | 71.9%(41/57) |

安全性評価症例64例中64例(100.0%)に副作用が認められた。主な副作用は、末梢神経症状60例(93.8%)、食欲不振57例(89.1%)、疲労52例(81.3%)、悪心49例(76.6%)、手足症候群49例(76.6%)、色素沈着38例

(59.4%)、下痢36例(56.3%)、口内炎35例(54.7%)、好中球減少33例(51.6%)、嘔吐27例(42.2%)であった(承認時)。[7.1 参照]

**17.1.4 海外第Ⅲ相試験**

化学療法未治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるFOLFOX4法[注4)]の有効性は次表のとおりであった[4)22)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 45.2%<br>(95/210) | 8.7か月 | 19.5か月 |

安全性評価症例259例に認められた主な有害事象は、白血球減少221例(85%)、末梢神経症状213例(82%)、好中球減少210例(81%)、悪心184例(71%)、血小板減少183例(71%)、疲労182例(70%)、下痢145例(56%)、嘔吐106例(41%)であった。[7.1 参照]

**17.1.5 海外第Ⅲ相試験**

化学療法未治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるFOLFOX4法[注4)]の有効性は次表のとおりであった[23)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 50.0%<br>(105/210) | 8.2か月 | 16.2か月 |

安全性評価症例209例に認められた主な副作用は、ヘモグロビン減少(貧血)181例(86.6%)、血小板減少159例(76.1%)、悪心151例(72.2%)、好中球減少147例(70.3%)、末梢神経症状142例(67.9%)、下痢123例(58.9%)、嘔吐113例(54.1%)、口内炎(粘膜の炎症)91例(43.5%)であった。[7.1 参照]

**17.1.6 海外第Ⅲ相試験**

化学療法既治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるFOLFOX4法[注4)]の有効性は次表のとおりであった[4)24)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 9.9%<br>(15/152) | 4.6か月 | − |

安全性評価症例150例に認められた主な有害事象は、ヘモグロビン減少(貧血)121例(81%)、白血球減少114例(76%)、末梢神経症状111例(74%)、好中球減少110例(73%)、疲労102例(68%)、下痢100例(67%)、悪心97例(65%)、血小板減少96例(64%)、AST上昇71例(47%)、嘔吐60例(40%)であった。[7.1 参照]

**17.1.7 海外第Ⅲ相試験**

化学療法未治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるFOLFOX4法[注4)]とFOLFOX4法+プラセボの有効性は次表のとおりであった[25)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 49.0%<br>(304/620) | 241.0日<br>(7.9か月) | 565.0日<br>(18.6か月) |

安全性評価症例649例に認められた主な有害事象は、神経毒性516例(79.5%)、悪心・嘔吐452例(69.6%)、下痢393例(60.6%)、好中球/顆粒球減少症380例(58.6%)であった。[7.1 参照]

**17.1.8 海外第Ⅲ相試験**

化学療法未治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるXELOX法[注2)]とXELOX法+プラセボの有効性は次表のとおりであった[25)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 47.0%<br>(296/630) | 220.0日<br>(7.2か月) | 572.0日<br>(18.8か月) |

安全性評価症例655例に認められた主な有害事象は、神経毒性534例(81.5%)、悪心・嘔吐464例(70.8%)、下痢429例(65.5%)であった。[7.1 参照]

**17.1.9 海外第Ⅲ相試験**

化学療法未治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるXELOX法+ベバシズマブ[注3)]の有効性は次表のとおりであった[25)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 45.7%<br>(160/350) | 282.0日<br>(9.3か月) | 650.0日<br>(21.4か月) |

安全性評価症例353例に認められた主な有害事象は、神経毒性296例(83.9%)、悪心・嘔吐252例(71.4%)、下痢224例(63.5%)であった。[7.1 参照]

**17.1.10 海外第Ⅲ相試験**

化学療法既治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるFOLFOX4法[注4)]の有効性は次表のとおりであった[26)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 20.2%<br>(51/252) | 168.0日<br>(5.5か月) | 402.0日<br>(13.2か月) |

安全性評価症例308例中302例(98.1%)に有害事象が認められた。主な有害事象は、神経毒性225例(73.1%)、悪心・嘔吐191例(62.0%)、下痢150例(48.7%)、好中球/顆粒球減少症149例(48.4%)であった。[7.1 参照]

**17.1.11 海外第Ⅲ相試験**

化学療法既治療の進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるXELOX法[注2)]の有効性は次表のとおりであった[26)]。

| 奏効率<br>(有効例/適格例) | 無増悪生存期間<br>中央値 | 生存期間<br>中央値 |
|---|---|---|
| 23.1%<br>(58/251) | 154.0日<br>(5.1か月) | 393.0日<br>(12.9か月) |

安全性評価症例311例中307例(98.7%)に有害事象が認められた。主な有害事象は、神経毒性222例(71.4%)、悪心・嘔吐205例(65.9%)、下痢177例(56.9%)であった。[7.1 参照]

**〈結腸癌における術後補助療法〉**

**17.1.12 海外第Ⅲ相試験**

原発巣治癒切除後のStageⅡ又はⅢの結腸癌(直腸S状部癌を含む)を対象とした第Ⅲ相試験におけるホリナート及びフルオロウラシルの静脈内持続投与法(LV5FU2法)並びにFOLFOX4法[注4)](12サイクル)の有効性は次表のとおりであった[4)13)14)]。

| ITT解析対象<br>(FOLFOX4法群/<br>LV5FU2法群) | 3年無病生存率<br>(主要評価項目) | | 6年全生存率<br>(副次的評価項目) | |
|---|---|---|---|---|
| | FOLFOX4法群 | LV5FU2法群 | FOLFOX4法群 | LV5FU2法群 |
| 全例<br>(1,123/1,123例) | 78.2% | 72.9% | 78.5% | 76.0% |
| | P=0.002[注5)] | | P=0.046[注5)] | |
| StageⅢ<br>(672/675例) | 72.2% | 65.3% | 72.9% | 68.7% |
| | P=0.0052[注5)] | | P=0.023[注5)] | |
| StageⅡ<br>(451/448例) | 87.0% | 84.3% | 86.9% | 86.8% |
| | P=0.2286[注5)] | | P=0.986[注5)] | |

FOLFOX4法群において、安全性評価症例1,108例に認められた主な有害事象は、末梢神経症状1,019例(92%)、好中球減少874例(79%)、血小板減少858例(77%)、ヘモグロビン減少(貧血)838例(76%)、悪心817例(74%)、AST上昇・ALT上昇(トランスアミナーゼ上昇として)629例(57%)、下痢624例(56%)、嘔吐523例(47%)、疲労482例(44%)、ALP上昇467例(42%)、口内炎461例(42%)であった。[5.1、5.2、7.1、15.1.2 参照]

**17.1.13 海外第Ⅲ相試験**

原発巣治癒切除後のStageⅢの結腸癌(直腸S状部癌を含む)を対象とした第Ⅲ相試験におけるホリナート及びフルオロウラシルの静脈内投与法(5-FU/LV法[注6)])並びにXELOX法[注2)](8サイクル)の有効性は次表のとおりであった[27)]。

| ITT解析対象<br>(XELOX法群/<br>5-FU/LV法群) | 3年無病生存率<br>(主要評価項目) | | 5年全生存率<br>(副次的評価項目) | |
|---|---|---|---|---|
| | XELOX法群 | 5-FU/LV法群 | XELOX法群 | 5-FU/LV法群 |
| 全例<br>(944/942例) | 71% | 67% | 78% | 74% |
| | P=0.0045[注5)] | | P=0.1486[注5)] | |

XELOX法群において、安全性評価症例938例に認められた主な有害事象は、末梢神経症状649例(69%)、ヘモグロビン減少(貧血)645例(69%)、悪心625例(67%)、AST上昇581例(62%)、下痢577例(62%)、血中ブドウ糖上昇556例(59%)、血小板減少538例(57%)、白血球

減少482例(51%)、好中球減少429例(46%)、嘔吐415例(44%)、ALT上昇411例(44%)であった。[5.1、5.2、7.1 参照]

注6)ホリナート急速静脈内投与20mg/m²(体表面積)、フルオロウラシル急速静脈内投与425mg/m²(体表面積)をそれぞれ第1～5日に投与することを4週毎に繰り返し、6サイクル行う。または、ホリナート静脈内点滴投与500mg/m²(体表面積)、フルオロウラシル急速静脈内投与500mg/m²(体表面積)をそれぞれ1～6週の第1日に投与することを8週毎に繰り返す(4サイクル)。

**〈治癒切除不能な膵癌〉**

**17.1.14 国内第Ⅱ相試験**

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ相試験におけるFOLFIRINOX法(1サイクルを2週間として第1日目に本剤85mg/m²、レボホリナート200mg/m²、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m²を点滴静注し、引き続きフルオロウラシル400mg/m²を急速静脈内投与、フルオロウラシル2,400mg/m²を46時間かけて持続静注)の有効性は次表のとおりであった[28]。対象患者はECOG[注7] Performance status 0及び1であった。2つの遺伝子多型(*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*)について、いずれかをホモ接合体(*UGT1A1*6/*6*、*UGT1A1*28/*28*)又はいずれもヘテロ接合体(*UGT1A1*6/*28*)としてもつ患者は除外された。また、1サイクル目の投与可能条件として、好中球数(2,000/mm³以上)、総ビリルビン値(施設基準値上限以下)等が設定された。

| 奏効率(有効例/適格例) |
|---|
| 38.9%(14/36) |

安全性評価症例36例中36例(100.0%)に副作用が認められた。主な副作用は、好中球減少34例(94.4%)、白血球減少33例(91.7%)、血小板減少32例(88.9%)、悪心32例(88.9%)、貧血31例(86.1%)、食欲不振31例(86.1%)、下痢30例(83.3%)、末梢神経症状27例(75.0%)、リンパ球減少24例(66.7%)、CRP上昇24例(66.7%)、脱毛24例(66.7%)、アルブミン減少23例(63.9%)、体重減少21例(58.3%)、AST上昇20例(55.6%)、ALT上昇20例(55.6%)、口内炎19例(52.8%)、便秘17例(47.2%)、味覚異常17例(47.2%)、LDH上昇16例(44.4%)、倦怠感16例(44.4%)、疲労15例(41.7%)、ナトリウム減少15例(41.7%)であった(承認時)。[5.3、7.1 参照]

**17.1.15 海外第Ⅱ/Ⅲ相試験**

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相試験におけるFOLFIRINOX法(1サイクルを2週間として第1日目に本剤85mg/m²、ホリナート400mg/m²、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m²を点滴静注し、引き続きフルオロウラシル400mg/m²を急速静脈内投与、フルオロウラシル2,400mg/m²を46時間かけて持続静注)とゲムシタビン塩酸塩(GEM)単独投与(GEM 1,000mg/m²の週1回点滴投与を7週連続し、8週目は休薬する。その後は、週1回点滴投与を3週連続し、4週目は休薬として、これを4週毎に繰り返す)の中間解析時の有効性は次表のとおりであった[29)30)]。対象患者はECOG[注7] Performance status 0及び1であった。登録において2つの遺伝子多型(*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*)に関する基準は設定されなかった。また、登録時の選択基準として、好中球数(1,500/mm³以上)、総ビリルビン値(施設基準値上限の1.5倍以下)等が設定された。

| 投与群 | 例数(ITT) | 生存期間(主要評価項目) | |
|---|---|---|---|
| | | 中央値(月) | ハザード比 P値[注5] |
| FOLFIRINOX法 | 127 | 10.5 | 0.62 P<0.001 |
| GEM単独投与 | 128 | 6.9 | |

FOLFIRINOX法群において、安全性評価症例167例のうち、有害事象が収集できなかった1例を除く166例中166例(100%)に有害事象が認められた。主な有害事象は、貧血150例(90.4%)、疲労144例(87.3%)[注8]、γ-GTP増加139例(83.7%)、血中ALP増加137例(83.0%)[注8]、好中球数減少131例(79.9%)[注9]、悪心132例(79.5%)、血小板数減少124例(75.2%)[注8]、下痢121例(73.3%)[注8]、末梢性感覚ニューロパチー117例(70.5%)、ALT増加107例(64.8%)[注8]、AST増加106例(64.6%)[注9]、嘔吐102例(61.4%)、体重変動90例(54.2%)、食欲減退81例(48.8%)、便秘75例(45.2%)であった。[5.3、7.1 参照]

注7)Eastern Cooperative Oncology Group。

注8)当該事象に関する安全性情報が収集できなかった1例を除く165例による集計。

注9)当該事象に関する安全性情報が収集できなかった2例を除く164例による集計。

**〈胃癌における術後補助療法〉**

**17.1.16 海外第Ⅲ相試験**

原発巣治癒切除後のStageⅡ、Ⅲの胃癌を対象とした第Ⅲ相試験におけるXELOX法[注2)](8サイクル)の有効性は次表のとおりであった[31)32)]。

| ITT解析対象(XELOX法群/経過観察群) | 3年無病生存率(主要評価項目) | | 5年全生存率(副次的評価項目) | |
|---|---|---|---|---|
| | XELOX法群 | 経過観察群 | XELOX法群 | 経過観察群 |
| 全例(520/515例) | 74% | 59% | 78% | 69% |
| | ハザード比:0.56 P<0.0001[注10] | | ハザード比:0.66 P=0.0015[注10] | |

XELOX法群において、安全性評価症例496例中490例(99%)に有害事象が認められた。主な有害事象は、悪心326例(66%)、好中球減少症300例(60%)、食欲減退294例(59%)、末梢性ニューロパチー277例(56%)、下痢236例(48%)であった。[7.1 参照]

注10)層別多変量Cox比例ハザードモデル。

注2)本剤130mg/m²(体表面積)を第1日に点滴投与し、カペシタビン1,000mg/m²を1日2回14日間連日経口投与することを3週毎に繰り返す。

注3)本剤130mg/m²(体表面積)、ベバシズマブ7.5mg/kg(体重)を第1日に点滴投与し、カペシタビン1,000mg/m²を1日2回14日間連日経口投与することを3週毎に繰り返す。

注4)本剤85mg/m²(体表面積)を第1日に、ホリナート200mg/m²(体表面積)、フルオロウラシル急速静脈内投与400mg/m²(体表面積)、フルオロウラシル静脈内持続投与600mg/m²(体表面積)をそれぞれ第1、2日に投与することを2週毎に繰り返す。

注5)log-rank検定。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

ヒトにおいてオキサリプラチンは、生体内変換体(ジクロロ1,2-ジアミノシクロヘキサン(DACH)白金、モノアクオモノクロロDACH白金、ジアクオDACH白金)を形成し、癌細胞内のDNA鎖と共有結合することでDNA鎖内及び鎖間の両者に白金-DNA架橋を形成する。これらの架橋がDNAの複製及び転写を阻害する。

### 18.2 抗腫瘍効果


ヒト大腸癌由来SW480、HCT116、SW620及びHT-29細胞株、ヒト膵癌由来PANC-1、MIA PaCa-2及びSW1990細胞株、ヒト胃癌由来AGS、MKN1、MKN45、MKN74及びNCI-N87細胞株(*in vitro*)並びにヌードマウス移植可ヒトHT-29及びMKN45細胞株において、強い抗腫瘍効果が認められた[33)34)]。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称:オキサリプラチン(Oxaliplatin)(JAN)

化学名:(*SP*-4-2)-[(1*R*,2*R*)-Cyclohexane-1,2-diamine-κ*N*, κ*N*']['ethanedioato(2-)-κ*O*¹, κ*O*²]platinum

化学構造式:



分子式：$C_8H_{14}N_2O_4Pt$
分子量：397.29
性　状：白色の結晶性の粉末である。
水に溶けにくく、メタノールに極めて溶けにくく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。
旋光度：$[\alpha]_D^{20}$：+74.5～+78.0°（乾燥物に換算したもの 0.250g、水、50mL、100mm）

## 20. 取扱い上の注意

**20.1** 包装開封後もバイアルを箱に入れて保存すること。
**20.2** 15℃以下での保存は推奨されない。[14.1.1 参照]

## 22. 包装

**〈エルプラット点滴静注液50mg〉**
1バイアル
**〈エルプラット点滴静注液100mg〉**
1バイアル
**〈エルプラット点滴静注液200mg〉**
1バイアル

## 23. 主要文献


1) Shirao K, et al.：Jpn J Clin Oncol. 2006；36：295-300.
2) Boku N, et al.：Jpn J Clin Oncol. 2007；37：440-445.
3) Yamada Y, et al.：Jpn J Clin Oncol. 2006；36：218-223.
4) 米国添付文書
5) 社内資料：進行・再発の結腸・直腸癌の本剤とレボホリナート及びフルオロウラシルの静脈内持続投与法との併用療法に関する資料
6) Larzillière I, et al.：Am J Gastroenterol. 1999；94：3387-3388.
7) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書：オキサリプラチン(切除不能進行・再発胃癌)
8) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書：オキサリプラチン(小腸癌)
9) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書：オキサリプラチン(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
10) 社内資料：遺伝毒性試験
11) 社内資料：生殖毒性試験
12) 社内資料：ラット乳汁移行試験
13) André T, et al.：N Engl J Med. 2004；350：2343-2351.
14) André T, et al.：J Clin Oncol. 2009；27：3109-3116.
15) 社内資料：サル心毒性に関する試験
16) 社内資料：薬物動態(母集団薬物動態解析)
17) 社内資料：ラット組織分布試験
18) Graham MA, et al.：Clin Cancer Res. 2000；6：1205-1218.
19) 社内資料：外国成人癌患者を対象とした臨床薬理試験
20) Takimoto CH, et al.：J Clin Oncol. 2003；21：2664-2672.
21) Doi T, et al.：Jpn J Clin Oncol. 2010；40：913-920.
22) Goldberg RM, et al.：J Clin Oncol. 2004；22：23-30.
23) de Gramont A, et al.：J Clin Oncol. 2000；18：2938-2947.
24) Rothenberg ML, et al.：J Clin Oncol. 2003；21：2059-2069.
25) 社内資料：化学療法未治療例を対象とした第Ⅲ相臨床試験
26) 社内資料：化学療法既治療例を対象とした第Ⅲ相臨床試験
27) Haller DG, et al.：J Clin Oncol. 2011；29：1465-1471.
28) Okusaka T, et al.：Cancer Sci. 2014；105：1321-1326.
29) Conroy T, et al.：N Engl J Med. 2011；364：1817-1825.
30) 社内資料：膵癌FOLFIRINOX法に関する資料
31) Bang YJ, et al.：Lancet. 2012；379：315-321.
32) Noh SH, et al.：Lancet Oncol. 2014；15：1389-1396.
33) 社内資料：*In vitro*薬効薬理試験
34) 社内資料：*In vivo*薬効薬理試験


## ＊24. 文献請求先及び問い合わせ先


高田製薬株式会社　文献請求窓口
〒336-8666　さいたま市南区沼影1丁目11番1号
電話　0120-989-813
FAX　048-838-2121


## ＊＊26. 製造販売業者等

**26.1 製造販売元**


**高田製薬株式会社**
**さいたま市西区宮前町203番地1**

＊＊2025年1月改訂（第5版）
＊2023年12月改訂（第4版）

**貯　　法**：2～8℃で保存
**有効期間**：3年

| 日本標準商品分類番号 |
|---|
| 874291 |

＊

| | 100mg | 500mg |
|---|---|---|
| 承認番号 | 22000AMX01771000 | 30500AMX00233000 |
| 販売開始 | 2008年9月 | 2023年12月 |

# 抗悪性腫瘍剤　抗ヒトEGFR[注1)]モノクローナル抗体

セツキシマブ（遺伝子組換え）製剤
生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品[注2)]

# アービタックス®注射液100mg
# アービタックス®注射液500mg

ERBITUX® Injection 100mg・500mg

注1）EGFR：Epidermal Growth Factor Receptor（上皮細胞増殖因子受容体）
注2）注意－医師等の処方箋により使用すること

**1. 警告**

**1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。**

**1.2 重度のinfusion reactionが発現し、死亡に至る例が報告されている。症状としては、気管支痙攣、蕁麻疹、低血圧、意識消失、ショックがあらわれ、心筋梗塞、心停止も報告されている。これらの症状は本剤の初回投与中又は投与終了後1時間以内に観察されているが、投与数時間後又は2回目以降の本剤投与でも発現することがあるので、患者の状態を十分に確認しながら慎重に投与すること。また、重度のinfusion reactionが発現した場合は、本剤の投与を直ちに中止し、再投与しないこと。［7.1、7.2、8.1、8.2、11.1.1参照］**

**2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）**

本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者

## 3. 組成・性状

### ＊3.1 組成

| | 成分名 | 1バイアル（20mL）中の分量 | 1バイアル（100mL）中の分量 |
|---|---|---|---|
| 有効成分 | セツキシマブ（遺伝子組換え）[注] | 100mg | 500mg |
| 添加剤 | 塩化ナトリウム | 116.88mg | 584.4mg |
| | グリシン | 150.14mg | 750.7mg |
| | ポリソルベート80 | 2.00mg | 10.0mg |
| | クエン酸水和物 | 42.02mg | 210.1mg |
| | その他、添加剤としてpH調節剤を含有する。 | | |

注）マウスハイブリドーマ細胞株を用いて製造される。マスターセルバンク及びワーキングセルバンク構築時にウシ胎児血清を使用している。また、製造工程において、培地成分としてウシ血清由来成分（アルブミン及びリポたん白質）を使用している。［8.4参照］

### 3.2 製剤の性状

| | |
|---|---|
| 外　　観 | 無色～微黄色の澄明又はわずかに乳白光を呈する液 |
| pH | 5.3～5.7 |
| 浸透圧比 | 約1（浸透圧比：生理食塩液に対する比） |

## 4. 効能又は効果

**○*RAS*遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌**
**○頭頸部癌**

## 5. 効能又は効果に関連する注意

〈効能共通〉

**5.1** 術後補助療法としての本剤の有効性及び安全性は確立していない。

**5.2**「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。

## 6. 用法及び用量

1週間間隔投与の場合：
通常、成人には、セツキシマブ（遺伝子組換え）として、初回は400mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて、2回目以降は250mg/m$^2$（体表面積）を1時間かけて1週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。
2週間間隔投与の場合：
通常、成人には、セツキシマブ（遺伝子組換え）として、500mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて2週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

**7.1** 本剤投与時にあらわれることがあるinfusion reactionを軽減させるため、本剤の投与前に抗ヒスタミン剤の前投薬を行うこと。さらに、本剤投与前に副腎皮質ホルモン剤を投与すると、infusion reactionが軽減されることがある。［1.2、7.2、8.1、8.2、11.1.1参照］

**7.2** 重度（Grade 3以上[注)]）のinfusion reactionが発現した場合には、本剤の投与を直ちに中止し、再投与しないこと。軽度～中等度（Grade 1-2[注)]）のinfusion reactionが発現した場合には、投与速度を減速し、その後の全ての投与においても減速した投与速度で投与すること。投与速度を減速した後に再度infusion reactionが発現した場合には、直ちに投与を中止し、再投与しないこと。［1.2、7.1、7.4、8.1、8.2、11.1.1参照］

**7.3** 重度（Grade 3以上[注)]）の皮膚症状が発現した場合には、次表に従い本剤の用量を調節すること。［8.5、11.1.2参照］

用量調節の目安

| Grade 3以上[注)]の皮膚症状の発現回数 | 本剤の投与 | 投与延期後の状態 | 本剤の用量調節 |
|---|---|---|---|
| 初回発現時 | 投与延期 | Grade 2[注)]以下に回復 | A：200mg/m$^2$で投与継続 |
| | | | B：250mg/m$^2$で投与継続 |
| | | | C：500mg/m$^2$で投与継続 |
| | | 回復せず | 投与中止 |
| 2回目の発現時 | 投与延期 | Grade 2[注)]以下に回復 | A：150mg/m$^2$で投与継続 |
| | | | B：200mg/m$^2$で投与継続 |
| | | | C：400mg/m$^2$で投与継続 |
| | | 回復せず | 投与中止 |

| Grade 3以上[注)]の皮膚症状の発現回数 | 本剤の投与 | 投与延期後の状態 | 本剤の用量調節 |
|---|---|---|---|
| 3回目の発現時 | 投与延期 | Grade 2[注)]以下に回復 | A：投与中止 |
| | | | B：150mg/m$^2$で投与継続 |
| | | | C：300mg/m$^2$で投与継続 |
| | | 回復せず | 投与中止 |
| 4回目の発現時 | 投与中止 | | |

A：1週間間隔投与で放射線療法との併用の場合、B：1週間間隔投与で放射線療法との併用以外の場合、C：2週間間隔投与の場合
注）GradeはNCI-CTCに準じる。

**7.4** 本剤の投与時には、10mg/分以下の投与速度で静脈内注射すること。[7.2参照]

**〈*RAS*遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉**

**7.5** オキサリプラチン及びフッ化ピリミジン系薬剤を含む化学療法が無効となった患者に対するイリノテカン塩酸塩水和物との併用において、本剤の上乗せによる延命効果は検証されていない。[17.1.1-17.1.5参照]

**7.6** 本剤と放射線療法との併用における有効性及び安全性は確立していない。

**〈頭頸部癌〉**

**7.7** 本剤は、放射線療法又は他の抗悪性腫瘍剤と併用すること。[17.1.6-17.1.9参照]

**7.8** 2週間間隔投与の場合、放射線療法との併用における有効性及び安全性は確立していない。

## 8. 重要な基本的注意

**8.1** 本剤の投与は、重度のinfusion reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行った上で開始すること。2回目以降の本剤投与時に初めて重度のinfusion reactionを発現することもあるので、本剤投与中は毎回患者の状態に十分に注意すること。本剤投与中及び本剤投与終了後少なくとも1時間は観察期間（バイタルサインをモニターするなど）を設けること。[1.2、7.1、7.2、8.2、11.1.1参照]

**8.2** 抗ヒスタミン剤の前投薬を行った患者においても、重度のinfusion reactionが発現したとの報告があるので、患者の状態を十分に観察すること。[1.2、7.1、7.2、8.1、11.1.1参照]

**8.3** 低マグネシウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症が発現することが報告されている。また、心不全等の心臓障害の発現も報告されているので、治療開始前、治療中及び治療終了後は血清中電解質（マグネシウム、カリウム及びカルシウム）をモニタリングすること。[11.1.5参照]

**8.4** 本剤は、セルバンク調製工程においてウシ血清由来のリポたん白質を使用している。このウシ血清由来成分は、厳重な食餌管理下で飼育され、米国農務省により健康であると確認された米国産ウシ由来であり、伝達性海綿状脳症（TSE）回避のための欧州連合（EU）基準に適合している。ただし、本剤にはリポたん白質は含まれていない。他の医薬品と同様に、本剤の投与によりTSEがヒトに伝播したとの報告はない。このことから、本剤によるTSE伝播のリスクは極めて低いものと考えられるが、理論的リスクは完全には否定し得ないため、その旨を患者に説明することを考慮すること。[3.1参照]

**8.5** 重度の皮膚症状があらわれることがあるので、必要に応じて皮膚科を受診するよう患者に指導すること。[7.3、11.1.2参照]

**8.6** 本剤の使用にあたっては、本剤と一般名が類似しているセツキシマブ サロタロカンナトリウム（遺伝子組換え）との取り違えに注意すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1.1 間質性肺疾患の既往歴のある患者

間質性肺疾患を増悪させるおそれがある。[11.1.3参照]

#### 9.1.2 心疾患のある患者又はその既往歴のある患者

本剤による治療を開始するにあたっては、患者の冠動脈疾患、うっ血性心不全及び不整脈等の既往歴に注意すること。心疾患を増悪させるおそれがある。また、本剤と放射線療法を併用した頭頸部扁平上皮癌患者に対する海外臨床試験において、心肺停止及び突然死が報告されている。[11.1.4参照]

### 9.4 生殖能を有する者

妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中、適切な避妊法を用いるように指導すること。[9.5参照]

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。サルの胚・胎児発生への影響に関する試験において、流産及び胎児死亡の発現頻度の上昇がみられた。[9.4参照]

### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒトIgG$_1$はヒト乳汁中に排出される。

### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 9.8 高齢者

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に高齢者では生理機能が低下している。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 重度のinfusion reaction（0.8%）

気管支痙攣、蕁麻疹、低血圧、意識消失又はショックを症状としたアナフィラキシー様症状があらわれることがある。infusion reactionを発現した場合には、全ての徴候及び症状が完全に回復するまで患者を十分に観察すること。なお、本剤によるアナフィラキシーの発生機序の一つとして、本剤に含まれるGalactose-*α*-1,3-galactose（*α*-gal）に対するIgE抗体を介した機序が報告されている。赤肉（牛肉等）に対するアレルギー歴やマダニ咬傷歴のある患者では、*α*-galに対するIgE抗体が検出されることが報告されている。そのうち、牛肉に対するアレルギー歴のある患者で、本剤によるアナフィラキシーが認められたとの報告がある[1)-3)]。[1.2、7.1、7.2、8.1、8.2参照]

#### 11.1.2 重度の皮膚症状（18.8%）

主にざ瘡様皮疹、皮膚の乾燥及び亀裂、続発する炎症性及び感染性の症状（眼瞼炎、口唇炎、蜂巣炎、嚢胞）等があらわれることがある。重度の皮膚症状（主にざ瘡様皮疹）発現後に、切開排膿を要する膿瘍、壊死性筋膜炎や黄色ブドウ球菌敗血症等を合併した例が報告されている。重度の皮膚症状が認められた場合には、本剤の投与量を調節するとともに、続発する炎症性又は感染性の症状の発現に十分注意し、これらの症状に対する適切な治療を行うこと。[7.3、8.5参照]

#### 11.1.3 間質性肺疾患（0.2%）

咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状や発熱が急激にあらわれた場合、あるいは胸部X線等の検査で異常が認められた場合など、間質性肺疾患が疑われた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤投与等の適切な処置を行うこと。[9.1.1参照]

#### 11.1.4 心不全（頻度不明）

[9.1.2参照]

#### 11.1.5 低マグネシウム血症（8.2%）

QT延長、痙攣、しびれ、全身倦怠感等を伴う低マグネシウム血症があらわれることがある。なお、低マグネシウム血症に起因した、低カルシウム血症、低カリウム血症等の電解質異常を伴う場合には、特に症状が重篤化することがあるので注意すること。電解質異常が認められた場合には、必要に応じ電解質補充等の適切な処置を行うこと。[8.3参照]

**11.1.6 重度の下痢**（2.2%）

重度の下痢及び脱水があらわれることがあり、腎不全に至った症例も報告されている。これらの症状があらわれた場合には、止瀉薬（ロペラミド等）の投与、補液等の適切な処置を行うこと。

**11.1.7 血栓塞栓症**（1.2%）

深部静脈血栓症、肺塞栓症等があらわれることがある。

**11.1.8 感染症**（4.4%）

肺炎、敗血症等の重度の感染症があらわれることがある。

**11.2 その他の副作用**

| | 10%以上 | 0.5～10%未満 | 0.5%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 全身症状 | 疲労、無力症 | 発熱、体重減少、粘膜の炎症、悪寒、疼痛（皮膚・筋肉等）、浮腫、倦怠感 | | $PO_2$低下 |
| 消化器 | 悪心、口内炎 | 食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛、消化不良 | 歯槽出血、吐血 | 下痢 |
| 血液／リンパ系 | | 好中球減少症、白血球減少症、血小板減少症、リンパ球減少症、ヘモグロビン減少、好中球増加症、白血球増加症 | | |
| 心・血管系 | | | 心筋梗塞 | |
| 代謝／栄養 | | 低カルシウム血症、低アルブミン血症、低カリウム血症、脱水、低ナトリウム血症、低リン酸血症、総蛋白減少 | 血中アミラーゼ増加 | |
| 肝臓 | | ALT上昇、AST上昇、Al-P上昇 | 血中ビリルビン増加 | |
| 精神・神経系 | | 頭痛、不眠症、末梢神経障害 | | |
| 呼吸器 | | 鼻出血、呼吸困難、咳嗽 | 喀血 | |
| 皮膚／皮膚付属器 | 発疹（45.0%）、ざ瘡/ざ瘡様皮膚炎（44.5%）、皮膚乾燥、爪囲炎、そう痒症、皮膚亀裂 | 爪の障害、脱毛症、皮膚毒性、手足症候群、多毛症、口唇炎、蕁麻疹、皮膚反応、毛髪障害 | 剥脱性皮膚炎 | 皮膚障害 |
| 眼[注1)] | | 結膜炎、眼瞼炎 | 角膜炎 | |
| その他 | | 過敏症、尿蛋白 | C-反応性蛋白増加、尿中ウロビリン陽性、血尿、尿中血陽性、卵巣嚢胞破裂 | 放射線性皮膚炎[注2)]、遅発性放射線障害[注2)] |

発現頻度は国内外臨床試験（EMR62202-049、EMR62241-053、EMR62241-056、EMR62202-002、EMR62202-006及びEMR62202-013）計6試験の結果に基づき算出した。

注1）眼の異常があらわれた場合には、直ちに眼科的検査を行い、必要な処置を行うこと。

注2）放射線療法との併用時における発現頻度

**14. 適用上の注意**

**14.1 薬剤調製時の注意**

**14.1.1** 本剤の投与時には必要量を注射筒で抜き取り、点滴バッグ等を用い日局生理食塩液で希釈してあるいは希釈せずに投与すること。

**14.1.2** 他の薬剤との混注はしないこと。

**14.1.3** 本剤は、振とうしないこと。

**14.2 薬剤投与時の注意**

**14.2.1** 投与終了後は、本剤と同じ投与速度でラインを日局生理食塩液にてフラッシュすること。

**14.2.2** 開封後は速やかに使用すること。

**16. 薬物動態**

**16.1 血中濃度**

**16.1.1 単回投与**

固形癌患者にセツキシマブを投与量100～500mg/m$^2$で点滴静注[注1)]した時の血清中濃度推移を図1に、また、薬物動態パラメータを表1に示す。最高血清中濃度（$C_{max}$）の平均値は49～396.7μg/mL、また、血清中濃度曲線下面積（AUC）の平均値は3469～34817μg・h/mLで、投与量と$C_{max}$又はAUCとの間に線形性が認められた。消失相半減期（$t_{1/2}$）の平均値は53.9～111.4時間であった。クリアランス（CL）の平均値は0.014～0.029L/h/m$^2$で、100～250mg/m$^2$の用量範囲でCL値は投与量とともに減少し、250mg/m$^2$以上ではCL値は安定していた。定常状態における分布容積（$V_{ss}$）と投与量との間に明らかな傾向は認められなかった。





図1　固形癌患者にセツキシマブを投与量100～500mg/m$^2$で点滴静注した時の血清中濃度推移

表1　固形癌患者にセツキシマブを投与量100～500mg/m$^2$で点滴静注した時の薬物動態パラメータ

| 投与量 | 100mg/m$^2$ (n=6) | 250mg/m$^2$ (n=6) | 400mg/m$^2$ (n=6) | 500mg/m$^2$ (n=6) | 400/250mg/m$^2$ (n=6)[c] |
|---|---|---|---|---|---|
| $C_{max}$（μg/mL）[a] | 49 (8.5) | 157 (31.9) | 287.2 (37.9) | 396.7 (83.6) | 297.8 (30.5) |
| AUC（INF）（μg・h/mL）[a] | 3469 (583) | 12132 (2300) | 25823 (6525) | 34817 (11498) | 29213 (6431) |
| $t_{1/2}$（hr）[a] | 53.9 (16.8) | 74.3 (12.3) | 101 (31) | 111.4 (19.2) | 106 (23.7) |
| $T_{max}$（hr）[b] | 3.0 (1.9, 8.0) | 2.5 (2.0, 3.0) | 2.75 (2.0, 8.0) | 2.5 (2.0, 6.0) | 2.5 (2.0, 3.0) |
| CL（L/h/m$^2$）[a] | 0.029 (0.005) | 0.021 (0.004) | 0.016 (0.005) | 0.017 (0.009) | 0.014 (0.003) |
| MRT（h）[a] | 77.7 (24.9) | 115.5 (14.9) | 136.1 (33.2) | 147.3 (36.6) | 148.9 (32.6) |
| $V_{ss}$（L/m$^2$）[a] | 2.22 (0.47) | 2.42 (0.37) | 2.14 (0.38) | 2.22 (0.44) | 2.08 (0.4) |

a：算術平均値（標準偏差）

b：中央値（最小値, 最大値）

c：初回投与量400mg/m$^2$で点滴静注した時の薬物動態パラメータ値を示す。

注1）本剤の承認された用法及び用量は、以下のとおりである。

1週間間隔投与の場合：

通常、成人には、セツキシマブ（遺伝子組換え）として、初回は400mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて、2回目以降は250mg/m$^2$（体表面積）を1時間かけて1週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。

2週間間隔投与の場合：

通常、成人には、セツキシマブ（遺伝子組換え）として、500mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて2週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。

**16.1.2 反復投与**

固形癌患者を対象とし、400mg/m$^2$の初回投与に続き、7日後から250mg/m$^2$の週1回反復投与[注2)]を行い、また、250、400及び500mg/m$^2$の初回投与に続き、14日後から250mg/m$^2$の週1回反復投与を行った結果、9週目の平均トラフ濃度（$C_{min}$）は83～114μg/mLの範囲であった[4)]。

注2）本剤の承認された用法及び用量は、以下のとおりである。

1週間間隔投与の場合：

通常、成人には、セツキシマブ（遺伝子組換え）として、初回は400mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて、2回目以降は250mg/m$^2$（体

表面積）を1時間かけて1週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。
2週間間隔投与の場合：
通常、成人には、セツキシマブ（遺伝子組換え）として、500mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて2週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。

### 16.1.3 母集団薬物動態解析

母集団薬物動態解析を実施し、体表面積、年齢、性別、人種、肝機能及び腎機能の要因がセツキシマブの薬物動態に及ぼす影響を評価した。その結果、体表面積が1.3から2.3m$^2$に増加するとCL値は1.8倍増加した。女性患者のCL値は男性患者より25%低かったが、臨床試験で安全性に男女差が観察されていないことから、性別に基づく用量調節の必要はないと考えられた。他の要因がセツキシマブの薬物動態に及ぼす影響は認められなかった[5]（外国人データ）。

### 16.7 薬物相互作用

セツキシマブとイリノテカン塩酸塩水和物の併用投与試験を行った結果、両者の間に薬物動態学的相互作用は認められなかった[6]（外国人データ）。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 〈*RAS*遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉

#### 17.1.1 国内第Ⅱ相臨床試験（EMR62202-049/CA225-259）

イリノテカン塩酸塩水和物を含む化学療法に不応となり、フッ化ピリミジン系薬剤及びオキサリプラチンに不応もしくは耐容不能となったEGFR発現が確認された結腸・直腸癌患者（39例）に、本剤とイリノテカン塩酸塩水和物（毎週投与法又は2週間間隔投与法）を併用投与した結果、奏効率は30.8%（95%信頼区間：17.0, 47.6）であった[7]。

安全性評価症例39例中、主な副作用は、ざ瘡（87.2%）、発疹（61.5%）、食欲不振（56.4%）、皮膚乾燥（51.3%）、爪囲炎（51.3%）、下痢（51.3%）、口内炎（51.3%）、低マグネシウム血症（51.3%）、そう痒症（43.6%）、悪心（43.6%）、疲労（43.6%）、リンパ球数減少（30.8%）であった。［7.5参照］

#### 17.1.2 海外第Ⅲ相臨床試験（EMR62202-013）

化学療法の前治療歴のないEGFR発現が確認された結腸・直腸癌患者を対象とした本剤と5-FU・ホリナートカルシウム・イリノテカン塩酸塩水和物療法（FOLFIRI）併用[注1)]及びFOLFIRIを比較した第Ⅲ相試験の成績は次のとおりである。また、レトロスペクティブに*KRAS*遺伝子変異[注2)]の有無によって層別した成績は次のとおりである（評価可能例：1063例）[8)-10)]。

| 対象 | 全症例（1198例） | | *KRAS*野生型（666例） | | *KRAS*変異型（397例） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本剤及びFOLFIRI併用（599例） | FOLFIRI（599例） | 本剤及びFOLFIRI併用（316例） | FOLFIRI（350例） | 本剤及びFOLFIRI併用（214例） | FOLFIRI（183例） |
| 無増悪生存期間中央値（95%信頼区間） | 8.9ヵ月（8.0, 9.5） | 8.0ヵ月（7.6, 9.0） | 9.9ヵ月（9.0, 11.3） | 8.4ヵ月（7.4, 9.2） | 7.4ヵ月（6.1, 8.0） | 7.7ヵ月（7.3, 9.2） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.851（0.726, 0.998） | | 0.696（0.558, 0.867） | | 1.171（0.887, 1.544） | |
| P値 | 0.0479 | | 0.0012 | | 0.2648 | |
| 生存期間中央値（95%信頼区間） | 19.9ヵ月（18.5, 21.3） | 18.6ヵ月（16.6, 19.8） | 23.5ヵ月（21.2, 26.3） | 20.0ヵ月（17.4, 21.7） | 16.2ヵ月（14.9, 17.9） | 16.7ヵ月（14.9, 19.4） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.878（0.774, 0.995） | | 0.796（0.670, 0.946） | | 1.035（0.834, 1.284） | |
| P値 | 0.0419 | | 0.0093 | | 0.7549 | |

注1）FOLFIRIは以下のスケジュールで投与
イリノテカン塩酸塩水和物を180mg/m$^2$、5-FUを400mg/m$^2$（急速静脈内投与法）、2400mg/m$^2$（46時間持続静脈内投与法）及びレボホリナートカルシウム200mg/m$^2$又はホリナートカルシウム400mg/m$^2$を2週間間隔で投与する。

注2）*KRAS*遺伝子コドン12及び13が検討された。

レトロスペクティブに*RAS*（*KRAS*又は*NRAS*）遺伝子変異[注3)]の有無によって層別した成績は次のとおりである（評価可能例：827例）。

| 対象 | *RAS*野生型（367例） | | *RAS*変異型（460例） | |
|---|---|---|---|---|
| | 本剤及びFOLFIRI併用（178例） | FOLFIRI（189例） | 本剤及びFOLFIRI併用（246例） | FOLFIRI（214例） |
| 無増悪生存期間中央値（95%信頼区間） | 11.4ヵ月（10.0, 14.6） | 8.4ヵ月（7.4, 9.4） | 7.4ヵ月（6.4, 8.0） | 7.5ヵ月（7.2, 8.5） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.56（0.41, 0.76） | | 1.10（0.85, 1.42） | |
| P値 | 0.0002 | | 0.4696 | |
| 生存期間中央値（95%信頼区間） | 28.4ヵ月（24.7, 31.6） | 20.2ヵ月（17.0, 24.5） | 16.4ヵ月（14.9, 18.4） | 17.7ヵ月（15.4, 19.6） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.69（0.54, 0.88） | | 1.05（0.86, 1.28） | |
| P値 | 0.0024 | | 0.6355 | |

注3）*KRAS*遺伝子コドン12、13、59、61、117、146及び*NRAS*遺伝子コドン12、13、59、61、117、146の変異が検討された。

安全性評価症例600例中、主な副作用（30%以上に発現）は、下痢、悪心、好中球減少症、脱毛症、嘔吐及び発疹であった。［7.5参照］

#### 17.1.3 海外第Ⅲ相臨床試験（NCIC CTG CO.17/CA225-025）

フッ化ピリミジン系薬剤の治療歴があり、イリノテカン塩酸塩水和物を含む化学療法及びオキサリプラチンを含む化学療法で無効となった又は適応とならないEGFR発現が確認された結腸・直腸癌患者を対象とした本剤とBest supportive care（BSC）及びBSCのみを比較した第Ⅲ相試験の成績は次のとおりである。また、レトロスペクティブに*KRAS*遺伝子変異[注2)]の有無によって層別した成績は次のとおりである（評価可能例：394例）[11)]。

| 対象 | 全症例（572例） | | *KRAS*野生型（230例） | | *KRAS*変異型（164例） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本剤及びBSC併用（287例） | BSC（285例） | 本剤及びBSC併用（117例） | BSC（113例） | 本剤及びBSC併用（81例） | BSC（83例） |
| 無増悪生存期間中央値（95%信頼区間） | 1.9ヵ月（1.8, 2.1） | 1.8ヵ月（1.8, 1.9） | 3.7ヵ月（3.1, 5.1） | 1.9ヵ月（1.8, 2.0） | 1.8ヵ月（1.7, 1.8） | 1.8ヵ月（1.7, 1.8） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.676（0.568, 0.804） | | 0.401（0.299, 0.536） | | 1.002（0.732, 1.371） | |
| P値 | <0.0001 | | <0.0001 | | 0.9895 | |
| 生存期間中央値（95%信頼区間） | 6.1ヵ月（5.4, 6.7） | 4.6ヵ月（4.2, 4.9） | 9.5ヵ月（7.7, 10.3） | 4.8ヵ月（4.2, 5.5） | 4.5ヵ月（3.8, 5.6） | 4.6ヵ月（3.6, 5.5） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.766（0.637, 0.921） | | 0.552（0.408, 0.748） | | 0.990（0.705, 1.389） | |
| P値 | 0.0046 | | <0.0001 | | 0.9522 | |

安全性評価症例288例中、主な副作用は、発疹／落屑（86.1%）、皮膚乾燥（41.7%）、疲労（37.8%）、そう痒症（37.2%）、悪心（26.0%）、皮膚-その他（21.5%）であった。［7.5参照］

#### 17.1.4 海外第Ⅲ相臨床試験（EMR62202-025/CA225-006）

イリノテカン塩酸塩水和物の治療歴がなく、オキサリプラチン及びフッ化ピリミジン系薬剤を含む化学療法が無効となったEGFR発現が確認された結腸・直腸癌患者を対象とした本剤とイリノテカン塩酸塩水和物併用[注4)]及びイリノテカン塩酸塩水和物単独[注5)]を比較した試験の成績は次のとおりである。また、レトロスペクティブに*KRAS*遺伝子変異[注2)]の有無によって層別した成績は次のとおりである（評価可能例：300例）[12)]。

| 対象 | 全症例（1298例） | | *KRAS*野生型（192例） | | *KRAS*変異型（108例） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本剤及びイリノテカン塩酸塩水和物併用（648例） | イリノテカン塩酸塩水和物単独（650例） | 本剤及びイリノテカン塩酸塩水和物併用（97例） | イリノテカン塩酸塩水和物単独（95例） | 本剤及びイリノテカン塩酸塩水和物併用（49例） | イリノテカン塩酸塩水和物単独（59例） |
| 無増悪生存期間中央値（95%信頼区間） | 3.98ヵ月（3.15, 4.14） | 2.56ヵ月（2.14, 2.69） | 3.98ヵ月（2.79, 5.36） | 2.79ヵ月（2.37, 3.25） | 2.60ヵ月（1.54, 3.58） | 2.69ヵ月（1.51, 2.79） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.692（0.617, 0.776） | | 0.773（0.572, 1.044） | | 0.996（0.668, 1.485） | |
| P値 | <0.0001 | | 0.0954 | | 0.9853 | |
| 生存期間中央値（95%信頼区間） | 10.71ヵ月（9.59, 11.30） | 9.99ヵ月（9.13, 11.33） | 10.94ヵ月（7.79, 13.24） | 11.56ヵ月（9.46, 18.63） | 8.41ヵ月（6.14, 11.01） | 10.68ヵ月（8.41, 13.96） |
| ハザード比（95%信頼区間） | 0.975（0.854, 1.114） | | 1.285（0.894, 1.846） | | 1.277（0.813, 2.005） | |
| P値 | 0.7115 | | 0.1755 | | 0.2874 | |

注4）イリノテカン塩酸塩水和物は、前治療（イリノテカン塩酸塩水和物を含む化学療法）と同じスケジュールを選択
イリノテカン塩酸塩水和物の用法・用量[注6]：350mg/m$^2$を3週間間隔で投与、180mg/m$^2$を2週間間隔で投与、又は125mg/m$^2$を1週間間隔で4回投与し、その後3週間休薬

注5）イリノテカン塩酸塩水和物の用法・用量[注6]：350mg/m$^2$（3週間間隔）

注6）イリノテカン塩酸塩水和物の結腸・直腸癌（手術不能または再発）における国内承認用法・用量：
A法：イリノテカン塩酸塩水和物として、通常、成人に1日1回、100mg/m$^2$を1週間間隔で3～4回点滴静注し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。
B法：イリノテカン塩酸塩水和物として、通常、成人に1日1回、150mg/m$^2$を2週間間隔で2～3回点滴静注し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。なお、年齢、症状により適宜増減する。

安全性評価症例638例中、主な副作用は、下痢（4.7%）、嘔吐（2.5%）、発熱性好中球減少症（2.0%）、好中球減少症（1.4%）、過敏症（1.4%）、発熱（1.3%）、悪心（1.3%）であった。[7.5参照]

#### 17.1.5 海外第Ⅱ相臨床試験（EMR62202-007）

イリノテカン塩酸塩水和物を含む化学療法に不応となったEGFR発現が確認された結腸・直腸癌患者を対象とした本剤とイリノテカン塩酸塩水和物併用[注4]及び本剤単独投与を比較した第Ⅱ相試験の成績は次のとおりである[13]。

| | 本剤及びイリノテカン塩酸塩水和物併用（218例） | 本剤単独（111例） | P値 | ハザード比 |
|---|---|---|---|---|
| 奏効率（95%信頼区間） | 22.9%（17.5, 29.1） | 10.8%（5.7, 18.1） | 0.0074 | — |
| 無増悪生存期間中央値（95%信頼区間） | 4.1ヵ月（2.8, 4.3） | 1.5ヵ月（1.4, 2.0） | <0.0001 | 0.54（0.42, 0.71） |
| 生存期間中央値（95%信頼区間） | 8.6ヵ月（7.6, 9.6） | 6.9ヵ月（5.6, 9.1） | 0.48 | 0.91（0.68, 1.21） |

安全性評価症例212例中、主な副作用は、下痢（71.2%）、無力症（59.9%）、発疹（57.1%）、悪心（50.5%）、嘔吐（31.1%）、口内炎（31.1%）、皮膚乾燥（30.2%）、ざ瘡（28.3%）、発熱（23.1%）、食欲不振（22.6%）、脱毛症（22.6%）及び白血球減少症（20.3%）であった。[7.5参照]

**〈頭頸部癌〉**

#### 17.1.6 国内第Ⅱ相臨床試験（EMR62241-053試験）

局所進行の頭頸部扁平上皮癌（ステージⅢ又はⅣ）（上咽頭癌、口腔癌を除く）患者（22例）に、本剤投与と放射線療法（同時追加照射法）を併用した結果、奏効率は81.8%（95%信頼区間：59.7, 94.8）であった[14]。

安全性評価症例22例中、主な副作用は、皮膚乾燥（68.2%）、ざ瘡（63.6%）、粘膜の炎症（50.0%）、そう痒症（40.9%）、ざ瘡様皮膚炎（36.4%）であった。[7.7参照]

#### 17.1.7 国内第Ⅱ相臨床試験（EMR62241-056試験）

再発又は転移を有する頭頸部扁平上皮癌（上咽頭癌を除く）患者（33例）に、本剤とシスプラチン及びフルオロウラシル（5-FU）を併用投与した結果、奏効率は36.4%（95%信頼区間：20.4, 54.9）であった[15]。

安全性評価症例33例中、主な副作用は、低マグネシウム血症（75.8%）、皮膚乾燥（66.7%）、ざ瘡（63.6%）、爪囲炎（57.6%）、口内炎（42.4%）、そう痒症（30.3%）であった。[7.7参照]

#### 17.1.8 海外第Ⅲ相試験（EMR62202-006/IMCL CP02-9815）

局所進行性の頭頸部扁平上皮癌（ステージⅢ又はⅣ）（上咽頭癌、口腔癌を除く）患者を対象とした本剤と放射線療法[注7]併用及び放射線療法単独を比較した試験の成績は次のとおりである[16]。

| | 本剤及び放射線療法併用（211例） | 放射線療法単独（213例） | P値 | オッズ比（OR）又はハザード比（HR） |
|---|---|---|---|---|
| 局所コントロール中央値（95%信頼区間） | 24.4ヵ月（15.7, 45.1） | 14.9ヵ月（11.8, 19.9） | 0.005 | HR=0.680（0.520, 0.890） |
| 生存期間中央値（95%信頼区間） | 49.0ヵ月（32.8, NE） | 29.3ヵ月（20.6, 41.4） | 0.018 | HR=0.725（0.556, 0.946） |

注7）1日1回照射法、1日2回照射法、又は同時追加照射法を用い、本剤初回投与の翌週より6～7週間かけて実施。本剤の投与は放射線治療の終了まで継続。

安全性評価症例208例中、主な副作用は、ざ瘡（61.5%）、発疹（24.5%）、悪心（23.6%）、無力症（23.1%）、粘膜障害（18.3%）、発熱及び放射線皮膚損傷（各15.4%）、皮膚乾燥（14.9%）、嚥下障害及びそう痒症（各13.9%）、体重減少（13.0%）、頭痛（12.0%）、嘔吐（10.6%）、白血球減少症及び悪寒（各10.1%）であった。[7.7参照]

#### 17.1.9 海外第Ⅲ相試験（EMR62202-002）

再発又は転移性の頭頸部扁平上皮癌（上咽頭癌を除く）患者を対象とした本剤と化学療法（白金製剤及び5-FU）[注8]併用及び化学療法単独を比較した試験の成績は次のとおりである[17]。

| | 本剤及び化学療法併用（222例） | 化学療法単独（220例） | P値 | オッズ比（OR）又はハザード比（HR） |
|---|---|---|---|---|
| 生存期間中央値（95%信頼区間） | 10.1ヵ月（8.6, 11.2） | 7.4ヵ月（6.4, 8.3） | 0.036 | HR=0.797（0.644, 0.986） |

注8）3週間を1クールとし、白金製剤（シスプラチン100mg/m$^2$又はカルボプラチンAUC5）を1日目に投与、また5-FU1000mg/m$^2$/日を1～4日目にかけて持続投与。シスプラチンに対する毒性が発現した場合にはカルボプラチンに変更しAUC5で投与を継続。化学療法は最大6クールとし、本剤の投与は化学療法中止後も病勢進行が認められるまで継続。

安全性評価症例219例中、主な副作用は、発疹（26.9%）、ざ瘡（21.9%）、ざ瘡様皮膚炎（14.6%）、皮膚乾燥（12.8%）、悪心（11.9%）、粘膜の炎症（10.5%）、無力症（10.0%）であった。[7.7参照]

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

セツキシマブはヒトIgG$_1$の定常領域とマウス抗体の可変領域からなるキメラ型モノクローナル抗体であり、EGFR発現細胞のEGFRに対して高い親和性で結合する[18]。

### 18.2 抗腫瘍作用

多様なEGFR陽性癌細胞株において、セツキシマブの*in vitro*増殖阻害作用は濃度依存的であった[19)-22)]。また、セツキシマブの増殖阻害作用は多様なEGFR陽性癌細胞株（ヒト結腸癌由来GEO細胞株、ヒト咽頭癌由来FaDu細胞株等）を用いた*in vivo*モデルにおいても確認されている[23), 24)]。

**19. 有効成分に関する理化学的知見**

一般名：セツキシマブ（遺伝子組換え）
Cetuximab（genetical recombination）

本　質：マウス抗ヒト上皮細胞増殖因子受容体モノクローナル抗体の可変部及びヒト$IgG_1$定常部からなるヒト／マウスキメラ型モノクローナル抗体をコードするcDNAの導入によりマウスハイブリドーマSP2/0-Ag14細胞株で産生される214個のアミノ酸残基（$C_{1025}H_{1595}N_{281}O_{338}S_5$；分子量：23,422.64）からなる軽鎖2分子と449個のアミノ酸残基（$C_{2208}H_{3400}N_{582}O_{674}S_{15}$；分子量：49,363.09）からなる重鎖2分子からなる糖たん白質（分子量：約151,800）

**＊22. 包装**

20mL：1バイアル（ガラスバイアル）
100mL：1バイアル（ガラスバイアル）

**23. 主要文献**


1）Chung CH, et al.：N Engl J Med. 2008；358（11）：1109-17.
2）Commins SP, et al.：J Allergy Clin Immunol. 2009；123（2）：426-33.
3）Commins SP, et al.：J Allergy Clin Immunol. 2011；127（5）：1286-93.
4）社内資料：国内第Ⅰ相臨床試験（薬物動態）（2008年7月承認、CTD 2.7.6.2.12）
5）社内資料：母集団薬物動態解析（2008年7月承認、CTD 2.7.2.5.3、CTD 5.3.3.5-1）
6）Delbaldo C, et al.：Eur J Cancer. 2005 Aug；41（12）：1739-45.
7）Tahara M, et al.：Jpn J Clin Oncol. 2008 Nov；38（11）：762-9
8）社内資料：海外第Ⅲ相無作為化比較試験（化学療法の前治療歴のない結腸・直腸癌を対象としたフルオロウラシル・ホリナートカルシウム・イリノテカン塩酸塩との併用）EMR62202-013試験
9）Van Cutsem E, et al.：J Clin Oncol. 2011 May 20；29（15）：2011-9.
10）Van Cutsem E, et al.：J Clin Oncol. 2015 Mar 1；33（7）：692-700.
11）社内資料：海外第Ⅲ相無作為化比較試験（化学療法の前治療歴のある結腸・直腸癌を対象とした単独投与）（2008年7月承認、CTD 2.7.6-2.36）NCIC CTG CO.17/CA225-025試験
12）Sobrero AF, et al.：J Clin Oncol. 2008 May 10；26（14）：2311-9.
13）社内資料：海外第Ⅱ相無作為化比較試験（化学療法の前治療歴のある結腸・直腸癌を対象としたイリノテカン塩酸塩水和物との併用と単独投与の比較（2008年7月承認、CTD 2.7.6-2.1）EMR62202-007試験
14）Okano S, et al.：Jpn J Clin Oncol. 2013 May；43（5）：476-82.
15）Yoshino T, et al.：Jpn J Clin Oncol. 2013 May；43（5）：524-31.
16）社内資料：海外第Ⅲ相無作為化比較試験（局所進行性の頭頸部扁平上皮癌を対象とした放射線療法との併用）（2012年12月承認、CTD 2.7.6.2.2）EMR62202-006/IMCL CP02-9815試験
17）Vermorken JB, et al.：N Engl J Med 2008；359：1116-27
18）Sunada H, et al.：Proc Natl Acad Sci USA. 1986 Jun；83（11）：3825-9.
19）Fan Z, et al.：J Biol Chem. 1994 Nov 4；269（44）：27595-602.
20）Ciardiello F, et al.：J Natl Cancer Inst. 1998；90（14）：1087-94.
21）Morelli MP, et al.：J Cell Physiol. 2006；208（2）：344-53.
22）社内資料：抗腫瘍作用（2008年7月承認、CTD 2.6.2.2.2）
23）Luo FR, et al.：Clin Cancer Res. 2005 Aug 1；11（15）：5558-65.
24）社内資料：抗腫瘍作用（2008年7月承認、CTD 2.6.2.2.2）


**＊＊24. 文献請求先及び問い合わせ先**


メルクバイオファーマ株式会社
メディカル・インフォメーション
東京都港区麻布台一丁目3番1号
0120-870-088


**＊＊26. 製造販売業者等**

**26.1 製造販売元**


MERCK　メルクバイオファーマ株式会社
東京都港区麻布台一丁目3番1号

2023年8月改訂（第1版）

| 日本標準商品分類番号 |
|---|
| 87424 |

抗悪性腫瘍剤

# 日本薬局方　イリノテカン塩酸塩注射液

劇薬、処方箋医薬品注）

# トポテシン®点滴静注40mg
# トポテシン®点滴静注100mg

TOPOTECIN® Intravenous Drip Infusion 40mg・100mg

**貯　　法**：室温保存
**有効期間**：3年

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

| | 点滴静注40mg | 点滴静注100mg |
|---|---|---|
| 承認番号 | 22100AMX01292 | 22100AMX01293 |
| 販売開始 | 1994年4月 | |

## 1．警告

1.1 本剤使用にあたっては、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与を開始すること。

1.2 本剤の臨床試験において、骨髄機能抑制あるいは下痢に起因したと考えられる死亡例が認められている。本剤の投与は、緊急時に十分に措置できる医療施設及びがん化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与し、下記の患者には投与しないなど適応患者の選択を慎重に行うこと。[2.1－2.9、10.1 参照]

・骨髄機能抑制のある患者
・感染症を合併している患者
・下痢（水様便）のある患者
・腸管麻痺、腸閉塞のある患者
・間質性肺炎又は肺線維症の患者
・多量の腹水、胸水のある患者
・黄疸のある患者
・アタザナビル硫酸塩を投与中の患者
・本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

1.3 本剤を含む小児悪性固形腫瘍に対するがん化学療法は、小児のがん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで実施すること。

1.4 投与に際しては、骨髄機能抑制、高度な下痢等の重篤な副作用が起こることがあり、ときに致命的な経過をたどることがあるので、頻回に臨床検査（血液検査、肝機能検査、腎機能検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[8.3、11.1.1、11.1.2 参照]

1.5 骨髄機能抑制による致命的な副作用の発現を回避するために、特に以下の事項に十分注意すること。

1.5.1 投与予定日（投与前 24 時間以内）に末梢血液検査を必ず実施し、結果を確認してから、本剤投与の適否を慎重に判断すること。

1.5.2 投与予定日の白血球数が 3,000/mm$^3$ 未満又は血小板数が 10 万/mm$^3$ 未満（膵癌 FOLFIRINOX 法においては、2 クール目以降 7.5 万/mm$^3$ 未満）の場合には、本剤の投与を中止又は延期すること。[7.1、7.3 参照]

1.5.3 投与予定日の白血球数が 3,000/mm$^3$ 以上かつ血小板数が 10 万/mm$^3$ 以上（膵癌 FOLFIRINOX 法においては、2 クール目以降 7.5 万/mm$^3$ 以上）であっても、白血球数又は血小板数が急激な減少傾向にあるなど、骨髄機能抑制が疑われる場合には、本剤の投与を中止又は延期すること。[7.2 参照]

## 2．禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 骨髄機能抑制のある患者［骨髄機能抑制が増悪して重症感染症等を併発し、致命的となることがある。］[1.2 参照]

2.2 感染症を合併している患者［感染症が増悪し、致命的となることがある。］[1.2 参照]

2.3 下痢（水様便）のある患者［下痢が増悪して脱水、電解質異常、循環不全を起こし、致命的となることがある。］[1.2 参照]

2.4 腸管麻痺、腸閉塞のある患者［腸管からの排泄が遅れ、重篤な副作用が発現し、致命的となることがある。］[1.2 参照]

2.5 間質性肺炎又は肺線維症の患者［症状が増悪し、致命的となることがある。］[1.2 参照]

2.6 多量の腹水、胸水のある患者［重篤な副作用が発現し、致命的となることがある。］[1.2 参照]

2.7 黄疸のある患者［重篤な副作用が発現し、致命的となることがある。］[1.2 参照]

2.8 アタザナビル硫酸塩を投与中の患者[1.2、10.1 参照]

2.9 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者[1.2 参照]

## 3．組成・性状

### 3.1 組成

| 販売名 | 有効成分 | 添加剤 |
|---|---|---|
| トポテシン点滴静注40mg | 1バイアル（2mL）中イリノテカン塩酸塩水和物（日局）40mg | 1バイアル（2mL）中D-ソルビトール 90mg、乳酸、水酸化ナトリウム |
| トポテシン点滴静注100mg | 1バイアル（5mL）中イリノテカン塩酸塩水和物（日局）100mg | 1バイアル（5mL）中D-ソルビトール 225mg、乳酸、水酸化ナトリウム |

### 3.2 製剤の性状

| 販売名 | 性状 | pH | 浸透圧比 |
|---|---|---|---|
| トポテシン点滴静注40mg | 微黄色澄明の液 | 3.0～4.0 | 1.0～1.3（生理食塩液対比） |
| トポテシン点滴静注100mg | | | |

## 4．効能又は効果

○小細胞肺癌
○非小細胞肺癌
○子宮頸癌
○卵巣癌
○胃癌（手術不能又は再発）
○結腸・直腸癌（手術不能又は再発）
○乳癌（手術不能又は再発）
○有棘細胞癌
○悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）
○小児悪性固形腫瘍
○治癒切除不能な膵癌

## 5．効能又は効果に関連する注意

〈効能共通〉

5.1 本剤の術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈治癒切除不能な膵癌〉

5.2 患者の病期、全身状態、UGT1A1注）遺伝子多型等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.8、17.1.9 参照]

注）本剤の活性代謝物（SN-38）の主な代謝酵素の一分子種である。

## 6．用法及び用量

(1)

小細胞肺癌、非小細胞肺癌、乳癌（手術不能又は再発）及び有棘細胞癌はA法を、子宮頸癌、卵巣癌、胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌（手術不能又は再発）はA法又はB法を使用する。また、悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）はC法を、小児悪性固形腫瘍はD法を、治癒切除不能な膵癌はE法を使用する。

A法：

イリノテカン塩酸塩水和物として、通常、成人に1日1回、100mg/m$^2$を1週間間隔で3～4回点滴静注し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。

B法：

イリノテカン塩酸塩水和物として、通常、成人に1日1回、150mg/m$^2$を2週間間隔で2～3回点滴静注し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。

C法：

イリノテカン塩酸塩水和物として、通常、成人に1日1回、40mg/m$^2$を3日間連日点滴静注する。これを1週毎に2～3回繰り返し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。

なお、A～C法の投与量は、年齢、症状により適宜増減する。

D法：

イリノテカン塩酸塩水和物として、通常、1日1回、20mg/m$^2$を5日間連日点滴静注する。これを1週毎に2回繰り返し、少なくとも1週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。

E法：

イリノテカン塩酸塩水和物として、通常、成人に1日1回、180mg/m$^2$を点滴静注し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。

なお、D法及びE法の投与量は、患者の状態により適宜減量する。

(2)

A法、B法及びE法では、本剤投与時、投与量に応じて500mL以上の生理食塩液、ブドウ糖液又は電解質維持液に混和し、90分以上かけて点滴静注する。

C法では、本剤投与時、投与量に応じて250mL以上の生理食塩液、ブドウ糖液又は電解質維持液に混和し、60分以上かけて点滴静注する。

D法では、本剤投与時、投与量に応じて100mL以上の生理食塩液、ブドウ糖液又は電解質維持液に混和し、60分以上かけて点滴静注する。

## 7．用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

**7.1** 投与予定日の白血球数又は血小板数が次の投与可能条件に満たない場合は、本剤の投与を中止又は延期すること。[1.5.2、7.2 参照]

投与可能条件

| 種類 | 程度 |
|---|---|
| 白血球数 | 3,000/mm$^3$以上 |
| 血小板数 | 100,000/mm$^3$以上 |

**7.2** 投与可能条件を満たしていても、白血球数又は血小板数が急激な減少傾向にあるなど、骨髄機能抑制が疑われる場合には、本剤の投与を中止又は延期すること。また、白血球数が異常な高値を示す患者及びCRPが異常値を示すなど感染症が疑われる患者では、投与後に白血球の急激な減少が起こることがある。このような場合には、投与可能条件を満たしていても、骨髄機能の回復を十分に確認してから投与を行うこと。[1.5.3、7.1、7.3 参照]

〈治癒切除不能な膵癌〉

**7.3** オキサリプラチン、レボホリナート、フルオロウラシルとの併用療法（FOLFIRINOX法）を行う場合には、2クール目以降、次の投与可能条件、減量基準及び減量時の投与量を参考にすること。[1.5.2、7.2 参照]

2クール目以降の投与可能条件（投与予定日に確認し、当該条件を満たす状態へ回復するまで投与を延期するとともに、「減量基準」及び「減量時の投与量」を参考に、投与再開時に減量すること。）

| 種類 | 程度 |
|---|---|
| 好中球数 | 1,500/mm$^3$以上 |
| 血小板数 | 75,000/mm$^3$以上 |

減量基準

前回の投与後にいずれかの程度に該当する副作用が発現した場合は、該当する毎に、以下の減量方法に従って、投与レベルを1レベル減量する（「減量時の投与量」を参考にすること）。また、いずれかの程度に該当する好中球減少又は血小板減少が発現した場合は、以降のフルオロウラシル急速静脈内投与を中止する。

| 副作用[注1)] | 程度 | 減量方法 |
|---|---|---|
| 好中球減少 | 以下のいずれかの条件を満たす場合：<br>1）2クール目以降の投与可能条件を満たさず投与を延期<br>2）500/mm$^3$未満が7日以上持続<br>3）感染症又は下痢を併発し、かつ1,000/mm$^3$未満<br>4）発熱性好中球減少症 | 本剤を優先的に減量する。ただし、本剤の投与レベルがオキサリプラチンより低い場合は、本剤と同じレベルになるまでオキサリプラチンを減量する。 |
| 下痢 | 発熱（38℃以上）を伴う | |
| | グレード3[注2)]以上 | フルオロウラシル持続静注を減量する。 |
| 血小板減少 | 以下のいずれかの条件を満たす場合：<br>1）2クール目以降の投与可能条件を満たさず投与を延期<br>2）50,000/mm$^3$未満 | オキサリプラチンを優先的に減量する。ただし、オキサリプラチンの投与レベルが本剤より低い場合は、オキサリプラチンと同じレベルになるまで本剤を減量する。 |
| 総ビリルビン上昇 | 2.0mg/dL超<br>3.0mg/dL以下 | 本剤を120mg/m$^2$に減量する。 |
| | 3.0mg/dL超 | 本剤を90mg/m$^2$に減量する。 |
| 粘膜炎<br>手足症候群 | グレード3[注2)]以上 | フルオロウラシル持続静注を減量する。 |

注1）複数の副作用が発現した場合は、薬剤毎に減量が最大となる基準を適用すること。

注2）CTCAE version 4.0。

減量時の投与量（オキサリプラチン85mg/m$^2$、本剤180mg/m$^2$、フルオロウラシル持続静注2,400mg/m$^2$で投与を開始した場合）

| 投与レベル | オキサリプラチン | 本剤 | フルオロウラシル持続静注 |
|---|---|---|---|
| -1 | 65mg/m$^2$ | 150mg/m$^2$ | 1,800mg/m$^2$ |
| -2 | 50mg/m$^2$ | 120mg/m$^2$ | 1,200mg/m$^2$ |
| -3 | 中止 | 中止 | 中止 |

## 8．重要な基本的注意

〈効能共通〉

**8.1** 本剤はイリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤とは有効性、安全性、薬物動態が異なる。本剤をイリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤の代替として使用しないこと。また、本剤をイリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤と同様の用法及び用量で投与しないこと。

**8.2** 重篤な過敏反応があらわれることがあるので、観察を十分に行うこと。[11.1.5 参照]

**8.3** 骨髄機能抑制、高度な下痢等の重篤な副作用が起こることがあり、ときに致命的な経過をたどることがあるので、頻回に臨床検査（血液検査、肝機能検査、腎機能検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。投与後2週間は特に頻回に末梢血液検査を行うなど、極めて注意深く観察すること。また、使用が長期間にわたると副作用が強くあらわれ、遷延することがあるので、

投与は慎重に行うこと。[1.4、11.1.1、11.1.2、11.1.6、11.1.7 参照]

**8.4** 本剤の投与により排便回数の増加、水様便又は腹痛を伴うような場合は、継続投与により下痢が強く発現することがある。また、腹痛を有する患者に本剤を投与した場合、高度な下痢があらわれることがある。したがって、このような場合には症状の回復を待って投与を行うこと。[11.1.2 参照]

**8.5** 重症感染症、播種性血管内凝固症候群（DIC）、出血傾向、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、腸炎及び間質性肺炎の発現又は増悪に十分注意すること。[8.7、11.1.1－11.1.4 参照]

**8.6** 悪心・嘔吐、食欲不振等の消化器症状が高頻度にあらわれるので、観察を十分に行い、適切な処置を行うこと。

**8.7** 間質性肺炎があらわれることがあるので、定期的に検査を行うこと。[8.5、11.1.4 参照]

**8.8** 投与初期又は比較的低用量の投与でも副作用があらわれることがある。

**〈小児悪性固形腫瘍〉**

**8.9** 本剤を使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書：イリノテカン塩酸塩水和物（小児悪性固形腫瘍）」等）を熟読すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

**9.1.1 糖尿病の患者**

十分な管理を行いながら投与すること。高度な下痢の持続により脱水、電解質異常を起こして糖尿病が増悪し、致命的となるおそれがある。

**9.1.2 全身衰弱が著しい患者**

副作用が強く発現するおそれがある。

**9.1.3 遺伝性果糖不耐症の患者**

本剤の添加剤 D-ソルビトールが体内で代謝されて生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発されるおそれがある。

**9.1.4 グルクロン酸抱合異常の患者**

Gilbert 症候群のようなグルクロン酸抱合異常の患者においては、本剤の代謝が遅延することにより骨髄機能抑制等の重篤な副作用が発現する可能性が高い。

**9.1.5 UGT1A1 遺伝子多型（*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*）について、いずれかをホモ接合体又はいずれもヘテロ接合体としてもつ患者**

本剤の活性代謝物（SN-38）の主な代謝酵素である UDP-グルクロン酸転移酵素（UDP-glucuronosyltransferase、UGT）の 2 つの遺伝子多型（*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*）について、いずれかをホモ接合体（*UGT1A1*6/*6*、*UGT1A1*28/*28*）又はいずれもヘテロ接合体（*UGT1A1*6/*28*）としてもつ患者では、UGT1A1 のグルクロン酸抱合能が低下し、SN-38 の代謝が遅延することにより、重篤な副作用（特に好中球減少）発現の可能性が高くなることが報告されているため、十分注意すること[1)-3)]。[16.4.1、17.3.1 参照]

### 9.2 腎機能障害患者

腎障害が悪化及び副作用が強く発現するおそれがある。

### 9.3 肝機能障害患者

肝障害が悪化及び副作用が強く発現するおそれがある。

### 9.4 生殖能を有する者

**9.4.1** 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。[9.5 参照]

**9.4.2** パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。[15.2 参照]

**9.4.3** 小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には性腺に対する影響を考慮すること。

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。動物実験（ラット・ウサギ）で催奇形性作用、胚・胎児死亡が報告されている。[9.4.1 参照]

### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。動物実験（ラット）で乳汁中に移行することが報告されている。

### 9.7 小児等

**〈小児悪性固形腫瘍〉**

**9.7.1** 幼児又は小児に投与する場合には、副作用の発現に特に注意し、慎重に投与すること。低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

**〈小児悪性固形腫瘍以外〉**

**9.7.2** 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 9.8 高齢者

骨髄機能抑制、下痢等の副作用に注意し、異常が認められた場合には、回復を十分に確認してから投与を行うなど、投与間隔に留意すること。一般に高齢者では生理機能が低下しており、排泄が遅れる。

## 10. 相互作用

### 10.1 併用禁忌（併用しないこと）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| アタザナビル硫酸塩（レイアタッツ）[1.2、2.8 参照] | 骨髄機能抑制、下痢等の副作用が増強するおそれがある。 | 本剤の活性代謝物（SN-38）は、主に肝の UDP-グルクロン酸転移酵素 1A1（UGT1A1）によりグルクロン酸抱合体（SN-38G）となる。UGT 阻害作用のあるアタザナビル硫酸塩との併用により、本剤の代謝が遅延することが考えられる。 |

### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| 他の抗悪性腫瘍剤<br>放射線照射 | 骨髄機能抑制、下痢等の副作用が増強するおそれがある。<br>患者の状態を観察しながら、減量するか又は投与間隔を延長する。 | 併用により殺細胞作用が増強される。 |
| 末梢性筋弛緩剤<br>スキサメトニウム塩化物水和物<br>ベクロニウム臭化物<br>ロクロニウム臭化物等 | 末梢性筋弛緩剤の作用が減弱するおそれがある。 | 本剤は、動物実験で筋収縮増強作用が認められている。 |
| CYP3A4 阻害剤<br>アゾール系抗真菌剤（ケトコナゾール、フルコナゾール、イトラコナゾール、ミコナゾール等）<br>マクロライド系抗生剤（エリスロマイシン、クラリスロマイシン等）<br>リトナビル<br>ジルチアゼム塩酸塩<br>ニフェジピン<br>モザバプタン塩酸塩等<br>グレープフルーツジュース | 骨髄機能抑制、下痢等の副作用が増強するおそれがある。<br>患者の状態を観察しながら、減量するか又は投与間隔を延長する。 | 本剤は、主にカルボキシルエステラーゼにより活性代謝物（SN-38）に変換されるが、CYP3A4 により一部無毒化される。CYP3A4 を阻害する左記薬剤等との併用により、CYP3A4 による無毒化が阻害されるため、カルボキシルエステラーゼによる SN-38 の生成がその分増加し、SN-38 の全身曝露量が増加することが考えられる。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| CYP3A4 誘導剤<br>フェニトイン<br>カルバマゼピン<br>リファンピシン<br>フェノバルビタール等<br>セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort：セント・ジョーンズ・ワート）含有食品 | 本剤の活性代謝物（SN-38）の血中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。<br>本剤投与期間中は左記薬剤・食品との併用を避けることが望ましい。 | 本剤は、主にカルボキシルエステラーゼにより活性代謝物（SN-38）に変換されるが、CYP3A4 により一部無毒化される。CYP3A4 を誘導する左記薬剤等との併用により、CYP3A4 による無毒化が促進されるため、カルボキシルエステラーゼによる SN-38 の生成がその分減少し、SN-38 の全身曝露量が減少することが考えられる。 |
| ソラフェニブトシル酸塩 | 骨髄機能抑制、下痢等の副作用が増強するおそれがある。<br>患者の状態を観察しながら、減量するか又は投与間隔を延長する。 | 本剤の活性代謝物（SN-38）は、主に肝の UDP-グルクロン酸転移酵素 1A1（UGT1A1）によりグルクロン酸抱合体（SN-38G）となる。UGT1A1 阻害作用のあるソラフェニブトシル酸塩との併用により、本剤及び本剤の活性代謝物（SN-38）の血中濃度が上昇する可能性がある。 |
| ラパチニブトシル酸塩水和物 | 骨髄機能抑制、下痢等の副作用が増強するおそれがある。<br>患者の状態を観察しながら、減量するか又は投与間隔を延長する。 | 機序は不明だが、ラパチニブトシル酸塩水和物との併用により、本剤の活性代謝物（SN-38）の AUC が約 40%増加したとの報告がある。 |
| レゴラフェニブ水和物 | 骨髄機能抑制、下痢等の副作用が増強するおそれがある。<br>患者の状態を観察しながら、減量するか又は投与間隔を延長する。 | 本剤の活性代謝物（SN-38）は、主に肝の UDP-グルクロン酸転移酵素 1A1（UGT1A1）によりグルクロン酸抱合体（SN-38G）となる。UGT1A1 阻害作用のあるレゴラフェニブ水和物との併用により、本剤及び本剤の活性代謝物（SN-38）の AUC がそれぞれ 28% 及び 44% 増加し、Cmax がそれぞれ 22%増加及び 9%減少したとの報告がある。 |

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 骨髄機能抑制

汎血球減少（頻度不明）、白血球減少（84.2%）、好中球減少（80.8%）、血小板減少（20.4%）、貧血（61.4%）、発熱性好中球減少症（1.3%）等があらわれることがある。白血球減少（好中球減少）を認めた場合には、減少の程度に応じて G-CSF 等の白血球増多剤の投与、発熱を伴う場合には適切な抗生剤の投与、その他必要に応じて適切な感染症対策を行うこと。また、高度な骨髄機能抑制の持続により、次のような疾患を併発し、死亡した例も報告されている。

・重症感染症（敗血症、肺炎等）
重篤な白血球・好中球減少に伴い、敗血症（頻度不明）、肺炎（頻度不明）等の重症感染症があらわれることがある。

・播種性血管内凝固症候群（DIC）
重篤な感染症、血小板減少に伴い、播種性血管内凝固症候群（頻度不明）があらわれることがある。[1.4、8.3、8.5 参照]

#### 11.1.2 高度な下痢、腸炎

下痢（65.5%）、大腸炎（頻度不明）、小腸炎（頻度不明）、腸炎（部位不明：頻度不明）があらわれることがある。高度な下痢の持続により、脱水、電解質異常、ショック（循環不全：頻度不明）を併発し、死亡した例も報告されている。

高度な下痢の持続により、脱水及び電解質異常等をきたし、特に重篤な白血球・好中球減少を伴った場合には、致命的な経過をたどることがあるので、次のような処置を行うこと。

・ロペラミド塩酸塩等の止瀉剤の投与を行うこと（ただし、腸管麻痺を引き起こすことがあるので、ロペラミド塩酸塩等の予防的投与や、漫然とした投与は行わないこと）。
・脱水を認めた場合には、輸液、電解質補充を行うこと。
・重篤な白血球・好中球減少を伴った場合には、適切な抗生剤の投与を考慮すること。

高度な下痢や嘔吐に伴いショック（循環不全）があらわれることがあるので、呼吸困難、血圧低下等が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。

なお、本剤による下痢に関しては、以下の 2 つの機序が考えられている。

早発型：本剤投与中あるいは投与直後に発現する。コリン作動性と考えられ、高度である場合もあるが多くは一過性であり、副交感神経遮断剤の投与により緩和することがある。

遅発型：本剤投与後 24 時間以降に発現する。主に本剤の活性代謝物（SN-38）による腸管粘膜傷害に基づくものと考えられ、持続することがある。[1.4、8.3－8.5 参照]

#### 11.1.3 腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞

腸管穿孔（頻度不明）、消化管出血（下血、血便を含む：頻度不明）、腸管麻痺（2.5%）、腸閉塞（0.5%）があらわれることがある。なお、腸管麻痺・腸閉塞に引き続き腸管穿孔を併発し、死亡した例が報告されている。これらの症例の中には、腸管蠕動を抑制する薬剤（ロペラミド塩酸塩、モルヒネ硫酸塩水和物等）の併用例があるので、腸管蠕動を抑制する薬剤を併用する場合には、特に注意すること。[8.5 参照]

#### 11.1.4 間質性肺炎（2.4%）

[8.5、8.7 参照]

#### 11.1.5 ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）

過敏症状（呼吸困難、血圧低下等）が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。[8.2 参照]

#### 11.1.6 肝機能障害（頻度不明）、黄疸（頻度不明）

[8.3 参照]

#### 11.1.7 急性腎障害（頻度不明）

[8.3 参照]

#### 11.1.8 血栓塞栓症

肺塞栓症（頻度不明）、静脈血栓症（頻度不明）があらわれることがある。

#### 11.1.9 脳梗塞（頻度不明）

#### 11.1.10 心筋梗塞（頻度不明）、狭心症発作（頻度不明）

#### 11.1.11 心室性期外収縮（0.8%）

### 11.2 その他の副作用

| | 50%以上 | 5～50%未満 | 5%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 消化器 | 食欲不振（80.9%）、悪心・嘔吐（77.2%） | 腹痛 | しゃっくり、腹部膨満感、口内炎、口唇炎、痔核、胃腸音異常 | 胃潰瘍、胃・腹部不快感、胃炎、消化不良、便秘、食道炎、吐血、腸管運動亢進 |
| 肝臓 | | AST 上昇、ALT 上昇、ALP 上昇、LDH 上昇 | ビリルビン上昇、γ-GTP 上昇 | |

| | 50%以上 | 5～50%未満 | 5%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 腎臓 | | 電解質異常 | 腎機能障害（BUN上昇、クレアチニンクリアランス低下、クレアチニン上昇等）、蛋白尿、血尿、尿沈渣異常 | 乏尿、クレアチニンクリアランス低下 |
| 呼吸器 | | | 気管支炎、咽頭炎、鼻炎、発声障害、咽頭知覚不全、口腔咽頭不快感 | 咽頭痛、咳嗽、呼吸困難、$PaO_2$低下、上気道炎 |
| 過敏症 | | | 発疹、そう痒感 | 蕁麻疹 |
| 皮膚 | 脱毛 | | 色素沈着、浮腫、紅斑、手足症候群、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥 | 帯状疱疹、粘膜炎、発赤 |
| 精神神経系 | | | しびれ等の末梢神経障害、頭痛、めまい、精神症状、意識障害、傾眠、興奮・不安感、不穏 | 痙攣、耳鳴、味覚異常、うつ病、目のかすみ、不眠、振戦、構語障害 |
| 循環器 | | | 頻脈、血圧低下、動悸 | 不整脈、徐脈、心房細動、高血圧、心電図異常 |
| その他 | | 倦怠感、発熱、好酸球増加、総蛋白減少、アルブミン減少 | 発汗、顔面潮紅、疼痛、腰痛、カルシウム異常、尿酸異常、尿ウロビリノーゲン異常、糖尿 | 脱水、コリン作動性症候群、悪寒、胸部不快感、胸痛、関節痛、筋痛、鼻出血、脱力感、無力症、疲労、体重増加、体重減少、LDH低下、白血球増加、血小板増加、白血球分画の変動、CRP上昇、注射部位反応（発赤、疼痛等）、血管炎、流涙、熱感、腹水、鼻汁 |

発現頻度の算出にあたってはホジキン病の患者を含む。本剤の効能又は効果は、悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）である。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

**14.1.1** 本剤は細胞毒性を有するため、調製時には手袋を着用することが望ましい。皮膚、眼、粘膜に薬液が付着した場合には、直ちに多量の流水でよく洗い流すこと。

**14.1.2** 本剤は、輸液に混和後、できるだけ速やかに投与すること。

### 14.2 薬剤投与時の注意

**14.2.1** 静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れると、注射部位に硬結・壊死を起こすことがあるので薬液が血管外に漏れないように投与すること。

**14.2.2** 本剤は光に不安定なので直射日光を避けること。また、点滴時間が長時間におよぶ場合には遮光して投与すること。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

欧州における進行性小細胞肺癌を対象とした無作為化第Ⅲ相臨床試験において、本剤とシスプラチン併用投与群（本剤80mg/m$^2$を第1、8日目、シスプラチン80mg/m$^2$を第1日目に投与し3週毎に繰り返す）での治療関連死が39例中4例に認められ、臨床試験が中断された。その後、本剤の投与量を65mg/m$^2$に減量し、臨床試験は再開され、試験は終了となった。なお、本剤減量後の治療関連死は202例中7例であった[4)]。

### 15.2 非臨床試験に基づく情報


ほ乳類培養細胞を用いた染色体異常試験及びマウス骨髄細胞を用いた小核試験において、遺伝毒性が報告されている。[9.4.2 参照]

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 単回投与

各種悪性腫瘍患者に、イリノテカン塩酸塩水和物50～350mg/m$^2$[注1)]を単回点滴静脈内投与したときの血漿中の未変化体と活性代謝物（SN-38）の濃度を測定した。未変化体は血漿中からの減衰速度が速く、$t_{1/2}$が3.7～5.8時間であったが、SN-38の$t_{1/2}$は11.4～18.5時間であり、未変化体と比べて持続的な濃度推移を示した。未変化体及びSN-38は投与後72時間程度でほぼ完全に血中から消失した[5)]。




イリノテカン塩酸塩水和物投与後の血漿中濃度推移

各種悪性腫瘍患者におけるイリノテカン塩酸塩水和物投与後の未変化体及びSN-38の薬物動態学的パラメータ

| 投与量（mg/m$^2$） | 症例数 | Cmax（μg/mL） | | $t_{1/2}$（hr） | | AUC（μg・hr/mL） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 未変化体 | SN-38 | 未変化体 | SN-38 | 未変化体 | SN-38 |
| 50 | 3 | 0.7 | 0.02 | 5.6 | 11.4 | 3.6 | 0.2 |
| 100 | 4 | 1.9 | 0.03 | 5.8 | 18.5 | 14.2 | 0.6 |
| 165 | 5 | 4.7 | 0.05 | 4.2 | 12.2 | 21.5 | 0.7 |
| 250 | 5 | 7.6 | 0.07 | 4.5 | 13.9 | 27.9 | 0.9 |
| 350 | 1 | 7.1 | 0.14 | 3.7 | 14.8 | 44.7 | 1.1 |

### 16.3 分布

#### 16.3.1 血漿蛋白結合率

ヒト血漿にイリノテカン塩酸塩水和物又はSN-38を添加して限外ろ過法で測定した血漿蛋白結合率は、未変化体では30～40%、SN-38では92～96%であった（*in vitro*）。

#### 16.3.2 動物での組織分布

ラットに$^{14}$C-イリノテカン塩酸塩水和物を単回静脈内投与した後の組織内放射能濃度は、脳、中枢神経系、生殖系を除く各組織で血漿中放射能濃度より高く、速やかでかつ良好な組織移行性が認められた[6),7)]。

### 16.4 代謝

**16.4.1** ヒトの肝及び各組織において、イリノテカン塩酸塩水和物はカルボキシルエステラーゼにより活性代謝物（SN-38）に直接変換される[8),9)]。その他イリノテカン塩酸塩水和物は、CYP3A4により一部は無毒化され、また、一部は間接的にSN-38に変換される[10),11)]。

SN-38は、主に肝の代謝酵素であるUDP-グルクロン酸転移酵素（UGT）の一分子種であるUGT1A1によりグルクロン酸抱合され、SN-38のグルクロン酸抱合体（SN-38G）となり、主に胆汁中に排泄される[12),13)]。

UGT1A1 には *UGT1A1*6*、*UGT1A1*28* 等の遺伝子多型が存在し、*UGT1A1*6*、もしくは *UGT1A1*28* においては、これら遺伝子多型をもたない患者に比べてヘテロ接合体、ホモ接合体としてもつ患者の順に SN-38G の生成能力が低下し、SN-38 の代謝が遅延する[1)-3)]。[9.1.5、17.3.1 参照]
日本人における *UGT1A1*6*、*UGT1A1*28* のアレル頻度は 13.0～17.7%、8.6～13.0%との報告がある[14)]。
各種癌患者（176 例）における UGT1A1 遺伝子多型と AUC 比[注 2)] との関連性は次表のとおりである[3)]。

| 遺伝子多型 | AUC 比[注 2)] | |
|---|---|---|
| | 例数 | 中央値（四分位範囲） |
| *UGT1A1*6* と *UGT1A1*28* をともにもたない | 85 | 5.55 (4.13-7.26) |
| *UGT1A1*6* 又は *UGT1A1*28* をヘテロ接合体としてもつ | 75 | 3.62 (2.74-5.18) |
| *UGT1A1*6* 又は *UGT1A1*28* をホモ接合体としてもつ、もしくは *UGT1A1*6* と *UGT1A1*28* をヘテロ接合体としてもつ | 16 | 2.07 (1.45-3.62) |

注 2）SN-38G の AUC を SN-38 の AUC で除した値

**16.4.2** ラットにおいて SN-38G は、腸内細菌がもつ β-グルクロニダーゼにより SN-38 に脱抱合される[15),16)]。

### 16.5 排泄

各種悪性腫瘍患者に、イリノテカン塩酸塩水和物 165mg/m$^2$ 又は 250mg/m$^2$[注 1)] を単回点滴静脈内投与したときの 24 時間までの尿中排泄率は、未変化体が 16.3～21.1%、SN-38 が 0.11～0.15%であった。
注 1）本剤の承認された最大投与量は、180mg/m$^2$ 以下である。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 〈小細胞肺癌、非小細胞肺癌〉

**17.1.1 国内後期第Ⅱ相試験**

手術不能な原発性肺癌（小細胞肺癌、非小細胞肺癌）を対象とした本剤単独投与（1 日 1 回、100mg/m$^2$ を 1 週毎に点滴静注する）の有効性は、次表のとおりであった[17)]。

| 疾患名 | 奏効率% | |
|---|---|---|
| | （CR+PR/完全例） | （CR+PR/適格例） |
| 小細胞肺癌 | 37.1（13/35） | 31.7（13/41） |
| 非小細胞肺癌 | 24.7（23/93） | 21.1（23/109） |

安全性評価症例（146 例）の主な副作用は、食欲不振 82.2%（120/146 例）、白血球減少 76.6%（111/145 例）、悪心・嘔吐 73.3%（107/146 例）、ヘモグロビン減少 66.2%（96/145 例）、下痢 62.3%（91/146 例）、脱毛 50.4%（71/141 例）であった。

#### 〈子宮頸癌、卵巣癌〉

**17.1.2 国内後期第Ⅱ相試験**

子宮頸癌、卵巣癌を対象とした本剤単独投与（1 日 1 回、100mg/m$^2$ を 1 週間間隔で 4 回点滴静注し、2 週間休薬し、これを 1 クールとする（A 法）又は 1 日 1 回、150mg/m$^2$ を 2 週間間隔で 3 回点滴静注し、3 週間休薬し、これを 1 クールとする（B 法））の有効性は、次表のとおりであった[18)]。

| 疾患名 | 奏効率% | |
|---|---|---|
| | （CR+PR/完全例） | （CR+PR/適格例） |
| 子宮頸癌 | 23.6（13/55） | 19.7（13/66） |
| 卵巣癌 | 23.6（13/55） | 19.1（13/68） |

安全性評価症例（126 例）の主な副作用は、白血球減少 92.9%（117/126 例）、悪心・嘔吐 88.1%（111/126 例）、食欲不振 86.1%（105/122 例）、ヘモグロビン減少 67.5%（85/126 例）、下痢 67.2%（84/125 例）、脱毛 55.4%（67/121 例）であった。

#### 〈胃癌（手術不能又は再発）〉

**17.1.3 国内後期第Ⅱ相試験**

再発・進行胃癌を対象とした本剤単独投与（1 日 1 回、100mg/m$^2$ を 1 週毎に点滴静注する（A 法）又は 1 日 1 回、150mg/m$^2$ を 2 週毎に点滴静注する（B 法））の有効性は、次表のとおりであった[19)]。

| 疾患名 | 奏効率% | |
|---|---|---|
| | （CR+PR/完全例） | （CR+PR/適格例） |
| 胃癌 | 23.3（14/60） | 18.4（14/76） |

安全性評価症例（76 例）の主な副作用は、白血球減少 85.5%（65/76 例）、貧血 64.5%（49/76 例）、食欲不振 64.5%（49/76 例）、悪心・嘔吐 63.2%（48/76 例）、脱毛 63.2%（48/76 例）、下痢 61.8%（47/76 例）、血小板減少 18.4%（14/76 例）、腹痛 17.1%（13/76 例）であった。

#### 〈結腸・直腸癌（手術不能又は再発）〉

**17.1.4 国内後期第Ⅱ相試験**

遠隔転移を有する結腸・直腸癌を対象とした本剤単独投与（1 日 1 回、100mg/m$^2$ を 1 週毎に点滴静注する（A 法）又は 1 日 1 回、150mg/m$^2$ を 2 週毎に点滴静注する（B 法））の有効性は、次表のとおりであった[20)]。

| 疾患名 | 奏効率% | |
|---|---|---|
| | （CR+PR/完全例） | （CR+PR/適格例） |
| 結腸・直腸癌 | 32.1（17/53） | 27.0（17/63） |

安全性評価症例（63 例）の主な副作用は、食欲不振 84%（51/61 例）、白血球減少 76%（47/62 例）、悪心・嘔吐 73%（46/63 例）、下痢 63%（39/62 例）、脱毛 62%（39/63 例）、貧血 50%（31/62 例）、腹痛 16%（10/62 例）であった。

#### 〈乳癌（手術不能又は再発）〉

**17.1.5 国内後期第Ⅱ相試験**

再発・進行乳癌を対象とした本剤単独投与（1 日 1 回、100mg/m$^2$ を 1 週間間隔で 3 回点滴静注し、2 週間休薬し、これを 1 クールとする）の有効性は、次表のとおりであった[21)]。

| 疾患名 | 奏効率% | |
|---|---|---|
| | （CR+PR/完全例） | （CR+PR/適格例） |
| 乳癌 | 23.1（15/65） | 20.0（15/75） |

安全性評価症例（75 例）の主な副作用は、白血球減少 92%（68/74 例）、悪心・嘔吐 89%（67/75 例）、食欲不振 87%（65/75 例）、好中球減少 80%（45/56 例）、下痢 64%（48/75 例）、ヘモグロビン減少（貧血）50%（37/74 例）、脱毛 47%（34/73 例）、ALT 上昇 20%（15/74 例）、AST 上昇 18%（13/74 例）、腹痛 17%（13/75 例）、好酸球増加 16%（9/56 例）、倦怠感 12%（9/75 例）、血小板減少 11%（8/74 例）、総蛋白減少 10%（7/74 例）であった。

#### 〈有棘細胞癌〉

**17.1.6 国内後期第Ⅱ相試験**

有棘細胞癌を対象とした本剤単独投与（1 日 1 回、100mg/m$^2$ を 1 週間間隔で、3～4 回点滴静注し、2 週間休薬し、これを 1 クールとする）の有効性は、次表のとおりであった[22)]。

| 疾患名 | 奏効率% | |
|---|---|---|
| | （CR+PR/完全例） | （CR+PR/適格例） |
| 有棘細胞癌 | 39.4（13/33） | 31.7（13/41） |

安全性評価症例（41 例）の主な副作用は、食欲不振 80.5%（33/41 例）、悪心・嘔吐 75.6%（31/41 例）、好中球減少 71.8%（28/39 例）、白血球減少 65.9%（27/41 例）、下痢 48.8%（20/41 例）、脱毛 35.0%（14/40 例）、ヘモグロビン減少（貧血）31.7%（13/41 例）、腹痛 26.8%（11/41 例）、総蛋白減少 26.8%（11/41 例）、アルブミン減少 22.5%（9/40 例）、ALT 上昇 17.1%（7/41 例）、AST

上昇 14.6%（6/41 例）、ナトリウム異常 10.0%（4/40 例）、クロール異常 10.0%（4/40 例）であった[23),24)]。

〈悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）〉

**17.1.7 国内後期第Ⅱ相試験**

悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）を対象とした本剤単独投与（1 日 1 回、40mg/m² を 3 日間連日点滴静注し、1 週毎に繰り返す）の有効性は、次表のとおりであった[25)]。

| 疾患名 | 奏効率% | |
|---|---|---|
| | （CR+PR/完全例） | （CR+PR/適格例） |
| 悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫） | 41.9（26/62） | 37.7（26/69） |

〈治癒切除不能な膵癌〉

**17.1.8 海外第Ⅱ/Ⅲ相試験**

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相試験における FOLFIRINOX 法群（1 クールを 2 週間として第 1 日目にオキサリプラチン 85mg/m²、ホリナート 400mg/m²、本剤 180mg/m² を点滴静注し、引き続きフルオロウラシル 400mg/m² を急速静脈内投与、フルオロウラシル 2,400mg/m² を 46 時間かけて持続静注）とゲムシタビン塩酸塩（GEM）単独投与群（GEM 1,000mg/m² の週 1 回点滴投与を 7 週連続し、8 週目は休薬する。その後は、週 1 回点滴投与を 3 週連続し、4 週目は休薬として、これを 4 週毎に繰り返す）の中間解析時の有効性は次表のとおりであった[26),27)]（外国人データ）。対象患者は ECOG[注 1)] Performance status 0 及び 1 であった。登録において 2 つの遺伝子多型（*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*）に関する基準は設定されなかった。また、登録時の選択基準として、好中球数（1,500/mm³ 以上）、総ビリルビン値（施設基準値上限の 1.5 倍以下）等が設定された。

| 疾患名 | 投与群 | 例数（ITT） | 生存期間（主要評価項目） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 中央値（月） | ハザード比 P 値[注 2)] |
| 化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌 | FOLFIRINOX 法 | 127 | 10.5 | 0.62 P < 0.001 |
| | GEM 単独投与 | 128 | 6.9 | |

FOLFIRINOX 法群において、安全性評価症例 167 例のうち、有害事象が収集できなかった 1 例を除く 166 例における有害事象発現頻度は 100%であった。主な有害事象は、貧血 90.4%（150/166 例）、疲労 87.3%（144/165 例）、γ-GTP 上昇 83.7%（139/166 例）、ALP 上昇 83.0%（137/165 例）、好中球減少 79.9%（131/164 例）、悪心 79.5%（132/166 例）、血小板減少 75.2%（124/165 例）、下痢 73.3%（121/165 例）、末梢性感覚ニューロパチー 70.5%（117/166 例）、ALT 上昇 64.8%（107/165 例）、AST 上昇 64.6%（106/164 例）、嘔吐 61.4%（102/166 例）、体重変動 54.2%（90/166 例）、食欲不振 48.8%（81/166 例）、便秘 45.2%（75/166 例）、脱毛 32.5%（54/166 例）であった。[5.2 参照]

注 1）Eastern Cooperative Oncology Group。

注 2）log-rank 検定。

**17.1.9 国内第Ⅱ相試験**

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ相試験における FOLFIRINOX 法（1 クールを 2 週間として第 1 日目にオキサリプラチン 85mg/m²、レボホリナート 200mg/m²、本剤 180mg/m² を点滴静注し、引き続きフルオロウラシル 400mg/m² を急速静脈内投与、フルオロウラシル 2,400mg/m² を 46 時間かけて持続静注）の有効性は次表のとおりであった[28)]。対象患者は ECOG Performance status 0 及び 1 であった。2 つの遺伝子多型（*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*）について、いずれかをホモ接合体（*UGT1A1*6/*6*、*UGT1A1*28/*28*）又はいずれもヘテロ接合体（*UGT1A1*6/*28*）としてもつ患者は除外された。また、1 クール目の投与可能条件として、好中球数（2,000/mm³ 以上）、総ビリルビン値（施設基準値上限以下）等が設定された。

| 疾患名 | 奏効率（有効例/適格例） |
|---|---|
| 化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌 | 38.9%（14/36） |

安全性評価症例 36 例における副作用発現頻度は 100%であった。主な副作用は、好中球減少 94.4%（34/36 例）、白血球減少 91.7%（33/36 例）、悪心 88.9%（32/36 例）、血小板減少 88.9%（32/36 例）、貧血 86.1%（31/36 例）、食欲不振 86.1%（31/36 例）、下痢 83.3%（30/36 例）、末梢性感覚ニューロパチー 75.0%（27/36 例）、脱毛 66.7%（24/36 例）、CRP 上昇 66.7%（24/36 例）、リンパ球数減少 66.7%（24/36 例）、アルブミン減少 63.9%（23/36 例）、体重減少 58.3%（21/36 例）、AST 上昇 55.6%（20/36 例）、ALT 上昇 55.6%（20/36 例）、口内炎 52.8%（19/36 例）、味覚異常 47.2%（17/36 例）、便秘 47.2%（17/36 例）、倦怠感 44.4%（16/36 例）、LDH 上昇 44.4%（16/36 例）であった。[5.2 参照]

**17.3 その他**

**17.3.1 UGT1A1 遺伝子多型と副作用発現率**

国内において本剤単独投与（55 例）の各種癌患者について、UGT1A1 遺伝子多型と副作用との関連性について検討した[3)]。本剤は、100mg/m² を 1 週間間隔又は 150mg/m² を 2 週間間隔で投与した。

グレード 3 以上の好中球減少及び下痢の発現率は次表のとおりであった。[9.1.5、16.4.1 参照]

| 遺伝子多型 | グレード 3 以上の好中球減少発現率（例数） | グレード 3 の下痢発現率（例数） |
|---|---|---|
| *UGT1A1*6* と *UGT1A1*28* をともにもたない | 14.3%（3/21） | 14.3%（3/21） |
| *UGT1A1*6* 又は *UGT1A1*28* をヘテロ接合体としてもつ | 24.1%（7/29） | 6.9%（2/29） |
| *UGT1A1*6* 又は *UGT1A1*28* をホモ接合体としてもつ、もしくは *UGT1A1*6* と *UGT1A1*28* をヘテロ接合体としてもつ | 80.0%（4/5） | 20.0%（1/5） |

## 18. 薬効薬理

**18.1 作用機序**

イリノテカン塩酸塩水和物は、1983 年に抗腫瘍性アルカロイドであるカンプトテシンから合成された抗悪性腫瘍剤である[29)]。本剤は生体内でカルボキシルエステラーゼにより活性代謝物（SN-38）に加水分解されるプロドラッグである[30)]。Ⅰ型 DNA トポイソメラーゼを阻害することによって、DNA 合成を阻害する[30)]。殺細胞効果は細胞周期の S 期に特異的であり、制限付時間依存性に効果を示す薬剤である。

**18.2 抗腫瘍作用**

移植腫瘍に対して広い抗腫瘍スペクトラムを有する。マウス S180 肉腫、Meth A 線維肉腫、Lewis 肺癌、L1210 及び P388 白血病、ラット Walker 256 癌肉腫ならびにヌードマウス可移植性ヒト腫瘍 MX-1（乳癌）、Co-4（大腸癌）、St-15（胃癌）、QG-56（肺癌）等に強い抗腫瘍効果を示す[31)-33)]。また、*in vitro* 試験においてヒト膵癌由来 BxPC-3、PANC-1、SPA 及び SUIT-2 細胞株の増殖を抑制した。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見


一般的名称：イリノテカン塩酸塩水和物（Irinotecan Hydrochloride Hydrate）（JAN）

化学名：(4*S*)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-9-yl[1,4'bipiperidine]-1'-carboxylate monohydrochloride trihydrate

分子式：$C_{33}H_{38}N_4O_6 \cdot HCl \cdot 3H_2O$

分子量：677.18

化学構造式：



性　　状：本品は微黄色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である。
本品はメタノールにやや溶けにくく、水又はエタノール（99.5）に溶けにくい。
本品は光によって徐々に黄褐色となり、分解する。
融点：約 255℃（分解）。
本品は結晶多形が認められる。

## 20．取扱い上の注意

凍結しないように注意すること。

## 22．包装

〈トポテシン点滴静注 40mg〉
2mL［1 バイアル（褐色）］
〈トポテシン点滴静注 100mg〉
5mL［1 バイアル（褐色）］

## 23．主要文献


1）Ando, Y. et al.：Cancer Res. 2000；60：6921-6926
2）Innocenti, F. et al.：J Clin Oncol. 2004；22：1382-1388
3）Minami, H. et al.：Pharmacogenet Genomics. 2007；17：497-504
4）Zatloukal, P. et al.：Ann Oncol. 2010；21：1810-1816
5）田口鐵男　他：癌と化学療法. 1990；17：115-120
6）伯水英夫　他：薬物動態. 1991；6：73-95
7）伯水英夫　他：薬物動態. 1991；6：105-125
8）河野　彬　他：癌と化学療法. 1991；18：2175-2178
9）川戸康義　他：薬物動態. 1991；6：899-907
10）Dodds, H. M. et al.：J Pharmacol Exp Ther. 1998；286：578-583
11）Haaz, M. C. et al.：Cancer Res. 1998；58：468-472
12）Rivory, L. P. et al.：Cancer Chem Pharm. 1995；36：176-179
13）Haaz, M. C. et al.：Pharmacol Toxicol. 1997；80：91-96
14）Saito, Y. et al.：Curr Pharmacogenomics. 2007；5：49-78
15）Kaneda, N. et al.：Cancer Res. 1990；50：1721-1725
16）Atsumi, R. et al.：Xenobiotica. 1991；21：1159-1169
17）根来俊一　他：癌と化学療法. 1991；18：1013-1019
18）竹内正七　他：癌と化学療法. 1991；18：1681-1689
19）二ッ木浩一　他：癌と化学療法. 1994；21：1033-1038
20）Shimada, Y. et al.：J Clin Oncol. 1993；11：909-913
21）田口鐵男　他：癌と化学療法. 1994；21：1017-1024
22）池田重雄　他：Skin Cancer. 1993；8：503-513
23）社内資料：臨床的副作用（1995 年 9 月 29 日承認、申請資料概要ト-Ⅱ-1）
24）社内資料：臨床検査値異常（1995 年 9 月 29 日承認、申請資料概要ト-Ⅱ-2）
25）太田和雄　他：癌と化学療法. 1994；21：1047-1055
26）Conroy, T. et al.：N Engl J Med. 2011；364：1817-1825
27）社内資料：膵癌 FOLFIRINOX 法に関する資料
28）Okusaka, T. et al.：Cancer Sci. 2014；105：1321-1326
29）Sawada, S. et al：Chem Pharm Bull. 1991；39：1446-1454
30）Kawato, Y. et al.：Cancer Res. 1991；51：4187-4191
31）新田和男　他：癌と化学療法. 1987；14：850-857
32）古田富雄　他：癌と化学療法. 1988；15：2757-2760
33）Kawato, Y. et al.：Cancer Chem Pharm. 1991；28：192-198


## 24．文献請求先及び問い合わせ先


アルフレッサ ファーマ株式会社　製品情報部
〒 540-8575　大阪市中央区石町二丁目 2 番 9 号
TEL 06-6941-0306　FAX 06-6943-8212


## 26．製造販売業者等

### 26.1　製造販売元


alfresa アルフレッサ ファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号


®登録商標

18

Pfizer

006

*2023年3月改訂（第1版、効能変更、用法変更）

| 日本標準商品分類番号 |
|---|
| 873929 |

貯　　法：室温保存
有効期間：3年

活性型葉酸製剤
レボホリナートカルシウム水和物注射剤

処方箋医薬品注）

# アイソボリン®点滴静注用25mg
# アイソボリン®点滴静注用100mg

# ISOVORIN® INJECTION 25mg
# ISOVORIN® INJECTION 100mg

| | 25mg | 100mg |
|---|---|---|
| 承認番号 | 22000AMX00879 | 22000AMX00802 |
| 販売開始 | 1999年10月 | 2006年10月 |

注）注意-医師等の処方箋により使用すること

## 1. 警告

1.1 レボホリナート・フルオロウラシル療法及び持続静注併用療法はフルオロウラシルの細胞毒性を増強する療法であり、本療法に関連したと考えられる死亡例が認められている。本療法は高度の危険性を伴うので、緊急時に十分に対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、「2. 禁忌」、「9. 特定の背景を有する患者に関する注意」の項を参照して適応患者の選択を慎重に行い、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。
また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから施行すること。

1.2 本療法は重篤な骨髄抑制、激しい下痢等が起こることがあり、その結果、致命的な経過をたどることがあるので、定期的（特に投与初期は頻回）に臨床検査（血液検査、肝機能・腎機能検査等）を行うなど患者の状態を十分観察し、異常が認められた場合には、速やかに適切な処置を行うこと。[7.1、8.1、9.1.1、9.1.2、11.1.3参照]

1.3 本療法以外の他の化学療法又は放射線照射との併用、前化学療法を受けていた患者に対する安全性は確立していない。重篤な骨髄抑制等の副作用の発現が増強するおそれがあるので、患者の状態を十分観察し、異常が認められた場合には、速やかに適切な処置を行うこと。[7.1、8.1、9.1.1、9.1.2、11.1.3参照]

1.4 本剤の成分又はフルオロウラシルに対し重篤な過敏症の既往歴のある患者には本療法を施行しないこと。[2.7参照]

1.5 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤との併用により、重篤な血液障害等の副作用が発現するおそれがあるので、本療法との併用を行わないこと。[2.8、10.1参照]

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 重篤な骨髄抑制のある患者［骨髄抑制の増悪により重症感染症を併発し、致命的となることがある。］

2.2 下痢のある患者［下痢が増悪して脱水、電解質異常、循環不全を起こし致命的となることがある。］

2.3 重篤な感染症を合併している患者［骨髄抑制により感染症が増悪し、致命的となることがある。］

2.4 多量の腹水、胸水のある患者［重篤な副作用が発現し、致命的となることがある。］

2.5 重篤な心疾患又はその既往歴のある患者［症状の増悪又は再発により、致命的となることがある。］

2.6 全身状態が悪化している患者［重篤な副作用が発現し、致命的となることがある。］

2.7 本剤の成分又はフルオロウラシルに対し重篤な過敏症の既往歴のある患者［1.4参照］

2.8 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中の患者及び投与中止後7日以内の患者［1.5、10.1参照］

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

| 販売名 | アイソボリン点滴静注用25mg | アイソボリン点滴静注用100mg |
|---|---|---|
| 有効成分 | 1バイアル中<br>日局　レボホリナートカルシウム水和物　31.8mg<br>（レボホリナートとして　25.0mg） | 1バイアル中<br>日局　レボホリナートカルシウム水和物　127.1mg<br>（レボホリナートとして　100.0mg） |
| 添加剤 | D-マンニトール　25.0mg<br>pH調節剤 | D-マンニトール　100.0mg<br>pH調節剤 |

### 3.2 製剤の性状

| | |
|---|---|
| 外観 | 本剤は帯微黄白色～淡黄白色の粉末又は塊である |
| pH | 6.8～8.2（レボホリナート10mg/mL注射用水） |
| 浸透圧比（生理食塩液に対する比） | 約0.2（5mg/mL注射用水）<br>約1（5mg/mL生理食塩液）<br>約1（0.5mg/mL生理食塩液） |

## *4. 効能又は効果

○レボホリナート・フルオロウラシル療法
胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強

○レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法
結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強

## 5. 効能又は効果に関連する注意

国内では、本療法による手術後の補助療法については有効性及び安全性は確立していない。

## *6. 用法及び用量

〈レボホリナート・フルオロウラシル療法〉
通常、成人にはレボホリナートとして1回250mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射開始1時間後にフルオロウラシルとして1回600mg/m$^2$（体表面積）を3分以内で緩徐に静脈内注射する。1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬する。これを1クールとする。

〈結腸・直腸癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法〉
・通常、成人にはレボホリナートとして1回100mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/m$^2$（体表面積）を静脈内注射するとともに、フルオロウラシルとして600mg/m$^2$（体表面積）を22時間かけて持続静脈内注射する。これを2日間連続して行い、2週間ごとに繰り返す。
・通常、成人にはレボホリナートとして1回250mg/m$^2$（体表面積）を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして2600mg/m$^2$（体表面積）を24時間かけて持続静脈内注射する。1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬する。これを1クールとする。

・通常、成人にはレボホリナートとして1回200mg/m²（体表面積）を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/m²（体表面積）を静脈内注射するとともに、フルオロウラシルとして2400～3000mg/m²（体表面積）を46時間かけて持続静脈内注射する。これを2週間ごとに繰り返す。

**〈小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法〉**

通常、成人にはレボホリナートとして1回200mg/m²（体表面積）を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/m²（体表面積）を静脈内注射するとともに、フルオロウラシルとして2400mg/m²（体表面積）を46時間かけて持続静脈内注射する。これを2週間ごとに繰り返す。

**7. 用法及び用量に関連する注意**

7.1 本療法の施行に際しては、白血球、血小板の変動に十分注意し、投与当日の白血球数あるいは血小板数等の検査により重篤な骨髄抑制が認められた場合には、骨髄機能が回復するまで投与を延期すること。[1.2、1.3、8.1、9.1.1、9.1.2、11.1.3参照]

7.2 下痢、重篤な口内炎、重篤な白血球減少又は血小板減少のみられた患者では、それらの所見が回復するまで本療法を延期する。本療法を再開する場合には、フルオロウラシルの減量や投与間隔の延長等を考慮すること。

**8. 重要な基本的注意**

**〈効能共通〉**

8.1 骨髄抑制、播種性血管内凝固症候群（DIC）等の重篤な副作用が起こることがあり、ときに致命的な経過をたどることがあるので、定期的（特に投与初期は頻回）に臨床検査（血液検査、肝機能・腎機能検査等）を行うなど、患者の状態を十分観察すること。[1.2、1.3、7.1、9.1.1、9.1.2、11.1.3参照]

**〈小腸癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉**

*8.2 小腸癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌に本剤を使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議公知申請への該当性に係る報告書」[1,2]等）を熟読すること。

**9. 特定の背景を有する患者に関する注意**

**9.1 合併症・既往歴等のある患者**

**9.1.1 骨髄抑制のある患者（重篤な骨髄抑制のある患者を除く）**

骨髄抑制の増悪により重症感染症が併発することがある。[1.2、1.3、7.1、8.1、11.1.3参照]

**9.1.2 感染症を合併している患者（重篤な感染症を合併している患者を除く）**

骨髄抑制により感染症が増悪することがある。[1.2、1.3、7.1、8.1、11.1.3参照]

**9.1.3 心疾患又はその既往歴のある患者（重篤な心疾患又はその既往歴のある患者を除く）**

症状を増悪又は再発させることがある。[11.1.6参照]

**9.1.4 高度に進行した肝転移のある患者**

血小板減少があらわれることがある。

**9.1.5 消化管潰瘍又は出血のある患者**

症状を増悪させることがある。

**9.1.6 水痘患者**

致命的な全身障害があらわれるおそれがある。

**9.1.7 前化学療法を受けていた患者**

骨髄抑制等の副作用が増強されるおそれがある。

**9.2 腎機能障害患者**

副作用が強くあらわれるおそれがある。

**9.3 肝機能障害患者**

副作用が強くあらわれるおそれがある。

**9.4 生殖能を有する者**

生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮すること。

**9.5 妊婦**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。フルオロウラシルの動物実験（ラット、マウス）で多指症、口蓋裂等の催奇形作用が報告されている。

**9.6 授乳婦**

授乳しないことが望ましい。

**9.7 小児等**

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

**9.8 高齢者**

用量並びに投与間隔に留意するなど、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。生理機能が低下していることが多く、特に骨髄抑制、消化器障害（激しい下痢、重篤な口内炎等）、皮膚障害、精神神経系の副作用があらわれやすい。

**10. 相互作用**

**10.1 併用禁忌（併用しないこと）**

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（ティーエスワン）[1.5、2.8参照] | 早期に重篤な血液障害や下痢、口内炎等の消化管障害等が発現するおそれがあるので、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中及び投与中止後少なくとも7日以内は本療法を施行しないこと。 | ギメラシルがフルオロウラシルの異化代謝を阻害し、血中フルオロウラシル濃度が著しく上昇する。 |

**10.2 併用注意（併用に注意すること）**

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| フェニトイン | 構音障害、運動失調、意識障害等のフェニトイン中毒があらわれることがある。 | 機序は不明であるがフルオロウラシルがフェニトインの血中濃度を上昇させる。 |
| ワルファリンカリウム | フルオロウラシルがワルファリンカリウムの作用を増強させることがあるので、凝固能の変動に注意すること。 | 機序は不明である。 |
| 他の化学療法、放射線治療 | 血液障害、消化管障害等の副作用が増強することがあるので、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には減量、休薬等の適切な処置を行うこと。 | 副作用が相互に増強される。 |
| 葉酸代謝拮抗剤（スルファメトキサゾール・トリメトプリム等） | これらの薬剤の作用が減弱することがある。 | ホリナートによって葉酸代謝拮抗作用が減弱するためと考えられる。 |

**11. 副作用**

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

**11.1 重大な副作用**

**11.1.1 激しい下痢**（5%以上）

激しい下痢があらわれ、脱水症状にまで至ることがあるので、下痢があらわれた場合には投与を中止し、補液等の適切な処置を行うこと。

**11.1.2 重篤な腸炎**（0.1～5%未満[a)]）

出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等の重篤な腸炎があらわれることがあるので、激しい腹痛、下痢等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

**11.1.3 骨髄抑制**（5%以上[a)]）

汎血球減少、白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少等の骨髄抑制があらわれることがある。[1.2、1.3、7.1、8.1、9.1.1、9.1.2参照]

**11.1.4 ショック**（0.1%未満[a)]）**、アナフィラキシー**（頻度不明）

発疹、呼吸困難、血圧低下等の症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

**11.1.5 白質脳症、精神・神経障害**（いずれも0.1～5%未満[a)]）

白質脳症（初期症状：歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ等）、また、錐体外路症状、言語障害、運動失調、眼振、意識障害、痙攣、顔面麻痺、見当識障害、せん妄、記憶力低下、自発性低下、尿失禁等の精神神経症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

**11.1.6 うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症**（いずれも頻度不明）

うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症があらわれることがある。[9.1.3参照]

**11.1.7 肝機能障害**（0.1～5%未満[a)]）、**黄疸**（頻度不明）
AST、ALT、Al-P、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれ、肝不全に至ることがある。
**11.1.8 急性腎障害**（0.1～5%未満[a)]）
急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがある。
**11.1.9 間質性肺炎**（0.1%未満[a)]）
発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状があらわれた場合には投与を中止し、胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
**11.1.10 消化管潰瘍**（0.1～5%未満[a)]）、**重篤な口内炎**（0.1～5%未満）
**11.1.11 手足症候群**（0.1～5%未満[a)]）
手足症候群（手掌、足蹠の紅斑、疼痛性発赤腫脹、知覚過敏等）があらわれることがある。
**11.1.12 播種性血管内凝固症候群（DIC）**（0.1～5%未満[a)]）
**11.1.13 嗅覚脱失**（頻度不明）
嗅覚障害（長期投与症例に多い）があらわれ、嗅覚脱失まで至ることがある。
**11.1.14 高アンモニア血症**（頻度不明）
意識障害を伴う高アンモニア血症があらわれることがある。
**11.1.15 急性膵炎**（頻度不明）
腹痛、血清アミラーゼ上昇等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

**11.2 その他の副作用**

| | 5%以上 | 0.1～5%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 消化器 | 食欲不振、悪心・嘔吐 | 味覚異常、腹痛、心窩部痛、口渇、便秘、歯肉炎、口唇炎・口角炎[a)]、舌炎[a)]、腹部膨満感[a)] | 下血[a)] | 胸やけ |
| 肝臓 | AST上昇、ALT上昇、ビリルビン上昇 | Al-P上昇、LDH上昇 | | |
| 腎臓 | | BUN上昇、クレアチニン上昇、蛋白尿、血尿[a)] | | クレアチニンクリアランス低下 |
| 精神神経系 | | しびれ、めまい[a)]、末梢神経障害[a)] | | |
| 皮膚 | 色素沈着、脱毛 | 落屑、紅斑、表皮剥離、角化、そう痒感[a)]、爪の異常[a)] | 浮腫[a)]、紅潮[a)]、光線過敏症[a)]、糜爛[a)] | 水疱 |
| 過敏症 | | 発疹 | | |
| 循環器 | | 胸痛[a)] | 心電図異常（ST上昇、T逆転、不整脈等）[a)] | 胸内苦悶 |
| 眼 | | 流涙、眼充血、眼脂 | 結膜炎[a)] | |
| その他 | 発熱、低蛋白血症、低アルブミン血症 | 倦怠感、糖尿、頭重感、呼吸困難、顔面浮腫、手指の腫脹、鼻出血、筋肉痛、電解質異常（低ナトリウム血症、低カリウム血症、高カリウム血症、低クロール血症、高クロール血症、低カルシウム血症）、頭痛[a)]、白血球増多[a)]、CRP上昇[a)]、好酸球増多[a)] | | 耐糖能異常 |

a：使用成績調査より頻度を算出

## 14. 適用上の注意
### 14.1 薬剤調製時の注意
#### 14.1.1 注射液の調製法
レボホリナートを投与する際には、25mg製剤の場合は3～5mL、100mg製剤の場合は10～15mLの5%ブドウ糖液、生理食塩液又は電解質維持液等の溶解液を用いてレボホリナートの各バイアル内容物を溶解・採取した後、同一の溶解液を用いて全量を200～500mL（レボホリナートとして約0.75mg/mL）とし点滴静脈内注射する。なお、本剤は防腐剤を含有していないので、調製にあたっては細菌汚染に十分注意し、調製後は24時間以内に使用すること。
### 14.2 薬剤投与時の注意
#### 14.2.1 投与経路
本剤は点滴静脈内投与とし、皮下、筋肉内に投与しないこと。
#### 14.2.2 投与時
本剤の静脈内投与により、血管痛、血栓性静脈炎を起こすおそれがあるので、注射部位、注射方法等に十分注意すること。

## 15. その他の注意
### 15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 フルオロウラシル系薬剤と他の抗悪性腫瘍剤を併用した患者に、急性白血病（前白血病相を伴う場合もある）、骨髄異形成症候群（MDS）が発生したとの報告がある。
15.1.2 フルオロウラシルの異化代謝酵素であるジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ（DPD）欠損等の患者がごくまれに存在し、このような患者にフルオロウラシル系薬剤を投与した場合、投与初期に重篤な副作用（口内炎、下痢、血液障害、神経障害等）が発現するとの報告がある。
15.1.3 葉酸の投与により、ビタミン$B_{12}$欠乏による巨赤芽球性貧血（悪性貧血等）が隠蔽されるとの報告がある。

## 16. 薬物動態
### 16.1 血中濃度
#### 16.1.1 単回投与
健康成人にレボホリナート125mg/m$^2$を2時間点滴静脈内投与した時のレボホリナートの最高血漿中濃度は点滴開始2時間後にみられ、その値は7.5μg/mLである。また、半減期は0.67時間である。
癌患者にレボホリナート125、250mg/m$^2$を2時間点滴静脈内投与した時のレボホリナートの最高血漿中濃度はそれぞれ点滴開始2時間後にみられ、その値は9.7、25.9μg/mLである。また、半減期は0.92、1.17時間である[3)]。
### 16.4 代謝
健康成人及び癌患者にレボホリナートを静脈内投与後の血漿中には、代謝物として*S*-methyl tetrahydrofolate（*S*-5-$CH_3$-THF）が検出されている。*S*-5-$CH_3$-THFの$C_{max}$及びAUCは、2時間点滴静脈内投与及び静脈内投与の両投与でレボホリナートの投与量に依存して増加する[3,4)]。
### 16.5 排泄
健康成人にレボホリナート125mg/m$^2$を2時間点滴静脈内投与した時、レボホリナートあるいは*S*-5-$CH_3$-THFとして尿中に排泄され、それぞれの累積尿中排泄率は投与24時間後で投与量の46.4%、31.8%である[3)]。

## 17. 臨床成績
### 17.1 有効性及び安全性に関する試験
**〈胃癌及び結腸・直腸癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル療法〉**
#### 17.1.1 国内臨床試験
国内で実施されたレボホリナート・フルオロウラシル療法の臨床試験成績の概要は以下のとおりである。

| 疾患名 | 奏効率（有効以上例/適格例） |
|---|---|
| 胃癌 | 29.8%（50/168） |
| 結腸・直腸癌 | 30.2%（54/179） |

**〈治癒切除不能な膵癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法〉**
#### 17.1.2 海外第Ⅱ/Ⅲ相試験
化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験[5,6)]におけるFOLFIRINOX法群（1クールを2週間として第1日目にオキサリプラチン85mg/m$^2$、ホリナート400mg/m$^{2}$[注1)]、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m$^2$を点滴静注し、引き続きフルオロウラシル400mg/m$^2$を急速静脈内投与、フルオロウラシル2400mg/m$^2$を46時間かけて持続静注）とゲムシタビン塩酸塩（GEM）単独投与群（GEM1000mg/m$^2$の週1回点滴投与を7週連続し、8週目は休薬する。その後は、週1回点滴投与を3週連続し、4週目は休薬として、これを4週毎に繰り返す）の中間解析時の成績は次表のとおりであった。対象患者はECOG[注2)] Performance status 0及び1であった。登録において2つの遺伝子多型（*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*）に関する基準は設定されなかった。また、登録時の選択基準として、好中球数（1,500/mm$^3$以上）、総ビリルビン値（施設基準値上限の1.5倍以下）等が設定された。

| 疾患名 | 投与群 | 例数（ITT） | 生存期間（主要評価項目） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 中央値（月） | ハザード比 P値[注3] |
| 化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌 | FOLFIRINOX法 | 127 | 10.5 | 0.62 P＜0.001 |
| | GEM単独投与 | 128 | 6.9 | |

注1：ホリナート400mg/m²は本剤200mg/m²に相当する。
注2：Eastern Cooperative Oncology Group
注3：log-rank検定

#### 17.1.3 国内第Ⅱ相試験

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌を対象とした第Ⅱ相臨床試験におけるFOLFIRINOX法(1サイクルを2週間として第1日目にオキサリプラチン85mg/m²、本剤200mg/m²、イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m²を点滴静注し、引き続きフルオロウラシル400mg/m²を急速静脈内投与、フルオロウラシル2400mg/m²を46時間かけて持続静注)の成績は次表のとおりであった。対象患者はECOG[注1] Performance status 0及び1であった。2つの遺伝子多型（*UGT1A1*6*、*UGT1A1*28*）について、いずれかをホモ接合体（*UGT1A1*6/*6*、*UGT1A1*28/*28*）又はいずれもヘテロ接合体（*UGT1A1*6/*28*）としてもつ患者は除外された。また、1サイクル目の投与可能条件として、好中球数(2,000/mm³以上)、総ビリルビン値（施設基準値上限以下）等が設定された。

| 疾患名 | 奏効率（有効例/適格例） |
|---|---|
| 化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌 | 38.9%（14/36） |

注1：Eastern Cooperative Oncology Group

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

レボホリナートは、Biochemical Modulationによりフルオロウラシルの抗腫瘍効果を増強させる。フルオロウラシルは活性代謝物であるフルオロデオキシウリジン一リン酸（FdUMP）が、チミジル酸合成酵素（thymidylate synthase：TS）と結合し、TS活性を阻害することにより、チミジル酸合成を抑制しDNA合成を阻害する。レボホリナートは細胞内で還元され、5, 10メチレンテトラヒドロ葉酸（5, 10-$CH_2$-THF）となる。この5, 10-$CH_2$-THFはFdUMP、TSと強固な三元複合体(ternary complex)を形成し、TSの解離を遅延させることにより、フルオロウラシルの抗腫瘍効果を増強させる。

### 18.2 抗腫瘍効果増強作用

#### 18.2.1 *in vitro*試験

ヒト結腸・直腸癌細胞（COLO201）、ヒト胃癌細胞（TMK-1、KATOⅢ、MKN28）に対し20μM濃度のレボホリナートを用いた*in vitro*試験で、フルオロウラシルの抗腫瘍効果増強作用が認められている[7)]。

#### 18.2.2 *in vivo*試験

ヒト大腸癌Co-4細胞及びヒト胃癌H-111細胞を移植したヌードマウスに対し、レボホリナート(200mg/kg)とフルオロウラシル(90mg/kg)の併用で腫瘍細胞増殖抑制効果を示す[8,9)]。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称:レボホリナートカルシウム水和物(Calcium Levofolinate Hydrate)


化学名：Monocalcium *N*-[4-({[(6*S*)-2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl}amino)benzoyl]-L-glutamate pentahydrate

分子式：$C_{20}H_{21}CaN_7O_7 \cdot 5H_2O$

分子量：601.58

性状：本品は白色～淡黄色の結晶性の粉末である。
本品は水にやや溶けにくく、メタノール又はエタノール（99.5）にほとんど溶けない。
本品は吸湿性である。

化学構造式：




旋光度：〔α〕$^{25}_{D}$：－10～－15°
（脱水及び脱溶媒物に換算したもの0.25g、pH8.1の0.2mol/Lトリス緩衝液、25mL、100mm）

## 22. 包装

〈アイソボリン点滴静注用25mg〉
10バイアル

〈アイソボリン点滴静注用100mg〉
5バイアル

## 23. 主要文献


*1) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書 レボホリナートカルシウム（小腸癌）
*2) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書 レボホリナートカルシウム（治癒切除不能な進行・再発の胃癌）
3) 川田　和仁ほか：薬理と治療.1994；22（9）：3889-3904
4) 佐々木　常雄ほか：癌と化学療法.1993；20（4）：485-491
5) Conroy, T. et al.：N Engl J Med.2011；364（19）：1817-1825
6) 社内資料：膵癌FOLFIRINOX法に関する資料　[L20131121004]
7) Sugimoto Y. et al.：Cancer Chemother Pharmacol.1992；30：417-422
8) Kase S. et al.：Surg Today.1993；23（7）：615-620
9) 加瀬　卓ほか：日本外科学会雑誌.1993；94（6）：659


## 24. 文献請求先及び問い合わせ先


ファイザー株式会社　製品情報センター
〒151-8589　東京都渋谷区代々木3-22-7
学術情報ダイヤル　0120-664-467
FAX　03-3379-3053


## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

ファイザー株式会社
東京都渋谷区代々木3-22-7

Ⓡ登録商標

＊＊2025年4月改訂（第6版）
＊2024年3月改訂

貯　　法：2～8℃保存
＊有効期間：36箇月

| 日本標準商品分類番号 |
|---|
| 874291 |

抗悪性腫瘍剤／
抗VEGF注1）ヒト化モノクローナル抗体
ベバシズマブ（遺伝子組換え）注

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品注2）

| | 点滴静注用100mg/4mL | 点滴静注用400mg/16mL |
|---|---|---|
| 承認番号 | 21900AMX00910 | 21900AMX00921 |
| 販売開始 | 2007年6月 | |

# アバスチン®点滴静注用100mg/4mL
# アバスチン®点滴静注用400mg/16mL
# AVASTIN® for Intravenous Infusion

CHUGAI
Roche ロシュ グループ

注1）VEGF：Vascular Endothelial Growth Factor（血管内皮増殖因子）
注2）注意－医師等の処方箋により使用すること

## 1．警告

1.1 本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

1.2 消化管穿孔があらわれ、死亡に至る例が報告されている。本剤の投与中に、消化管穿孔と診断された場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行い、以降、本剤を再投与しないこと。［9.1.1、11.1.2参照］

1.3 創傷治癒遅延による合併症（創し開、術後出血等）があらわれることがある。

1.3.1 手術後の患者に本剤を投与する場合は、術創の状態を確認し、投与の可否を検討すること。大きな手術の術創が治癒していない場合は、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合を除き、本剤を投与しないこと。［8.1、9.1.2、11.1.4参照］

1.3.2 本剤の投与中に創傷治癒遅延による合併症があらわれた場合は、創傷が治癒するまで本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。［8.1、9.1.2、11.1.4参照］

1.3.3 本剤の投与終了後に手術を行う場合は、本剤の投与終了からその後の手術まで十分な期間をおくこと。［8.1、9.1.2、11.1.4参照］

1.4 本剤の投与により腫瘍関連出血のリスクが高まるおそれがある。脳腫瘍（脳転移を含む）を有する患者に本剤を投与した場合、脳出血があらわれるおそれがある。本剤の投与中に重度の出血があらわれた場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行い、以降、本剤を再投与しないこと。［8.4、9.1.3、11.1.5参照］

1.5 本剤の投与により、肺出血（喀血）があらわれ、死亡に至る例が報告されている。観察を十分に行い、肺出血（喀血）があらわれた場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行い、以降、本剤を再投与しないこと。［2.2、11.1.5参照］

＊＊1.6 脳卒中、一過性脳虚血発作、心筋梗塞、狭心症、脳虚血、脳梗塞等の動脈血栓塞栓症があらわれ、死亡に至る例が報告されている。観察を十分に行い異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。動脈血栓塞栓症があらわれた患者には、本剤を再投与しないこと。［9.1.5、11.1.6参照］

1.7 高血圧性脳症又は高血圧性クリーゼがあらわれ、死亡に至る例が報告されている。これらの事象があらわれた場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。このような患者には、以降、本剤を再投与しないこと。また、本剤の投与期間中は血圧を定期的に測定すること。［8.2、11.1.7参照］

1.8 可逆性後白質脳症症候群があらわれることがある。可逆性後白質脳症症候群が疑われた場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。［11.1.8参照］

## 2．禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

2.2 喀血（2.5mL以上の鮮血の喀出）の既往のある患者［1.5、11.1.5参照］

## 3．組成・性状

### 3.1 組成

| 販売名 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | アバスチン点滴静注用400mg/16mL |
|---|---|---|
| 有効成分 | ベバシズマブ（遺伝子組換え）注）100mg | ベバシズマブ（遺伝子組換え）注）400mg |
| 添加剤 | トレハロース水和物 240mg<br>リン酸二水素ナトリウム一水和物 23.2mg<br>無水リン酸一水素ナトリウム 4.8mg<br>ポリソルベート20 1.6mg | トレハロース水和物 960mg<br>リン酸二水素ナトリウム一水和物 92.8mg<br>無水リン酸一水素ナトリウム 19.2mg<br>ポリソルベート20 6.4mg |

注）本剤は、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。製造工程の培地成分としてブタ由来成分（ペプトン）を使用している。

### 3.2 製剤の性状

| 販売名 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | アバスチン点滴静注用400mg/16mL |
|---|---|---|
| 剤形 | 注射剤（バイアル） | |
| 性状 | 澄明～乳白光を呈する、無色～微褐色の液 | |
| pH | 5.9～6.3 | |
| 浸透圧比 | 約1（日局生理食塩液に対する比） | |

## 4．効能又は効果

○治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
○扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
○手術不能又は再発乳癌
○悪性神経膠腫
○卵巣癌
○進行又は再発の子宮頸癌
○切除不能な肝細胞癌

## 5．効能又は効果に関連する注意

〈治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌及び扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

5.1 術後補助療法において、本剤の有効性及び安全性は確認されていない。

5.2「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.1-17.1.11参照］

〈手術不能又は再発乳癌〉

5.3 術後薬物療法において、本剤の有効性及び安全性は確認されていない。

5.4 延命効果は示されていない。［17.1.13参照］

5.5「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、HER 2及びホルモン受容体の発現状況等を踏まえて本剤投与の必要性を検討し、適応患者の選択を行うこと。［17.1.12、17.1.13参照］

〈悪性神経膠腫〉

5.6「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、治療歴、病理組織型等を踏まえて適応患者の選択を行うこと。［17.1.14、17.1.15参照］

〈卵巣癌〉
5.7 FIGO StageⅢ以上の卵巣癌患者に投与すること。
5.8「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.16参照]
〈進行又は再発の子宮頸癌〉
5.9「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.17参照]
〈切除不能な肝細胞癌〉
5.10 局所療法（経皮的エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝固療法、肝動脈塞栓療法/肝動脈化学塞栓療法、放射線療法等）の適応となる肝細胞癌患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。
5.11「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、臨床試験に組み入れられた患者の肝機能障害の程度等を踏まえて適応患者の選択を行うこと。[17.1.18参照]

## 6. 用法及び用量

〈治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉
他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ（遺伝子組換え）として1回5mg/kg（体重）又は10mg/kg（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は2週間以上とする。
他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ（遺伝子組換え）として1回7.5mg/kg（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。
〈扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、進行又は再発の子宮頸癌〉
他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ（遺伝子組換え）として1回15mg/kg（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。
〈手術不能又は再発乳癌〉
パクリタキセルとの併用において、通常、成人にはベバシズマブ（遺伝子組換え）として1回10mg/kg（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は2週間以上とする。
〈悪性神経膠腫〉
通常、成人にはベバシズマブ（遺伝子組換え）として1回10mg/kg（体重）を2週間間隔又は1回15mg/kg（体重）を3週間間隔で点滴静脈内注射する。なお、患者の状態により投与間隔は適宜延長すること。
〈卵巣癌〉
他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ（遺伝子組換え）として1回10mg/kg（体重）を2週間間隔又は1回15mg/kg（体重）を3週間間隔で点滴静脈内注射する。なお、患者の状態により投与間隔は適宜延長すること。
〈切除不能な肝細胞癌〉
アテゾリズマブ（遺伝子組換え）との併用において、通常、成人にはベバシズマブ（遺伝子組換え）として1回15mg/kg（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉
7.1 本剤と併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」の項の内容を熟知した上で、選択すること。[17.1.1-17.1.18参照]
7.2 再発悪性神経膠腫以外における本剤単独投与での有効性及び安全性は確立していない。
7.3 初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
〈治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉
7.4 本剤は、フッ化ピリミジン系薬剤を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用により投与すること。[17.1.1-17.1.7参照]
7.5 本剤の用法・用量は、「17.臨床成績」の項の内容を熟知した上で、本剤と併用する他の抗悪性腫瘍剤及び患者のがん化学療法歴に応じて選択すること。[17.1.1-17.1.7参照]
〈扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
7.6 本剤は白金系抗悪性腫瘍剤を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用により開始すること。[17.1.8-17.1.11参照]
〈手術不能又は再発乳癌〉
7.7 本剤はパクリタキセルとの併用により開始すること。[17.1.12、17.1.13参照]
〈悪性神経膠腫〉
7.8 初発悪性神経膠腫の場合は、本剤は放射線照射及びテモゾロミドとの併用により開始すること。[17.1.15参照]
7.9 本剤の用法・用量は、「17.臨床成績」の項の内容を熟知した上で、患者の治療歴に応じて選択すること。[17.1.14、17.1.15参照]
〈卵巣癌〉
7.10 本剤と併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で選択すること。[17.1.16参照]
7.11 本剤とカルボプラチン及びパクリタキセルを併用する場合は、併用投与終了後も本剤単独投与を継続すること（本剤を継続投与しない場合の有効性は確認されていない）。[17.1.16参照]
〈進行又は再発の子宮頸癌〉
7.12 本剤はパクリタキセルを含む他の抗悪性腫瘍剤との併用により開始すること。[17.1.17参照]
7.13 日本人患者においては、本剤はパクリタキセル及びノギテカンとの併用投与の経験はない。

## 8. 重要な基本的注意

8.1 創傷治癒遅延による合併症があらわれることがある。本剤の投与終了後に手術を行う場合は、本剤の投与終了からその後の手術まで十分な期間をおくこと。本剤の最終投与から手術までの適切な間隔は明らかになっていないが、本剤の半減期を考慮すること。[1.3.1-1.3.3、9.1.2、11.1.4、16.1.1参照]
8.2 高血圧があらわれることがあるので、投与期間中は血圧を定期的に測定し、適切な処置を行うこと。[1.7、11.1.7参照]
8.3 蛋白尿があらわれることがあるので、投与期間中は尿蛋白を定期的に検査することが望ましい。[11.1.9参照]
8.4 脳転移を疑う症状がなく、本剤を含むがん化学療法が開始された患者においても、慎重に患者を観察し、神経学的異常が疑われた場合には脳転移及び脳出血の可能性を考慮して、本剤の投与中止を含めて適切な対応を行うこと。[1.4、9.1.3、11.1.5参照]
8.5 骨髄抑制があらわれることがあるので、定期的に血液検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.10参照]
8.6 血栓性微小血管症があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.14参照]
8.7 卵巣癌に対して、他の抗悪性腫瘍剤との併用において本剤を1回10mg/kg（体重）、2週間間隔で使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書」[1)]等）を熟読すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1.1 消化管など腹腔内の炎症を合併している患者
消化管穿孔があらわれるおそれがある。[1.2、11.1.2参照]

#### 9.1.2 大きな手術の術創が治癒していない患者
創傷治癒遅延による合併症があらわれるおそれがある。臨床試験において大きな手術後28日間経過していない患者に本剤を投与した経験はない。[1.3.1-1.3.3、8.1、11.1.4参照]

#### 9.1.3 脳転移を有する患者
脳腫瘍（脳転移を含む）を有する患者に本剤を投与する場合は、観察を十分に行い、脳出血が疑われるような症状が認められた場合は、本剤の投与中止を含めて適切な対応を行うこと。脳転移を有する患者で脳出血を認めた例が報告され、また、初発膠芽腫患者を対象とした国際共同臨床試験において、本剤の投与により脳出血の発現率が高くなる傾向が認められている。[1.4、8.4、11.1.5参照]

#### 9.1.4 先天性出血素因、凝固系異常のある患者
出血があらわれるおそれがある。

**9.1.5 血栓塞栓症の既往のある患者**

心筋梗塞、脳梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症などがあらわれるおそれがある。[1.6、11.1.6参照]

**9.1.6 糖尿病の患者**

動脈血栓塞栓症の発現リスクが高くなるおそれがある。

**9.1.7 高血圧症の患者**

高血圧が悪化するおそれがある。蛋白尿の発現率が上昇することがある。

**9.1.8 うっ血性心不全又は冠動脈疾患などの重篤な心疾患のある患者**

うっ血性心不全が悪化又はあらわれるおそれがある。[11.1.12参照]

**＊＊9.4 生殖能を有する者**

妊娠する可能性がある女性には、本剤投与中及び最終投与後6カ月間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。[9.5、15.2.1参照]

**9.5 妊婦**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。本剤を投与された患者で奇形を有する児の出産が報告されている。また、本剤をウサギ（器官形成期）に投与したところ、胚・胎児毒性及び催奇形性が認められた。[9.4、15.2.1参照]

**9.6 授乳婦**

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤のヒト乳汁中への移行性については不明であるが、ヒトIgGは乳汁中に移行することが知られている。

**9.7 小児等**

**9.7.1** 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

**9.7.2** 小児等で骨壊死（顎以外の部位）があらわれるとの報告がある。

**＊＊9.8 高齢者**

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。海外臨床試験において、65歳未満の患者と比較し、65歳以上の患者で本剤投与による脳卒中、一過性脳虚血発作、心筋梗塞等の動脈血栓塞栓症の発現率の上昇が認められた。

## 10．相互作用

**10.2 併用注意（併用に注意すること）**

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| 抗凝固剤<br>ヘパリン<br>ワルファリン等 | 出血があらわれるおそれがある。 | 出血リスクを増強させるおそれがある。 |

## 11．副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

**11.1 重大な副作用**

**11.1.1 ショック、アナフィラキシー**（1.9%）

ショック、アナフィラキシー・infusion reaction（蕁麻疹、呼吸困難、口唇浮腫、咽頭浮腫等）があらわれることがある。過敏症状が認められた場合は、本剤の投与を中止し、薬物治療（アドレナリン、副腎皮質ステロイド剤、抗ヒスタミン剤等）等の適切な処置をすること。

**11.1.2 消化管穿孔**（0.9%）

死亡に至る例が報告されている。消化管穿孔と診断された場合は、重篤な消化管穿孔が再発するおそれがあるので、本剤を再投与しないこと。[1.2、9.1.1参照]

**11.1.3 瘻孔**（0.3%）

消化管瘻（腸管皮膚瘻、腸管瘻、気管食道瘻等）又は消化管以外の瘻孔（気管支胸膜瘻、泌尿生殖器瘻、胆管瘻等）があらわれることがあり、死亡に至る例が報告されている。また、気管食道瘻又は重度の瘻孔があらわれた患者では、本剤を再投与しないこと。子宮頸癌を対象とした海外臨床試験では、消化管腟瘻（直腸腟瘻等）（8.3%）、消化管瘻（直腸瘻）（0.5%）、消化管以外の瘻（膀胱腟瘻等）（1.8%）が認められており、また発現例の多くは、骨盤部への放射線治療歴のある患者であったことが報告されている。

**11.1.4 創傷治癒遅延**

創傷治癒に影響を及ぼす可能性が考えられ、創傷治癒遅延による創し開（0.5%）及び術後出血（0.4%）等の合併症があらわれることがある。創傷治癒遅延による合併症があらわれた場合は、創傷が治癒するまで本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。[1.3.1-1.3.3、8.1、9.1.2参照]

**11.1.5 出血**（19.3%）

腫瘍関連出血を含む、消化管出血（吐血、下血）（2.0%）、肺出血（血痰・喀血）（1.2%）、脳出血（0.1%）等があらわれることがある。また、鼻出血（15.1%）、歯肉出血（1.4%）、腟出血（0.1%未満）等の粘膜出血があらわれることがある。重度の出血においては死亡に至る例が報告されているため、肺出血（喀血）又は重度の出血があらわれた場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、このような出血があらわれた患者では、重度の出血が再発するおそれがあるので、本剤を再投与しないこと。[1.4、1.5、2.2、8.4、9.1.3参照]

**＊＊11.1.6 血栓塞栓症**

脳卒中（頻度不明）、一過性脳虚血発作（0.1%）、心筋梗塞（0.1%未満）、狭心症（0.1%）、脳虚血（頻度不明）、脳梗塞（0.2%）等の動脈血栓塞栓症、及び深部静脈血栓症（0.2%）、肺塞栓症（0.1%）等の静脈血栓塞栓症があらわれることがあり、死亡に至る例が報告されている。動脈血栓塞栓症があらわれた患者では、再発時に死亡に至る可能性もあるので、本剤を再投与しないこと。[1.6、9.1.5参照]

**11.1.7 高血圧性脳症**（頻度不明）、**高血圧性クリーゼ**（頻度不明）

コントロール不能の高血圧、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼがあらわれた場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼが再発するおそれがあるので、このような患者には本剤を再投与しないこと。高血圧の発現率は本剤の用量に相関して上昇する傾向が示唆されている。[1.7、8.2参照]

**11.1.8 可逆性後白質脳症症候群**（0.1%未満）

可逆性後白質脳症症候群（症状：痙攣発作、頭痛、精神状態変化、視覚障害、皮質盲等）があらわれることがあり、高血圧を伴う例と伴わない例が報告されている。観察を十分に行い、可逆性後白質脳症症候群が疑われた場合は、本剤の投与を中止し、血圧のコントロール、抗痙攣薬の投与等の適切な処置を行うこと。[1.8参照]

**11.1.9 ネフローゼ症候群**（0.1%未満）

高度の蛋白尿等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。蛋白尿の発現率は本剤の用量に相関して上昇する傾向が示唆されている。[8.3参照]

**11.1.10 骨髄抑制**

他の抗悪性腫瘍剤との併用において汎血球減少症（0.1%未満）、好中球減少（24.5%）、白血球減少（24.3%）、貧血（8.7%）、血小板減少（10.4%）があらわれることがある。なお、臨床試験で他の抗悪性腫瘍剤に本剤を併用した群において、併用していない群と比較して、高度の好中球減少症、発熱性好中球減少症の発現頻度が高まることが報告されている。[8.5参照]

**11.1.11 感染症**（10.0%）

好中球減少の有無にかかわらず肺炎（0.6%）、敗血症（0.2%）、壊死性筋膜炎（頻度不明）等の感染症があらわれ、死亡に至る例が報告されている。なお、壊死性筋膜炎については、創傷治癒遅延、消化管穿孔、瘻孔に続発した例が報告されている。

**11.1.12 うっ血性心不全**（0.1%未満）

乳癌を対象とした海外臨床試験では、グレード3以上の左室機能不全が2.2%の頻度で認められており、また発現例の多くは、アントラサイクリン系薬剤の投与歴、左胸壁への放射線治療歴等のある患者であったことが報告されている。[9.1.8参照]

**11.1.13 間質性肺炎**（0.4%）

**11.1.14 血栓性微小血管症**（頻度不明）

血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群等の血栓性微小血管症があらわれることがある。破砕赤血球を伴う貧血、血小板減少、腎機能障害等が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。[8.6参照]

**11.1.15 動脈解離**（0.1%未満）

大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがある。

**11.2 その他の副作用**

| | 5%以上 | 1～5%未満 | 1%未満 | 頻度不明 |
|---|---|---|---|---|
| 精神神経系 | 神経毒性（末梢性感覚ニューロパシー、末梢性運動ニューロパシー、感覚神経障害等）（15.8%） | 味覚異常、頭痛、不眠症、浮動性めまい | 神経痛、体位性めまい、不安、嗅覚錯誤、失神、痙攣、傾眠、構語障害 | |
| 消化器 | 食欲減退（14.7%）、悪心（14.1%）、口内炎（11.7%）、下痢、嘔吐、便秘 | 腹痛、歯肉炎、口唇炎、胃不快感 | 歯周病、消化不良、胃炎、消化管潰瘍、歯痛、痔核、腸炎、歯肉痛、齲歯、逆流性食道炎、腸閉塞、胃腸炎、舌炎、肛門周囲痛、歯の脱落 | 胃腸障害 |
| 泌尿器 | 尿蛋白陽性（10.5%） | 尿中血陽性 | BUN増加、血中クレアチニン増加 | |
| 肝臓 | 肝機能異常（AST上昇、ALT上昇、γ-GTP増加、LDH増加等） | 血中ビリルビン増加 | | |
| 血液・凝固 | | リンパ球数減少、フィブリンDダイマー増加 | INR増加、フィブリノゲン増加、白血球数増加、APTT延長、好中球数増加、プロトロンビン時間延長 | |
| 心・血管系 | 高血圧（18.2%） | | 動悸、洞性頻脈 | 上室性頻脈 |
| 皮膚 | 脱毛症（10.7%）、発疹 | 色素沈着、手足症候群、爪の障害、瘙痒症 | 紅斑、蕁麻疹、皮膚乾燥、皮膚剥脱、皮膚炎、爪囲炎、爪色素沈着、過角化 | 皮膚変色、剥脱性皮膚炎 |
| 筋・骨格 | 関節痛 | 筋痛、背部痛 | 四肢痛、筋骨格硬直、筋骨格痛（肩部痛、殿部痛等）、筋力低下、側腹部痛 | |
| 呼吸器 | | 発声障害、しゃっくり、咽頭喉頭痛、鼻漏 | 咳嗽、呼吸困難、鼻炎、気管支炎、低酸素症 | 肺高血圧症 |
| 眼 | | | 結膜炎、流涙増加、霧視 | 眼障害 |
| 代謝 | | 血中コレステロール増加、血中アルブミン減少 | 血中ナトリウム減少、血中リン減少、血中尿酸増加、高カリウム血症、総蛋白減少、高脂血症、血中カルシウム減少、尿中ブドウ糖陽性、高カルシウム血症、血中クロール減少、高血糖、高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症、血中ナトリウム増加、低マグネシウム血症、低カリウム血症 | |
| その他 | 疲労・倦怠感（15.5%）、発熱 | 上気道感染（鼻咽頭炎等）、体重減少、Al-P上昇、末梢性浮腫、潮紅、CRP上昇、注射部位反応（疼痛等） | 膀胱炎、無力症、ほてり、体重増加、胸痛、胸部不快感、膿瘍、脱水、耳鳴、カテーテル関連合併症（感染、炎症等）、口腔ヘルペス、回転性めまい、毛包炎、顔面浮腫、熱感、静脈炎、帯状疱疹、感染性腸炎、不規則月経、耳不快感、疼痛、尿路感染 | 蜂巣炎、鼻中隔穿孔、卵巣機能不全（無月経等）、骨髄痛 |

注）発現頻度は治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する国内臨床試験［JO18157試験、JO18158試験及びJO19380試験］、未治療の扁平上皮癌を除く進行・再発の非小細胞肺癌に対する国内臨床試験［JO19907試験］、手術不能又は再発乳癌に対する国内臨床試験［JO19901試験］、初発の膠芽腫に対する国際共同臨床試験［BO21990試験］（国内症例）、再発悪性神経膠腫に対する国内臨床試験［JO22506試験］、卵巣癌に対する国際共同臨床試験［GOG-0218試験］（国内症例）、進行又は再発の子宮頸癌に対する国内臨床試験［JO29569試験］、切除不能な肝細胞癌に対する国際共同臨床試験［YO40245試験］（国内症例）及び製造販売後の特定使用成績調査を含む。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

**14.1.1** 本剤の投与時には必要量を注射筒で抜き取り、日局生理食塩液に添加して約100mLとする。

〈必要抜き取り量計算式〉

$$\text{抜き取り量（mL）} = \text{体重（kg）} \times \frac{\text{1回投与量（mg/kg）}}{25\ \text{（mg/mL）}}$$

| 1回投与量 | 必要抜き取り量（mL）計算式 |
|---|---|
| 5mg/kg | 抜き取り量(mL)＝体重(kg)×0.2(mL/kg) |
| 7.5mg/kg | 抜き取り量(mL)＝体重(kg)×0.3(mL/kg) |
| 10mg/kg | 抜き取り量(mL)＝体重(kg)×0.4(mL/kg) |
| 15mg/kg | 抜き取り量(mL)＝体重(kg)×0.6(mL/kg) |

**14.1.2** 日局生理食塩液以外は使用しないこと。

**14.1.3** 用時調製し、調製後は速やかに使用すること。また、残液は廃棄すること。

### 14.2 薬剤投与時の注意

本剤とブドウ糖溶液を混合した場合、ベバシズマブの力価の減弱が生じるおそれがあるため、ブドウ糖溶液との混合を避け、本剤とブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

**15.1.1** 海外臨床試験において本剤と化学療法を併用した閉経前女性患者は、化学療法のみを実施した患者と比較して、卵巣機能不全（β-HCG妊娠検査陰性で3カ月以上継続する無月経かつFSH≧30MIU/mL）の発現率が高いとの報告があり、妊孕性低下の可能性が示唆された。なお、本剤中止後にほとんどの患者で卵巣機能の回復が認められているが、本剤の妊孕性への長期的な影響は不明である。

**15.1.2** 本剤投与後に顎骨壊死が発現したとの報告があり、多くはビスホスホネート系製剤を投与中あるいは投与経験がある患者であった。また、本剤を含む血管新生阻害薬とビスホスホネート系製剤を併用時に顎骨壊死の発現が増加する可能性が示唆されたとの報告がある。

**15.1.3** 適応外疾患に対する硝子体内（用法・用量外）投与例において、網膜剥離、眼内炎、硝子体出血、網膜出血等の眼障害があらわれることが報告されている。本剤を硝子体内投与するにあたって、本剤の不適切な無菌操作下での小分けにより、重篤な眼感染症があらわれ、失明に至った例が海外で報告されている。また、海外において、心筋梗塞、脳卒中等があらわれることが報告されている[2)-4)]。

### 15.2 非臨床試験に基づく情報

**15.2.1** ウサギの胚・胎児試験（10～100mg/kgを器官形成期投与）において、胎児体重の減少、吸収胚の増加、外形・骨格異常を有する胎児の増加が認められた。［9.4、9.5参照］

**15.2.2** 若齢カニクイザルでは本剤の反復投与（2～50mg/kg、週1回又は週2回投与）により、長骨成長板で骨端軟骨異形成が認められた。


## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 単回投与

結腸・直腸癌患者18例にベバシズマブ3、5又は10mg/kg[注1)]を90分間点滴静注したときの血清中濃度は以下のとおりであった。ベバシズマブの血清中からの消失は緩やかで、AUCは投与量に比例して増加した[5)]。［8.1参照］

単回投与後の血清中濃度（N=6、mean±SD）




単回投与時の薬物動態パラメータ

| 投与量 (mg/kg) | $AUC_{inf}$ (μg・day/mL) | $V_d$ (mL/kg) | CL (mL/day/kg) | $t_{1/2}$ (day) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 852.3±237.4 | 62.50±11.10 | 3.80±1.20 | 12.33±4.52 |
| 5 | 1387.2±426.9 | 73.47±18.34 | 3.94±1.34 | 13.40±2.82 |
| 10 | 2810.9±344.8 | 60.26± 8.93 | 3.61±0.48 | 11.68±1.74 |

N＝6、mean±SD


注1）本剤の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する承認用量は1回5mg/kg、7.5mg/kg及び10mg/kgである。

#### 16.1.2 反復投与

〈手術不能又は再発乳癌〉

転移・再発乳癌患者にパクリタキセルとの併用によりベバシズマブ10mg/kgの点滴静注を2週間隔で繰り返したときの血清中ベバシズマブ濃度推移は以下のとおりであった。初回投与70日後（投与6回目）の最低及び最高血清中濃度は各々149.0±37.4（47例）及び397.8±77.9（43例）μg/mLであり、投与6回目以降の濃度はほぼ一定の値を示した[6)]。


反復投与時（10mg/kg/2週間）の血清中濃度（N=31～67、mean±SD）




〈扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

非小細胞肺癌患者53例にカルボプラチン・パクリタキセル療法との併用によりベバシズマブ15mg/kgの点滴静注を3週間隔で繰り返したときの血清中ベバシズマブ濃度推移は以下のとおりであった。初回投与63日後（投与4回目）の最低及び最高血清中濃度は各々115.9±45.6（20例）及び450.3±97.3（19例）μg/mLであり、投与4回目以降の濃度はほぼ一定の値を示した[7)]。

反復投与時（15mg/kg/3週間）の血清中濃度（N=8～53、mean±SD）




#### 16.1.3 母集団薬物動態解析の成績

491例の患者に1～20mg/kg[注2)]の用量のベバシズマブを1週間隔、2週間隔、若しくは3週間隔で点滴静注したときの血清中濃度を用い、母集団薬物動態解析を実施した。2-コンパートメントモデルで解析したときの男性のクリアランスは0.262L/day、女性は0.207L/dayであった。また、中心コンパートメントの分布容積については、男性は3.25L、女性は2.66Lであった（外国人データ）。

注2）本剤の承認用量は1回5mg/kg、7.5mg/kg、10mg/kg及び15mg/kgである。

### 16.3 分布

ウサギに$^{125}$I標識ベバシズマブを単回静脈内投与したところ、いずれの組織においても特異的な取り込みは認められず、本剤の分布はほぼ血漿に限られていた[8)]。

### 16.5 排泄

ウサギに$^{125}$I標識ベバシズマブを単回静脈内投与したところ、投与48時間後の尿中に未変化体は検出されなかった[9)]。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉

#### 17.1.1 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（JO19380試験）

未治療の進行・再発結腸・直腸癌患者を対象に、カペシタビン・オキサリプラチン療法（XELOX療法）と本剤1回7.5mg/kg併用投与（21日を1サイクルとし、第1日目に、他剤投与に先立ち本剤を投与）による第Ⅰ/Ⅱ相試験を実施した。奏効率は71.9%（PR41/57例）であった。無増悪生存期間の中央値は336.0日（95%信頼区間：293－380日）であった。［5.2、7.1、7.4、7.5参照］副作用発現率は、XELOX療法＋本剤群で100%（58/58例）であった。主な副作用は、末梢性感覚ニューロパシー93.1%（54/58例）、食欲不振89.7%（52/58例）、疲労82.8%（48/58例）、手掌・足底発赤知覚不全症候群77.6%（45/58例）、悪心74.1%（43/58例）であった[10)]。

#### 17.1.2 国内安全性確認試験（JO18158試験）

進行・再発結腸・直腸癌を対象に、オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナートカルシウム療法（FOLFOX 4療法）と本剤の併用投与による安全性確認試験を、未治療例[注1)]には本剤5mg/kg、既治療例[注2)]には10mg/kgの用量（14日を1サイクルとし、第1日目に、他剤投与に先立ち本剤を投与）により実施した。奏効率は未治療例79.4%（PR27/34例）で、既治療例で47.8%（PR11/23例）で、全例でSD以上であった（主治医評価）。［5.2、7.1、7.4、7.5参照］

注1）未治療例：初発進行病巣又は再発巣（術後補助療法終了後6カ月以上経過して確認されたもの）に対する化学療法を受けていない患者

注2）既治療例：先行化学療法において病勢進行・再発の認められた患者

副作用発現率は、本剤5mg/kg群で100%（38/38例）、本剤10mg/kg群で100%（26/26例）であった。主な副作用は、本剤5mg/kg群で食欲不振97.4%（37/38例）、好中球数減少92.1%（35/38例）、悪心86.8%（33/38例）、

白血球数減少78.9%（30/38例）、下痢73.7%（28/38例）であり、本剤10mg/kg群で白血球数減少100%（26/26例）、好中球数減少96.2%（25/26例）、食欲不振88.5%（23/26例）、悪心84.6%（22/26例）、血小板数減少80.8%（21/26例）であった[11]。

**17.1.3 国内第Ⅰ相試験（JO18157試験）**

既治療又は未治療の進行・再発結腸・直腸癌患者18例を対象としたフルオロウラシル・レボホリナートカルシウム療法（5-FU/l-LV療法）と本剤の併用投与（14日を1サイクルとし、第1日目に、他剤投与終了直後に本剤を投与）による第Ⅰ相試験を実施した。奏効率は16.7%（PR3/18例）で、5mg/kgでは6例全例がSD、10mg/kgでは6例中2例がPR、4例がSDであった。[5.2、7.1、7.4、7.5参照]

副作用発現率は、5-FU/l-LV療法＋本剤5mg/kg群で100%（6/6例）、5-FU/l-LV療法＋本剤10mg/kg群で100%（6/6例）であった。主な副作用は、5-FU/l-LV療法＋本剤5mg/kg群で好中球数減少66.7%（4/6例）、白血球数減少66.7%（4/6例）、血小板数減少66.7%（4/6例）、口内炎66.7%（4/6例）であり、5-FU/l-LV療法＋本剤10mg/kg群で食欲不振83.3%（5/6例）、悪心66.7%（4/6例）、鼻出血66.7%（4/6例）、高血圧66.7%（4/6例）であった[12]。

**17.1.4 海外第Ⅲ相無作為化比較試験（NO16966試験）**

未治療の転移性結腸・直腸癌患者において、オキサリプラチン・フルオロウラシル・ホリナートカルシウム療法（FOLFOX 4療法）又はXELOX療法に本剤又はプラセボを投与する2×2要因の二重盲検比較試験を実施した。本剤の用量は、FOLFOX 4療法との併用では5mg/kg（14日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与に先立ち本剤を投与）、XELOX療法との併用では7.5mg/kg（21日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与に先立ち本剤を投与）とした。その結果、主要解析において、本剤併用群ではこれらのFOLFOX 4療法又はXELOX療法の化学療法のみを受けた場合に比べ、有意な無増悪生存期間の延長が認められた。副次的解析のFOLFOX 4療法＋本剤群とFOLFOX 4療法＋プラセボ群の比較では有意な差は認められなかったが、XELOX療法＋本剤群とXELOX療法＋プラセボ群の比較では有意な無増悪生存期間の延長が認められた。また、副次的評価項目である生存期間については、化学療法に本剤を併用することにより延長傾向が認められた。[5.2、7.1、7.4、7.5参照]

NO16966試験の有効性（優越性検定）に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間[注3] | | 生存期間[注4] | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| 化学療法[注5]＋プラセボ群（n＝701） | 8.02 | 0.83 P＝0.0023 | 19.91 | 0.89 P＝0.0769 |
| 化学療法[注5]＋アバスチン群（n＝699） | 9.36 | | 21.22 | |
| XELOX療法＋プラセボ群（n＝350） | 7.39 | 0.77 P＝0.0026 | 19.19 | 0.84 P＝0.0698 |
| XELOX療法＋アバスチン群（n＝350） | 9.26 | | 21.36 | |
| FOLFOX 4療法＋プラセボ群（n＝351） | 8.57 | 0.89 P＝0.1871 | 20.34 | 0.94 P＝0.4937 |
| FOLFOX 4療法＋アバスチン群（n＝349） | 9.40 | | 21.16 | |

注3）カットオフ日：2006年1月31日、主治医評価による無増悪生存期間

注4）カットオフ日：2007年1月31日

注5）化学療法：FOLFOX 4療法又はXELOX療法

副作用発現率は、FOLFOX 4療法＋本剤群で98.2%（335/341例）、XELOX療法＋本剤群で98.9%（349/353例）であった。主な副作用は、FOLFOX 4療法＋本剤群で悪心62%（213/341例）、下痢60%（205/341例）、好中球減少症55%（188/341例）、口内炎40%（137/341例）、錯感覚39%（133/341例）、嘔吐37%（127/341例）、疲労37%（127/341例）、鼻出血29%（99/341例）、無力症26%（90/341例）、食欲不振26%（88/341例）であり、XELOX療法＋本剤群で悪心64%（226/353例）、下痢62%（220/353例）、嘔吐44%（157/353例）、手掌・足底発赤知覚不全症候群39%（139/353例）、錯感覚37%（131/353例）、疲労36%（127/353例）、口内炎29%（101/353例）、食欲不振28%（100/353例）、無力症21%（73/353例）、末梢性ニューロパシー20%（69/353例）、好中球減少症20%（69/353例）であった[13]。

**17.1.5 海外第Ⅲ相無作為化比較試験（E3200試験）**

イリノテカン塩酸塩水和物及びフルオロウラシルの治療が無効となった進行又は転移性の結腸・直腸癌患者を対象に、FOLFOX 4療法群を対照とし、FOLFOX 4療法に本剤10mg/kg（14日を1サイクルとし、第1日目に他剤に先立ち本剤を投与）を併用したときの有効性を検討した。その結果、本剤併用群においては、FOLFOX 4療法群に比べ有意な生存期間の延長が認められた。また、副次的評価項目についても、無増悪生存期間の延長と高い奏効率が認められた。[5.2、7.1、7.4、7.5参照]

E3200試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 奏効率 | | 無増悪生存期間 | | 生存期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | %（有効例） | P値 | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| FOLFOX 4療法群（n＝292） | 8.6（25） | P＜0.0001 | 4.5 | 0.518 P＜0.0001 | 10.8 | 0.751 P＝0.0012 |
| FOLFOX 4療法＋アバスチン群（n＝293） | 22.2（65） | | 7.5 | | 13.0 | |

Grade3以上（血液毒性についてはGrade4以上）の副作用発現率は、FOLFOX 4療法＋本剤群で76.3%（219/287例）であった。FOLFOX 4療法群との発現率の差が2%以上であった主な副作用は、疲労18.5%（53/287例）、下痢17.8%（51/287例）、神経障害－感覚性16.4%（47/287例）、悪心10.8%（31/287例）、嘔吐10.1%（29/287例）、脱水8.7%（25/287例）、高血圧6.3%（18/287例）、腹痛5.9%（17/287例）、呼吸困難5.9%（17/287例）、神経障害－その他5.2%（15/287例）であった[14]。

**17.1.6 海外第Ⅲ相二重盲検無作為化比較試験（AVF2107g試験）**

未治療の転移性結腸・直腸癌患者を対象に、イリノテカン塩酸塩水和物・フルオロウラシル・ホリナートカルシウム療法（IFL療法）を対照群とし、IFL療法に本剤5mg/kg（14日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与終了後に本剤を投与）又はプラセボを併用投与した。その結果、本剤併用群ではIFL療法単独に比べ有意な生存期間及び無増悪生存期間の延長が認められた[15]。[5.2、7.1、7.4、7.5参照]

AVF2107g試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間 | | 生存期間 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| IFL療法＋プラセボ群（n＝411） | 6.28 | 0.577 P＜0.0001 | 15.80 | 0.714 P＜0.0001 |
| IFL療法＋アバスチン群（n＝402） | 10.58 | | 20.37 | |

有害事象発現率は、IFL療法＋本剤群で96.7%（379/392例）であった。主な有害事象は、下痢74.7%（293/392例）、白血球減少症44.4%（174/392例）、無力症32.4%（127/392例）、悪心29.8%（117/392例）、蛋白尿28.8%（113/392例）、腹痛26.5%（104/392例）、高血圧24.5%（96/392例）、嘔吐21.7%（85/392例）、疼痛19.4%（76/392例）、食欲不振15.8%（62/392例）であった[16]。

**17.1.7 海外第Ⅱ相二重盲検無作為化比較試験（AVF2192g試験）**

イリノテカン塩酸塩水和物の治療に不適と考えられる未治療の転移性結腸・直腸癌患者を対象に、フルオロウラシル・ホリナートカルシウム療法（5-FU/LV療法）を対照群とし、5-FU/LV療法に本剤5mg/kgを併用投与（14日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与終了後に本剤を投与）したときの有効性を検討した。その結果、本剤併用群では、5-FU/LV療法単独に比べ有意な無増悪生存期間の延長が認められた[17]。[5.2、7.1、7.4、7.5参照]

AVF2192g試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間 | | 生存期間 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| 5-FU/LV療法＋プラセボ群（n＝105） | 5.52 | 0.496 P＝0.0002 | 13.24 | 0.766 P＝0.0942 |
| 5-FU/LV療法＋アバスチン群（n＝104） | 9.17 | | 16.56 | |

有害事象発現率は、5-FU/LV療法＋本剤群で100%（100/100例）であった。主な有害事象は、下痢84.0%（84/100例）、無力症76.0%（76/100例）、悪心65.0%（65/100例）、腹痛47.0%（47/100例）、食欲不振43.0%（43/100例）、嘔吐40.0%（40/100例）、蛋白尿38.0%

（38/100例）、疼痛33.0%（33/100例）、高血圧32.0%（32/100例）、便秘26.0%（26/100例）、貧血26.0%（26/100例）であった[18]。

未治療の転移性結腸・直腸癌を対象とした5-FU/LV療法に本剤を併用した、上記試験を含む3試験の併合解析が行われ、本剤併用群において、対照群に比し生存期間、無増悪生存期間に有意な延長が認められたとの報告がある[19]。

**〈扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉**

**17.1.8 国内第Ⅱ相試験（JO19907試験）**

未治療の扁平上皮癌を除く進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象に、カルボプラチン・パクリタキセル療法（CP療法）を対照群とし、CP療法に本剤15mg/kgを併用（21日を1サイクルとし、第1日目に、他剤投与終了後に本剤を投与）した第Ⅱ相試験を実施した。CP療法は両群とも6サイクルまでとし、本剤の投与はCP療法の中止又は終了後も同一用法・用量で病勢進行まで継続した。その結果、本剤併用群では、CP療法に比べ有意な無増悪生存期間の延長及び奏効率の改善が認められた。[5.2、7.1、7.6参照]

JO19907試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間 | | 奏効率 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | % | P値 |
| CP療法単独群（n＝58） | 5.9 | 0.61 P＝0.0090 | 31.0 | P＝0.0013 |
| CP療法＋アバスチン群（n＝117） | 6.9 | | 60.7 | |

副作用発現率は、CP療法＋本剤群で100%（125/125例）であった。主な副作用は、好中球数減少96.8%（121/125例）、脱毛症95.2%（119/125例）、白血球数減少94.4%（118/125例）、末梢性ニューロパシー88.0%（110/125例）、ヘモグロビン減少84.0%（105/125例）であった[20]。

**17.1.9 海外第Ⅱ/Ⅲ相無作為化比較試験（E4599試験）**

未治療の扁平上皮癌を除く進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象に、CP療法を対照群とし、CP療法に本剤15mg/kgを併用（21日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与終了後に本剤を投与）したときの有効性を検討した。CP療法はいずれの群でも6サイクルまでとし、本剤の投与はCP療法の中止又は終了後も同一用法・用量で病勢進行まで継続した。その結果、本剤併用群では、CP療法に比べ有意な生存期間の延長が認められた[21]。[5.2、7.1、7.6参照]

E4599試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間 | | 生存期間 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| CP療法単独群（n＝433） | 4.5 | 0.66 P＜0.001 | 10.3 | 0.79 P＝0.003 |
| CP療法＋アバスチン15mg/kg群（n＝417） | 6.2 | | 12.3 | |

Grade3以上の副作用発現率は、本剤15mg/kg＋CP療法群で69.1%（295/427例）であった。主なGrade3以上の副作用は、好中球数減少25.8%（110/427例）、疲労14.5%（62/427例）、呼吸困難9.6%（41/427例）、末梢性感覚ニューロパシー9.1%（39/427例）、高血圧6.3%（27/427例）、感染5.4%（23/427例）、悪心4.9%（21/427例）、食欲不振4.9%（21/427例）、脱水4.7%（20/427例）、嘔吐4.4%（19/427例）であった[22]。

**17.1.10 海外第Ⅲ相二重盲検無作為化比較試験（BO17704試験）**

未治療の扁平上皮癌を除く進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象に、シスプラチン・ゲムシタビン塩酸塩療法（GC療法、ゲムシタビン塩酸塩は国内未承認用法・用量を使用）を対照群とし、GC療法に本剤7.5mg/kg[注6]（未承認）又は15mg/kgを併用投与（21日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与終了後に本剤を投与）したときの有効性を検討した。GC療法はいずれの群でも6サイクルまでとし、本剤の投与はGC療法の中止又は終了後も同一用法・用量で病勢進行まで継続した。その結果、本剤7.5mg/kg及び15mg/kg併用群の両群で、GC療法に比べ主要評価項目である無増悪生存期間の有意な延長が認められた。[5.2、7.1、7.6参照]

BO17704試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間 | | 生存期間 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| GC療法＋プラセボ群（n＝347） | 6.1 | 0.82 P＝0.0301 | 13.1 | 1.03 P＝0.7613 |
| GC療法＋アバスチン15mg/kg群（n＝351） | 6.5 | | 13.4 | |
| GC療法＋アバスチン7.5mg/kg群（n＝345） | 6.7 | 0.75 P＝0.0082 | 13.6 | 0.93 P＝0.4203 |

注6）本剤の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対する承認用量は1回15mg/kgである。

副作用発現率は、本剤7.5mg/kg[注6]＋GC療法群で95.5%（315/330例）、本剤15mg/kg＋GC療法群で95.4%（314/329例）であった。主な副作用は、本剤7.5mg/kg[注6]＋GC療法群で悪心54.8%（181/330例）、好中球減少症48.5%（160/330例）、嘔吐47.0%（155/330例）、血小板減少症37.0%（122/330例）、貧血33.3%（110/330例）、疲労27.9%（92/330例）、食欲不振24.5%（81/330例）、鼻出血23.9%（79/330例）、便秘20.9%（69/330例）、高血圧20.9%（69/330例）であり、本剤15mg/kg＋GC療法群で悪心55.6%（183/329例）、好中球減少症45.9%（151/329例）、嘔吐45.3%（149/329例）、血小板減少症34.3%（113/329例）、疲労30.7%（101/329例）、貧血30.4%（100/329例）、鼻出血28.9%（95/329例）、高血圧28.9%（95/329例）、食欲不振27.4%（90/329例）、脱毛症21.3%（70/329例）であった[23]。

**17.1.11 海外第Ⅱ相無作為化比較試験（AVF0757g試験）**

未治療の進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象に、CP療法を対照群とし、CP療法に本剤7.5mg/kg[注6]（未承認）又は15mg/kgを併用（21日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与終了後に本剤を投与）したときの有効性を検討した。CP療法はいずれの群でも6サイクルまでとし、本剤の投与はCP療法の中止又は終了後も同一用法・用量で病勢進行又は18サイクルまで継続した。扁平上皮癌患者を除いて解析した結果、本剤15mg/kg併用群では、CP療法に比べTime to disease progression（TTP）の有意な延長及び奏効率の改善が認められた。[5.2、7.1、7.6参照]

AVF0757g試験の有効性に関する成績

| 投与群 | TTP | | 奏効率 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | % | P値 |
| CP療法単独群（n＝25） | 4.0 | — | 12.0 | — |
| CP療法＋アバスチン15mg/kg群（n＝32） | 7.4 | 0.41 P＝0.0028 | 31.3 | P＝0.0857 |
| CP療法＋アバスチン7.5mg/kg群（n＝22） | 4.3 | 0.85 P＝0.5963 | 31.8 | P＝0.0976 |

副作用発現率は、本剤7.5mg/kg[注6]＋CP療法群で81.8%（18/22例）、本剤15mg/kg＋CP療法群で90.3%（28/31例）であった。主な副作用は、本剤7.5mg/kg[注6]＋CP療法群で鼻出血36.4%（8/22例）、発疹31.8%（7/22例）、疲労27.3%（6/22例）、好中球減少症22.7%（5/22例）、関節痛22.7%（5/22例）、悪心13.6%（3/22例）、喀血13.6%（3/22例）、下痢9.1%（2/22例）、口内炎9.1%（2/22例）、呼吸困難9.1%（2/22例）、脱毛症9.1%（2/22例）であり、本剤15mg/kg＋CP療法群で疲労41.9%（13/31例）、鼻出血35.5%（11/31例）、下痢29.0%（9/31例）、関節痛22.6%（7/31例）、悪心19.4%（6/31例）、口内炎19.4%（6/31例）、無力症19.4%（6/31例）、脱毛症19.4%（6/31例）、好中球減少症16.1%（5/31例）、頭痛16.1%（5/31例）、発疹16.1%（5/31例）であった[24]。

**〈手術不能又は再発乳癌〉**

**17.1.12 国内第Ⅱ相試験（JO19901試験）**

HER 2陰性で転移・再発乳癌に対する化学療法未治療患者を対象に、パクリタキセルと本剤10mg/kgを併用（28日を1サイクルとし、第1日目、8日目、15日目にパクリタキセルを、第1日目、15日目にパクリタキセル投与終了後に本剤を投与）した第Ⅱ相試験を実施した。有害事象によりいずれかの薬剤を中止した場合、もう一方の薬剤を単剤にて、同一用法・用量で病勢進行まで継続投与可能とした。無増悪生存期間の中央値は12.9カ月（95%信頼区間：11.1-18.2カ月）、奏効率は73.5%（CR 5/117例、PR 81/117例）であった[25]。[5.5、7.1、7.7参照]

副作用発現率は、本剤10mg/kg＋パクリタキセルで100%（120/120例）であった。主な副作用は、脱毛症98.3%（118/120例）、白血球数減少85.0%（102/120例）、好中球数減少75.8%（91/120例）、末梢性ニューロパシー75.0%（90/120例）、鼻出血70.8%（85/120例）、尿中蛋白陽性59.2%（71/120例）、爪の障害53.3%（64/120例）、疲労50.8%（61/120例）、食欲不振50.8%（61/120例）、味覚異常48.3%（58/120例）であった[26]。


**17.1.13 海外第Ⅲ相無作為化比較試験（E2100試験）**

HER 2陰性[注7]で転移・再発乳癌に対する化学療法未治療患者を対象に、パクリタキセル（PTX）療法を対照群とし、PTX療法に本剤10mg/kgを併用（28日を1サイクルとし、第1日目、8日目、15日目にPTXを、第1日目、15日目にPTX投与終了後に本剤を投与）したときの有効性を検討した。有害事象によりいずれかの薬剤を中止した場合、もう一方の薬剤を単剤にて、同一用法・用量で病勢進行まで継続投与可能とした。第1回中間解析（2005年2月9日データカットオフ）の結果に基づき、試験は早期有効中止された。本剤併用群では、PTX療法単独に比べ主要評価項目である無増悪生存期間（独立判定委員会評価）の有意な延長が認められた。一方、副次的評価項目である生存期間については、PTX療法に本剤を併用することによる有意な延長は認められなかった[27]。[5.4、5.5、7.1、7.7参照]


E2100試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間 | | 生存期間 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| PTX療法単独群（n＝354） | 5.8 | 0.483 P＜0.0001 | 24.8 | 0.869 P＝0.1374 |
| PTX療法＋アバスチン群（n＝368） | 11.3 | | 26.5 | |

E2100試験の無増悪生存期間のKaplan-Meier曲線




E2100試験の生存期間のKaplan-Meier曲線




注7）E2100試験では、トラスツズマブ（遺伝子組換え）既治療のHER 2陽性乳癌患者、及びトラスツズマブ（遺伝子組換え）を含む治療が適応にならないHER 2発現不明乳癌患者も登録可能であった。

Grade3以上（血液毒性についてはGrade4以上）の副作用発現率は、本剤＋PTX療法群で67.8%（246/363例）であった。主な副作用は、末梢性感覚ニューロパシー24.2%（88/363例）、高血圧15.2%（55/363例）、疲労10.5%（38/363例）、感染9.6%（35/363例）、好中球数減少5.5%（20/363例）、筋力低下4.4%（16/363例）、呼吸困難4.4%（16/363例）、下痢3.9%（14/363例）、嘔吐3.9%（14/363例）、悪心3.9%（14/363例）であった[28]。

**〈悪性神経膠腫〉**

**17.1.14 国内第Ⅱ相試験（JO22506試験）**

既治療の再発悪性神経膠腫患者（膠芽腫29例、退形成性星細胞腫1例、退形成性乏突起星細胞腫1例）を対象に、本剤10mg/kgの2週間隔投与時の有効性を検討した。再発の膠芽腫患者29例における6カ月無増悪生存率は33.9%、1年生存率は34.5%、奏効率は27.6%であった。無増悪生存期間及び生存期間の中央値はそれぞれ3.3カ月及び10.5カ月であった[29]。［5.6、7.1、7.9参照］

副作用発現率は、96.8%（30/31例）であった。主な副作用は、尿中蛋白陽性41.9%（13/31例）、高血圧32.3%（10/31例）、下痢22.6%（7/31例）、鼻出血22.6%（7/31例）、ALT増加16.1%（5/31例）、好中球数減少16.1%（5/31例）、白血球数減少16.1%（5/31例）、血中Al-P増加12.9%（4/31例）、便秘9.7%（3/31例）、口内炎9.7%（3/31例）であった[30]。

**17.1.15 国際共同第Ⅲ相二重盲検無作為化比較試験（BO21990試験）**

初発の膠芽腫患者を対象に、放射線照射とテモゾロミドによる術後補助療法（RT/T療法）に本剤又はプラセボを併用する二重盲検無作為化比較試験を実施した。本剤の用量は、放射線照射とテモゾロミド（1日1回連日投与）の併用期間（6週間）中は、10mg/kg（第1日目から2週間隔、4回投与）とし、テモゾロミドの4週間休薬期間中は本剤も休薬した。その後、テモゾロミドの維持療法期間（28日を1サイクルとし、第1日目から第5日目まで1日1回投与を6サイクルまで実施）中は、本剤10mg/kg（28日を1サイクルとして、第1日目、15日目に投与）を併用投与した。テモゾロミド維持療法終了後は本剤の用量を15mg/kg（21日を1サイクルとし、第1日目に投与）とし、病勢進行まで継続投与した。その結果、本剤併用群では、プラセボ併用群に比べて主要評価項目である無増悪生存期間の有意な延長が認められた。もう1つの主要評価項目である生存期間には、有意な延長は認められなかった[31]。［5.6、7.1、7.8、7.9参照］

BO21990試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間 | | 生存期間 | |
|---|---|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 | 中央値（月） | ハザード比 |
| RT/T療法＋プラセボ群（n＝463）[注8] | 6.2 | 0.64 P＜0.0001 | 16.7 | 0.88 P＝0.0987 |
| RT/T療法＋アバスチン群（n＝458）[注9] | 10.6 | | 16.8 | |

注8）日本人患者25例を含む。

注9）日本人患者19例を含む。

副作用発現率は、本剤＋RT/T療法群で92.7%（430/464例）であった。主な副作用は、悪心39.9%（185/464例）、脱毛症35.1%（163/464例）、疲労33.2%（154/464例）、血小板減少症31.3%（145/464例）、高血圧29.3%（136/464例）、嘔吐23.5%（109/464例）、鼻出血16.4%（76/464例）、食欲減退16.2%（75/464例）、便秘15.5%（72/464例）、好中球減少症13.6%（63/464例）であった[32]。

**〈卵巣癌〉**

**17.1.16 国際共同第Ⅲ相二重盲検無作為化比較試験（GOG-0218試験）**

化学療法未治療の上皮性卵巣癌、卵管癌、原発性腹膜癌患者を対象に、カルボプラチン・パクリタキセル療法（CP療法）を対照群（CPP群[注10]）とし、CP療法に本剤15mg/kgを併用投与したCPB15群[注11]及び本剤15mg/kgを併用・継続投与したCPB15＋群[注12]の3群による有効性を検討した。CP療法はいずれの群でも6サイクルまでとし、本剤又はプラセボは投与開始から病勢進行又は21サイクルまで投与した。その結果、CPB15＋群で、CPP群に比べ主要評価項目である無増悪生存期間の有意な延長が認められた。なお、CPB15群では、有意な無増悪生存期間の延長は認められなかった。［5.8、7.1、7.10、7.11参照］

注10）21日を1サイクルとし、CP療法の2サイクル目から第1日目に他剤投与終了後にプラセボを投与し、CP療法の中止又は終了後もプラセボを継続投与した群

注11）21日を1サイクルとし、CP療法の2サイクル目から第1日目に他剤投与終了後に本剤を投与し、CP療法の中止又は終了後はプラセボを継続投与した群

注12）21日を1サイクルとし、CP療法の2サイクル目から第1日目に他剤投与終了後に本剤を投与し、CP療法の中止又は終了後も本剤を継続投与した群

GOG-0218試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 無増悪生存期間[注13] | | | 生存期間[注14] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | イベント数 | 中央値（月） | ハザード比 | イベント数 | 中央値（月） | ハザード比 |
| CPP群（n＝625） | 375 | 10.4 | — | 299 | 40.6 | — |
| CPB15群（n＝625） | 356 | 11.8 | 0.84 片側 P＝0.0118[注15] | 309 | 38.8 | 1.065 片側 P＝0.2197 |
| CPB15＋群（n＝623） | 317 | 14.1 | 0.71 片側 P＜0.0001[注15] | 270 | 43.8 | 0.879 片側 P＝0.0641 |

注13）カットオフ日：2009年9月29日

注14）カットオフ日：2011年8月26日

注15）有意水準0.0116

日本人部分集団における有効性に関する成績[注16]

| 投与群 | 無増悪生存期間[注17] | | |
|---|---|---|---|
| | イベント数 | 中央値（月） | ハザード比［95%信頼区間］ |
| CPP群（n＝20） | 8 | 14.5 | — |
| CPB15群（n＝12） | 3 | NE[注18] | 0.44［0.09、2.20］ |
| CPB15＋群（n＝12） | 3 | NE[注18] | 0.71［0.14、3.77］ |

注16）日本人部分集団のイベント数は少なく、有効性について結論は得られていない。

注17）カットオフ日：2010年2月25日

注18）NE：not estimable

副作用発現率は、CPB15群で99.2%（602/607例）、CPB15＋群で99.7%（606/608例）であった。主な副作用は、CPB15群で好中球数減少94.6%（574/607例）、白血球数減少94.4%（573/607例）、ヘモグロビン減少90.0%（546/607例）、疲労69.7%（423/607例）、血小板数減少69.2%（420/607例）、末梢性感覚ニューロパシー63.1%（383/607例）、脱毛症49.9%（303/607例）、

悪心49.4%（300/607例）、便秘41.2%（250/607例）、下痢31.8%（193/607例）であり、CPB15＋群で好中球数減少94.7%（576/608例）、白血球数減少94.1%（572/608例）、ヘモグロビン減少90.3%（549/608例）、疲労77.5%（471/608例）、血小板数減少70.4%（428/608例）、末梢性感覚ニューロパシー63.5%（386/608例）、悪心55.1%（335/608例）、脱毛症50.3%（306/608例）、便秘42.9%（261/608例）、関節痛34.2%（208/608例）であった[33)注19)]。

注19）カットオフ日：2010年2月5日

**〈進行又は再発の子宮頸癌〉**

**17.1.17 海外第Ⅲ相無作為化比較試験（GOG-0240試験）**

全身化学療法未治療の手術又は放射線療法による根治療法の対象とならない進行又は再発[注20)]の子宮頸癌患者を対象に、化学療法（シスプラチン・パクリタキセル療法[注21)]又はパクリタキセル・ノギテカン塩酸塩療法[注22)]）を対照群とし、化学療法に本剤15mg/kgを併用[注23)]したときの有効性を検討した。その結果、本剤併用群では、対照群に比べ主要評価項目である生存期間の有意な延長が認められた[34)]。［5.9、7.1、7.12参照］

GOG-0240試験の有効性に関する成績

| 投与群 | 生存期間 | |
|---|---|---|
| | 中央値（月） | ハザード比 |
| 化学療法群（n＝225） | 12.9 | 0.74<br>片側<br>P＝0.0066[注24)] |
| 化学療法＋アバスチン群（n＝227） | 16.8 | |

注20）FIGO分類ⅣB期及び治療抵抗性を含む。

注21）21日を1サイクルとし、以下の①～③から患者ごとに選択。

①第1日目にパクリタキセル135mg/m$^2$を24時間かけて静脈内投与し、第2日目にシスプラチン50mg/m$^2$を静脈内投与する。

②第1日目にパクリタキセル175mg/m$^2$を3時間かけて静脈内投与し、シスプラチン50mg/m$^2$を静脈内投与する。

③第1日目にパクリタキセル175mg/m$^2$を3時間かけて静脈内投与し、第2日目にシスプラチン50mg/m$^2$を静脈内投与する。

注22）21日を1サイクルとし、第1日目にパクリタキセル175mg/m$^2$を3時間かけて静脈内投与し、第1～3日目にノギテカン塩酸塩0.75mg/m$^2$を静脈内投与する。

注23）シスプラチン・パクリタキセル療法との併用の場合：21日を1サイクルとし、第1又は2日目に他剤投与終了後に本剤15mg/kgを静脈内投与する。

パクリタキセル・ノギテカン塩酸塩療法との併用の場合：21日を1サイクルとし、第1日目に他剤投与終了後に本剤15mg/kgを静脈内投与する。

注24）有意水準0.0140

副作用発現率は、化学療法＋本剤群で98.2%（214/218例）であった。主な副作用は、疲労79.4%(173/218例)、脱毛症61.9%(135/218例)、悪心61.9%(135/218例)、末梢性感覚ニューロパシー60.1%（131/218例）、便秘45.9%（100/218例）、下痢36.7%（80/218例）、嘔吐33.5%（73/218例）、食欲減退33.5%（73/218例）、高血圧28.9%（63/218例）、腹痛27.5%（60/218例）であった[35)]。

**〈切除不能な肝細胞癌〉**

**17.1.18 国際共同第Ⅲ相臨床試験（YO40245（IMbrave150）試験）**


全身化学療法歴のないChild-Pugh分類Aの切除不能な肝細胞癌患者[注25)]501例（日本人61例を含む）を対象に、本剤15mg/kgとアテゾリズマブ（遺伝子組換え）（本剤併用群、336例）の併用投与の有効性及び安全性を、ソラフェニブ（対照群、165例）と比較する第Ⅲ相ランダム化試験を実施した[注26)]。中間解析の結果、501例（日本人61例を含む）のITT集団において、本剤併用群で対照群と比較して、主要評価項目の一つである全生存期間の有意な延長が認められ（ハザード比［95%信頼区間］0.58［0.42，0.79］、P=0.0006［層別log-rank検定］、有意水準両側0.0033）、中央値［95%信頼区間］は本剤併用群で中央値未達［推定不能］、対照群で13.2［10.4，推定不能］カ月であった。もう一つの主要評価項目である無増悪生存期間の有意な延長が認められ（ハザード比［95%信頼区間］0.59［0.47，0.76］、P<0.0001［層別log-rank検定］、有意水準両側0.002）、中央値［95%信頼区間］は本剤併用群で6.8［5.7，8.3］カ月、対照群で4.3［4.0，5.6］カ月であった。また、日本人患者（本剤併用群35例、対照群26例）におけるITT集団の全生存期間の中央値［95%信頼区間］は、本剤併用群で中央値未達［推定不能］、対照群で14.9［推定不能］カ月であり（ハザード比［95%信頼区間］：1.71［0.50，5.84］）、無増悪生存期間の中央値［95%信頼区間］は、本剤併用群で中央値未達［6.4，推定不能］カ月、対照群で7.7［4.2，12.7］カ月であった（ハザード比［95%信頼区間］：0.85［0.39，1.86］）。［5.11、7.1参照］

本剤とアテゾリズマブ（遺伝子組換え）が投与された329例（日本人35例を含む）において276例（83.9%）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、高血圧78例（23.7%）、蛋白尿62例（18.8%）、疲労50例（15.2%）、AST増加46例（14.0%）、そう痒症43例（13.1%）、注入に伴う反応36例（10.9%）、下痢34例（10.3%）、ALT増加34例（10.3%）、食欲減退33例（10.0%）等であった[36)]。

注25）局所療法（経皮的エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝固療法、肝動脈塞栓療法/肝動脈化学塞栓療法、放射線療法等）の適応となる患者は除外された。

注26）本剤併用群では本剤15mg/kg及びアテゾリズマブ（遺伝子組換え）1200mgを3週間間隔で投与し、対照群ではソラフェニブ400mgを1日2回投与した。

YO40245（IMbrave150）試験の全生存期間のKaplan-Meier曲線（ITT集団）




## 18．薬効薬理

### 18.1 作用機序

ベバシズマブは、ヒト血管内皮増殖因子（VEGF）に対する遺伝子組換え型ヒト化モノクローナル抗体である。VEGFは、血管内皮細胞の細胞分裂促進・生存を制御するとともに血管透過性の亢進に関与するサイトカインであり、種々の癌細胞において発現が亢進している[37),38)]。ベバシズマブは、ヒトVEGFと特異的に結合することにより、VEGFと血管内皮細胞上に発現しているVEGF受容体との結合を阻害する[39)]。ベバシズマブはVEGFの生物活性を阻止することにより、腫瘍組織での血管新生を抑制し、腫瘍の増殖を阻害する[39),40)]。また、VEGFにより亢進した血管透過性を低下させ、腫瘍組織で亢進した間質圧を低減する[40)]。

### 18.2 抗腫瘍効果

ヒト癌細胞株をヌードマウス又はヌードラットに移植し、ベバシズマブ又は親抗体（マウス抗体）であるA4.6.1抗体を投与することにより、大腸癌（COLO205、HM7、LSLiM6）、肺癌（A549）、乳癌（MX-1、MDA-MB-435）、膠芽腫（U-87MG）、卵巣癌（SKOV-3）等広範な癌腫に対し抗腫瘍活性を認めた[41)-45)]。また、ヒト大腸癌（HM7）を用いた実験的癌転移モデルにおいて、肝臓への転移を抑制した[41)]。化学療法あるいは放射線療法にベバシズマブ又は親抗体を併用することにより、抗腫瘍効果の増強作用を示した[41)-45)]。

## 19．有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ベバシズマブ（遺伝子組換え）
（Bevacizumab（Genetical Recombination））（JAN）

分子式：軽鎖（1-214残基）（$C_{1034}H_{1591}N_{273}O_{338}S_6$）
重鎖（1-453残基）（$C_{2235}H_{3413}N_{585}O_{678}S_{16}$）

分子量：約149,000

構造式：アミノ酸214個の軽鎖2分子とアミノ酸453個の重鎖2分子からなる糖タンパク質

## 20．取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。

## 21．承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

## 22．包装

**〈アバスチン点滴静注用100mg/4mL〉**

4mL×1バイアル

**〈アバスチン点滴静注用400mg/16mL〉**

16mL×1バイアル

## 23．主要文献


1）医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請への該当性に係る報告書：ベバシズマブ（遺伝子組換え）（卵巣癌　10mg/kg 2週間間隔投与追加）

2）The CATT Research Group, et al. N Engl J Med. 2011;364:1897-908.

3）Curtis LH, et al. Arch Ophthalmol. 2010;128:1273-9.

4）Gower EW, et al. ARVO 2011 E-Abstract Poster 6644.

5）単回投与時の薬物動態（国内第Ⅰ相試験JO18157）（2007年4月18日承認、申請資料概要2.7.2.2.2.1）

6）反復投与時の血中濃度（国内第Ⅱ相試験JO19901）（2011年9月26日承認、申請資料概要2.7.2.2）

7）反復投与時の血中濃度（国内第Ⅱ相試験JO19907）（2011年9月26日承認、申請資料概要2.7.2.3）

8）ウサギ分布試験（2007年4月18日承認、申請資料概要2.6.4.4.1）
9）ウサギ排泄試験（2007年4月18日承認、申請資料概要2.6.4.6.1）
10）社内資料：国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（JO19380試験）
11）社内資料：国内安全性確認試験（JO18158試験）
12）社内資料：国内第Ⅰ相試験（JO18157試験）
13）社内資料：海外第Ⅲ相比較試験（NO16966試験）
14）海外第Ⅲ相比較試験（E3200試験）（2007年4月18日承認、申請資料概要2.7.6.7）
15）海外第Ⅲ相比較試験（AVF2107g試験）（2007年4月18日承認、申請資料概要2.7.6.4）
16）社内資料：海外第Ⅲ相比較試験（AVF2107g試験）
17）海外第Ⅱ相比較試験（AVF2192g試験）（2007年4月18日承認、申請資料概要2.7.6.5）
18）社内資料：海外第Ⅱ相比較試験（AVF2192g試験）
19）Kabbinavar FF, et al. J Clin Oncol. 2005;23:3706-12.
20）社内資料：国内第Ⅱ相試験（JO19907試験）
21）Sandler A, et al. N Engl J Med. 2006;355:2542-50.
22）社内資料：海外第Ⅱ/Ⅲ相比較試験（E4599試験）
23）社内資料：海外第Ⅲ相比較試験（BO17704試験）
24）社内資料：海外第Ⅱ相比較試験（AVF0757g試験）
25）国内第Ⅱ相試験（JO19901試験）（2011年9月26日承認、申請資料概要2.7.6.6）
26）国内第Ⅱ相試験（JO19901試験）（2011年9月26日承認、申請資料概要2.7.4.2.1.1）
27）海外第Ⅲ相比較試験（E2100試験）（2011年9月26日承認、申請資料概要2.7.3.3）
28）社内資料：海外第Ⅲ相比較試験（E2100試験）
29）国内第Ⅱ相試験（JO22506試験）（2013年6月14日承認、申請資料概要2.7.6.1.3）
30）国内第Ⅱ相試験（JO22506試験）（2013年6月14日承認、申請資料概要（再発）2.7.4.2.1.1）
31）社内資料：国際共同第Ⅲ相比較試験（BO21990試験）
32）国際共同第Ⅲ相比較試験（BO21990試験）（2013年6月14日承認、申請資料概要（初発）2.7.4.2.1.1）
33）社内資料：国際共同第Ⅲ相比較試験（GOG-0218試験）
34）海外第Ⅲ相比較試験（GOG-0240試験）（2016年5月23日承認、申請資料概要2.7.6.1.1）
35）海外第Ⅲ相比較試験（GOG-0240試験）（2016年5月23日承認、申請資料概要2.7.6.2.1）
36）社内資料：国際共同第Ⅲ相試験（YO40245試験）
37）Ferrara N, et al. Nat Med. 2003;9:669-76.
38）Ferrara N, et al. Endocr Rev. 1997;18:4-25.
39）Presta LG, et al. Cancer Res. 1997;57:4593-9.
40）Willett CG, et al. Nat Med. 2004;10:145-7.
41）Gerber H-P, et al. Cancer Res. 2005;65:671-80.
42）Yanagisawa M, et al. Oncol Rep. 2009;22:241-7.
43）社内資料：ヒト肺癌xenograftモデルにおける抗腫瘍効果の検討
44）ヒト乳癌xenograftモデルにおける抗腫瘍効果の検討（2011年9月26日承認、申請資料概要2.6.2.2.1及び2.6.2.5.1）
45）ヒト膠芽腫xenograftモデルにおける抗腫瘍効果の検討（2013年6月14日承認、申請資料概要2.6.2.2.1及び2.6.2.5.1）

## 24．文献請求先及び問い合わせ先

中外製薬株式会社　メディカルインフォメーション部
〒103-8324　東京都中央区日本橋室町2-1-1
電話：0120-189706
Fax：0120-189705
https://www.chugai-pharm.co.jp/

## 26．製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

中外製薬株式会社
東京都中央区日本橋室町2-1-1
ロシュ グループ

Ⓡ 登録商標

202504A

**2025年 5 月改訂（第24版、効能変更、用法及び用量変更）
*2025年 1 月改訂（第23版）

日本標準商品分類番号
874291

貯法：2～8℃保存
有効期間：24箇月

—抗悪性腫瘍剤—
ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

承認番号 22800AMX00696000
販売開始 2017年 2 月

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）製剤

# キイトルーダ®点滴静注100mg

KEYTRUDA® Injection 100mg

最適使用推進ガイドライン対象品目

生物由来製品
劇薬
処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

MSD

## 1. 警告

1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に本剤の有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

1.2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽等）の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、9.1.2、11.1.1 参照]

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

| 販売名 | キイトルーダ®点滴静注100mg |
|---|---|
| 有効成分 | ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注1) |
| 分量／容量注2)（1バイアル中） | 100mg/4mL |
| 添加剤 | L-ヒスチジン（1.2mg）、L-ヒスチジン塩酸塩水和物（6.8mg）、精製白糖（280mg）、ポリソルベート80（0.8mg） |

注1）本剤は遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。マスター・セル・バンクの凍結保存用溶液中に、ウシ胎児血清を使用している。
注2）本剤は注射液吸引時の損失を考慮して、過量充填されているので、実充填量は106.25mg/4.25mLである。

### 3.2 製剤の性状

| 販売名 | キイトルーダ®点滴静注100mg |
|---|---|
| 剤形 | 注射剤（バイアル） |
| pH | 5.2～5.8 |
| 浸透圧比 | 約0.9（生理食塩液対比） |
| 性状 | 無色～微黄色で澄明～乳白色の液 |

## 4. 効能又は効果

○ 悪性黒色腫
○ 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
○ 非小細胞肺癌における術前・術後補助療法
○ 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
○ 根治切除不能な尿路上皮癌
○ がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）
○ 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
○ 腎細胞癌における術後補助療法
○ 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
○ 根治切除不能な進行・再発の食道癌
○ 治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌
○ PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌
○ ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法
○ 進行・再発の子宮体癌
○ がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量（TMB-High）を有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）
○ 進行又は再発の子宮頸癌
○ 局所進行子宮頸癌
○ 再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫
○ 治癒切除不能な進行・再発の胃癌
○ 治癒切除不能な胆道癌
**○ 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫

## 5. 効能又は効果に関連する注意

〈悪性黒色腫〉
5.1 臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.4、17.1.5 参照]

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
5.2 本剤を単独で投与する場合には、PD-L1の発現が確認された患者に投与すること。PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合（TPS）について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知すること。十分な経験を有する病理医又は検査施設において、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html
[17.1.8-17.1.10 参照]

5.3 臨床試験に組み入れられた患者の*EGFR*遺伝子変異又は*ALK*融合遺伝子の有無等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.6、17.1.8-17.1.10 参照]

〈非小細胞肺癌における術前・術後補助療法〉
5.4 臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.11 参照]

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
5.5 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.12、17.1.13 参照]

〈根治切除不能な尿路上皮癌〉
5.6 本剤の手術の補助療法としての有効性及び安全性は確立していない。

5.7 白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法の適応とならない化学療法未治療患者への本剤単独投与については、他の治療の実施についても慎重に検討すること。

〈がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）〉
5.8 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認された進行・再発の固形癌患者に投与すること。検査にあたっては、関連学会のガイドライン等の最新の情報を参考に、先行の化学療法等によるMSI検査結果への影響及び検査に用いる検体の採取時期について確認し、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html

5.9 結腸・直腸癌以外の固形癌の場合、本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。また、二次治療において標準的な治療が可能な場合にはこれらの治療を優先すること。

5.10 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.11 臨床試験に組み入れられた患者のがん種等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。[17.1.17、17.1.18 参照]

〈腎細胞癌における術後補助療法〉

5.12 臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.21 参照]

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

5.13 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.14 本剤単独投与の延命効果は、PD-L1発現率（CPS）により異なる傾向が示唆されている。CPSについて、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.22 参照]

5.15「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.22 参照]

〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

5.16 がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌に対して、本剤を単独で投与する場合には、PD-L1発現率（CPS）について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、PD-L1の発現が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html
[17.1.24 参照]

5.17 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌〉

5.18 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html

5.19 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌〉

5.20 PD-L1発現率（CPS）について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、PD-L1の発現が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html
[17.1.26 参照]

〈ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法〉

5.21 臨床試験に組み入れられた患者の再発高リスクの定義等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.27 参照]

〈進行・再発の子宮体癌〉

5.22 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.23 臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.28、17.1.29 参照]

〈がん化学療法後に増悪したTMB-Highを有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）〉

5.24 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、TMB-Highが確認された患者に投与すること。検査にあたっては、関連学会のガイドライン等の最新の情報を参考に、先行の化学療法等によるTMB検査結果への影響及び検査に用いる検体の採取時期について確認し、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html

5.25 本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。また、二次治療において標準的な治療が可能な場合にはこれらの治療を優先すること。

5.26 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.27 臨床試験に組み入れられた患者のがん種等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。[17.1.30 参照]

〈進行又は再発の子宮頸癌〉

5.28 本剤の有効性は、PD-L1発現率（CPS）により異なる傾向が示唆されている。CPSについて、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.31 参照]

5.29 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈局所進行子宮頸癌〉

5.30 臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.32 参照]

5.31 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫〉

5.32 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.33、17.1.34 参照]

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

5.33 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.34 本剤の有効性は、PD-L1発現率（CPS）により異なる傾向が示唆されている。

**5.34.1 HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対して本剤を投与する場合には、CPSについて、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.35 参照]

**5.34.2 HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対して本剤を投与する場合には、CPSについて、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、PD-L1の発現が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html
[17.1.36 参照]

〈治癒切除不能な胆道癌〉

5.35 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

**〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

**5.36 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

## 6. 用法及び用量

〈悪性黒色腫〉

通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。ただし、術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、根治切除不能な尿路上皮癌、がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪したTMB-Highを有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）、再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫〉
通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。
〈非小細胞肺癌における術前・術後補助療法〉
術前補助療法では、他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。その後、術後補助療法では、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。投与回数は、3週間間隔投与の場合、術前補助療法は4回まで、術後補助療法は13回まで、6週間間隔投与の場合、術前補助療法は2回まで、術後補助療法は7回までとする。
**〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌、進行・再発の子宮体癌、進行又は再発の子宮頸癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。
〈腎細胞癌における術後補助療法〉
通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。投与期間は12ヵ月間までとする。
〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉
フルオロウラシル及びシスプラチンとの併用において、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌に対しては、本剤を単独投与することもできる。
〈ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法〉
通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。投与回数は、3週間間隔投与の場合、術前薬物療法は8回まで、術後薬物療法は9回まで、6週間間隔投与の場合、術前薬物療法は4回まで、術後薬物療法は5回までとする。
〈局所進行子宮頸癌〉
シスプラチンを用いた同時化学放射線療法との併用において、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。投与期間は24ヵ月間までとする。
〈治癒切除不能な胆道癌〉
ゲムシタビン塩酸塩及びシスプラチンとの併用において、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
7.1 本剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で、選択すること。[17.1.6、17.1.7 参照]
〈非小細胞肺癌における術前・術後補助療法〉
7.2 併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で、選択すること。[17.1.11 参照]
〈根治切除不能な尿路上皮癌〉
7.3 エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）以外の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
7.4 白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法の適応となる化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。
〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉
7.5 本剤の用法及び用量は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、選択すること。また、本剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で、選択すること。[17.1.22 参照]
〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
7.6 併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で、選択すること。[17.1.19、17.1.20 参照]
〈PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌〉
7.7 併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で、選択すること。[17.1.26 参照]
〈ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法〉
7.8 本剤の用法は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し選択すること。また、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で、選択すること。[17.1.27 参照]
〈進行・再発の子宮体癌〉
7.9 併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し選択すること。[17.1.28、17.1.29 参照]
7.10 本剤とレンバチニブとの併用について、一次治療における有効性及び安全性は確立していない。
〈進行又は再発の子宮頸癌〉
7.11 併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し選択すること。[17.1.31 参照]
〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
7.12 併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にした上で、選択すること。[17.1.35、17.1.36 参照]
**〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
**7.13 併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し選択すること。[17.1.38、17.1.39 参照]
**7.14 カルボプラチン及びペメトレキセドナトリウムと併用する場合、通常、成人には、3週間間隔で、カルボプラチンは1回AUC 5～6mg・min/mL相当量を30分以上かけて点滴静注し、ペメトレキセドナトリウムは1回500mg/m$^2$を10分間かけて点滴静注すること。なお、患者の状態により適宜減量すること。
〈悪性黒色腫、再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）、腎細胞癌における術後補助療法、治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪したTMB-Highを有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）、再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫〉
7.15 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
〈効能共通〉
7.16 本剤投与により副作用が発現した場合には、下表を参考に、本剤を休薬又は中止すること。

| 副作用 | 程度 | 処置 |
|---|---|---|
| 間質性肺疾患 | Grade 2の場合 | Grade 1以下に回復するまで、本剤を休薬する。<br>12週間を超える休薬後もGrade 1以下まで回復しない場合には、本剤を中止する。 |
| | Grade 3以上又は再発性のGrade 2の場合 | 本剤を中止する。 |
| 大腸炎／下痢 | Grade 2又は3の場合 | Grade 1以下に回復するまで、本剤を休薬する。<br>12週間を超える休薬後もGrade 1以下まで回復しない場合には、本剤を中止する。 |
| | Grade 4又は再発性のGrade 3の場合 | 本剤を中止する。 |

| 副作用 | 程度 | 処置 |
|---|---|---|
| 肝機能障害 | ・AST若しくはALTが基準値上限の3～5倍又は総ビリルビンが基準値上限の1.5～3倍に増加した場合<br>・腎細胞癌患者でのアキシチニブとの併用における初回発現時では、AST又はALTが基準値上限の3倍以上10倍未満に増加し、かつ総ビリルビンが基準値上限の2倍未満の場合 | Grade 1以下に回復するまで、本剤を休薬する。<br>12週間を超える休薬後もGrade 1以下まで回復しない場合には、本剤を中止する。 |
| | ・AST若しくはALTが基準値上限の5倍超又は総ビリルビンが基準値上限の3倍超に増加した場合<br>・肝転移がある患者では、AST又はALTが治療開始時にGrade 2で、かつベースラインから50%以上の増加が1週間以上持続する場合<br>・腎細胞癌患者でのアキシチニブとの併用における初回発現時では、AST若しくはALTが基準値上限の10倍以上、又は3倍超かつ総ビリルビンが基準値上限の2倍以上に増加した場合 | 本剤を中止する。 |
| 腎機能障害 | Grade 2の場合 | Grade 1以下に回復するまで、本剤を休薬する。<br>12週間を超える休薬後もGrade 1以下まで回復しない場合には、本剤を中止する。 |
| | Grade 3以上の場合 | 本剤を中止する。 |
| 内分泌障害 | ・Grade 2以上の下垂体炎<br>・症候性の内分泌障害(甲状腺機能低下症を除く)<br>・Grade 3以上の甲状腺機能障害<br>・Grade 3以上の高血糖<br>・1型糖尿病 | Grade 1以下に回復するまで、本剤を休薬する。<br>12週間を超える休薬後もGrade 1以下まで回復しない場合には、本剤の中止を検討する。 |
| Infusion reaction | Grade 2の場合 | 本剤の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 |
| | Grade 3以上の場合又は再発性のGrade 2の場合 | 本剤を直ちに中止し、再投与しない。 |
| 上記以外の副作用 | ・Grade 4又は再発性のGrade 3の副作用<br>・Grade 3以上の心筋炎、脳炎、ギラン・バレー症候群<br>・副作用の処置としての副腎皮質ホルモン剤をプレドニゾロン換算で10mg/日相当量以下まで12週間以内に減量できない場合<br>・12週間を超える休薬後もGrade 1以下まで回復しない場合 | 以下の場合を除き、本剤を中止する。<br>再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫患者においてGrade 4の血液毒性が発現した場合は、Grade 1以下に回復するまで本剤を休薬する。 |

GradeはNCI-CTCAE（Common Terminology Criteria for Adverse Events）v4.0に準じる。

## 8. 重要な基本的注意

8.1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、本剤投与終了後も観察を十分に行うこと。

8.2 間質性肺疾患があらわれることがあるので、初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽等）の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2、9.1.2、11.1.1 参照]

8.3 甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎機能障害があらわれることがあるので、内分泌機能検査（TSH、遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定）を定期的に行うこと。また、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。[11.1.7-11.1.9 参照]

8.4 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるので、肝機能検査を定期的（特にアキシチニブとの併用投与時は頻回）に行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.6 参照]

8.5 1型糖尿病があらわれることがあるので、口渇、悪心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。[11.1.10 参照]

8.6 腎障害があらわれることがあるので、腎機能検査を定期的に行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.11 参照]

8.7 筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋力低下、筋肉痛、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等の観察を十分に行うこと。[11.1.13 参照]

8.8 重症筋無力症があらわれることがあるので、筋力低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害等の観察を十分に行うこと。[11.1.14 参照]

8.9 心筋炎があらわれることがあるので、胸痛、CK上昇、心電図異常等の観察を十分に行うこと。[11.1.15 参照]

8.10 ぶどう膜炎等の重篤な眼障害があらわれることがあるので、眼の異常の有無を定期的に確認すること。また、眼の異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。[11.1.19 参照]

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

**9.1.1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者**

免疫関連の副作用が発現又は増悪するおそれがある。

**9.1.2 間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者**

間質性肺疾患が発現又は増悪するおそれがある。[1.2、8.2、11.1.1 参照]

**9.1.3 臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者**

本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。

**9.1.4 結核の感染又は既往を有する患者**

結核を発症するおそれがある。[11.1.21 参照]

### 9.4 生殖能を有する者

妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び最終投与後4ヵ月間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。[9.5 参照]

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。本剤を用いた生殖発生毒性試験は実施されていない。妊娠マウスに抗PD-1抗体又は抗PD-L1抗体を投与すると、流産率が増加することが報告されていることから、妊娠中の女性に対する本剤の投与は、胎児に対して有害な影響を及ぼす可能性がある。また、ヒトIgGは母体から胎児へ移行することが知られている。[9.4 参照]

### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤のヒト母乳中への移行に関するデータはないが、ヒトIgGは母乳中に移行することが知られている。

### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 9.8 高齢者

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

**11.1.1 間質性肺疾患（3.8%）
[1.2、8.2、9.1.2 参照]

**11.1.2 大腸炎（2.2%）、小腸炎（0.1%）、重度の下痢（2.6%）
腸炎から穿孔、イレウスに至る例が報告されている。持続する下痢、腹痛、血便等の症状が認められた場合には、本剤の投与中止等の適切な処置を行うこと。

11.1.3 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（0.1%未満）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（0.1%未満）、多形紅斑（0.2%）

11.1.4 類天疱瘡（0.1%）
水疱、びらん等が認められた場合には、皮膚科医と相談すること。

**11.1.5 神経障害
末梢性ニューロパチー（5.7%）、ギラン・バレー症候群（0.1%未満）等の神経障害があらわれることがある。

**11.1.6 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎
劇症肝炎（頻度不明）、肝不全（0.1%未満）、AST、ALT、γ-GTP、Al-P、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害（17.6%）、肝炎（1.1%）、硬化性胆管炎（0.1%未満）があらわれることがある。[8.4 参照]

**11.1.7 甲状腺機能障害
甲状腺機能低下症（14.2%）、甲状腺機能亢進症（5.6%）、甲状腺炎（1.1%）等の甲状腺機能障害があらわれることがある。[8.3 参照]

11.1.8 下垂体機能障害
下垂体炎（0.5%）、下垂体機能低下症（0.2%）等の下垂体機能障害があらわれることがある。[8.3 参照]

11.1.9 副腎機能障害
副腎機能不全（1.1%）等の副腎機能障害があらわれることがある。[8.3 参照]

11.1.10 1型糖尿病
1型糖尿病（劇症1型糖尿病を含む）（0.3%）があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至るおそれがある。1型糖尿病が疑われた場合には、本剤の投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.5 参照]

11.1.11 腎障害
腎不全（1.7%）、尿細管間質性腎炎（0.2%）、糸球体腎炎（0.1%未満）等の腎障害があらわれることがある。[8.6 参照]

*11.1.12 膵炎（0.4%）、膵外分泌機能不全（0.1%未満）

11.1.13 筋炎（0.3%）、横紋筋融解症（0.1%未満）
[8.7 参照]

11.1.14 重症筋無力症（0.1%）
重症筋無力症によるクリーゼのため急速に呼吸不全が進行することがあるので、呼吸状態の悪化に十分注意すること。[8.8 参照]

11.1.15 心筋炎（0.2%）
[8.9 参照]

11.1.16 脳炎、髄膜炎、脊髄炎
脳炎（0.1%）、髄膜炎（0.1%）、脊髄炎（0.1%未満）があらわれることがある。また、多発性硬化症の増悪（頻度不明）、視神経脊髄炎スペクトラム障害（頻度不明）も報告されている。

11.1.17 重篤な血液障害
免疫性血小板減少性紫斑病（0.1%）、溶血性貧血（0.1%未満）、赤芽球癆（0.1%未満）、無顆粒球症（頻度不明）等の重篤な血液障害があらわれることがある。

11.1.18 重度の胃炎（0.1%）
免疫反応に起因すると考えられる重度の胃炎があらわれることがある。異常が認められた場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.19 ぶどう膜炎（0.2%）
[8.10 参照]

11.1.20 血球貪食症候群（頻度不明）

11.1.21 結核（0.1%未満）
[9.1.4 参照]

**11.1.22 Infusion reaction（3.4%）
アナフィラキシーを含むInfusion reactionが認められた場合には、本剤の投与中止等の適切な処置を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。

### 11.2 その他の副作用

| | 10%以上 | 1～10%未満 | 1%未満 |
|---|---|---|---|
| 血液及びリンパ系障害 | 好中球減少、貧血、血小板減少、白血球減少 | リンパ球減少、発熱性好中球減少症 | 好酸球増加症、ヘモグロビン減少 |
| 耳及び迷路障害 | | 耳鳴 | 回転性めまい |
| 内分泌障害 | | 血中TSH増加 | 血中TSH減少 |
| 眼障害 | | 眼乾燥、流涙増加 | 霧視、フォークト・小柳・原田病 |
| 胃腸障害 | 悪心、下痢、嘔吐 | 便秘、口内炎、腹痛、口内乾燥、消化不良、上腹部痛、胃食道逆流性疾患 | 腹部膨満、胃炎、口腔内痛、嚥下障害、鼓腸、口腔内潰瘍形成 |
| 一般・全身障害及び投与部位の状態 | 疲労、無力症 | 発熱、粘膜の炎症、倦怠感、末梢性浮腫、悪寒 | インフルエンザ様疾患、疼痛、浮腫、胸痛 |
| 感染症及び寄生虫症 | | 尿路感染、肺炎 | 結膜炎、口腔カンジダ症、上気道感染 |
| 代謝及び栄養障害 | 食欲減退 | 低マグネシウム血症、低カリウム血症、低ナトリウム血症、高血糖、脱水、低カルシウム血症、リパーゼ増加、低リン酸血症、アミラーゼ増加 | 高カリウム血症、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、血中コレステロール増加、高コレステロール血症 |
| 筋骨格系及び結合組織障害 | | 関節痛、筋肉痛、四肢痛、背部痛、筋痙縮、筋力低下 | 関節炎、骨痛、筋骨格硬直、筋骨格痛 |
| 精神・神経障害 | | 末梢性感覚ニューロパチー、味覚異常、頭痛、浮動性めまい、錯感覚、不眠症、感覚鈍麻 | 嗜眠、神経毒性、末梢性運動ニューロパチー、多発ニューロパチー、視神経炎 |
| 腎及び尿路障害 | | 血中クレアチニン増加、蛋白尿 | 排尿困難、血中尿素増加、腎機能障害、血尿 |
| 呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | | 呼吸困難、咳嗽、発声障害、鼻出血、しゃっくり | 口腔咽頭痛、肺塞栓症、鼻漏、労作性呼吸困難、胸水 |
| 皮膚及び皮下組織障害 | そう痒症、発疹、脱毛症 | 斑状丘疹状皮疹、手掌・足底発赤知覚不全症候群、皮膚乾燥、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、尋常性白斑、湿疹 | 皮膚炎、皮膚色素過剰、斑状皮疹、そう痒性皮疹、じん麻疹、丘疹性皮疹、爪変色、乾癬、皮膚剥脱、皮膚色素減少、皮膚病変、多汗症、寝汗、光線過敏性反応、丘疹、毛髪変色 |
| 血管障害 | | 高血圧、ほてり | 低血圧、潮紅 |
| その他 | | 体重減少 | 血中LDH増加、血中CK増加、体重増加、サルコイドーシス |

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製前の注意

14.1.1 バイアルを振盪しないこと。

14.1.2 バイアルを常温に戻し、希釈前に保存する場合には、遮光で、25℃以下で24時間以内に使用すること。[20.2 参照]

14.1.3 調製前に、粒子状物質や変色の有無を目視により確認すること。微粒子が認められる場合には、バイアルを廃棄すること。

14.2 薬剤調製時の注意

14.2.1 必要量（4mL以内）をバイアルから抜き取り、日局生理食塩液又は日局5%ブドウ糖注射液の点滴バッグに注入し、最終濃度を1～10mg/mLとする。点滴バッグをゆっくり反転させて混和すること。過度に振盪すると、半透明から白色のタンパク質性の粒子がみられることがある。不溶性異物が認められる場合は使用しないこと。バイアル中の残液は廃棄すること。

14.2.2 希釈液は凍結させないこと。

**14.2.3 本剤は保存料を含まないため無菌的に調製すること。希釈液をすぐに使用せず保管する場合には、希釈から投与終了までの時間を、25℃以下で12時間以内又は2～8℃で7日以内とすること。希釈液を冷所保存した場合には、投与前に点滴バッグを常温に戻すこと。

14.3 薬剤投与時の注意

14.3.1 本剤の投与にあたっては、インラインフィルター（0.2～5μm）を使用すること。

14.3.2 同一の点滴ラインを使用して他の薬剤を併用同時投与しないこと。

## 15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 国内外の臨床試験において、本剤に対する抗体の産生が報告されている。

15.1.2 臨床試験において、本剤による治療後に同種造血幹細胞移植が実施された症例で、重篤な移植片対宿主病等の移植関連合併症が認められた。

## 16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

国内第Ⅰ相試験（KEYNOTE-011試験）で、日本人の進行性固形がん患者に本剤2又は10mg/kgを単回静脈内持続投与注）したときの、血清中濃度推移を図1に、薬物動態パラメータを表1に示す。クリアランス及び分布容積の幾何平均値は用量間（2及び10mg/kg）で概して同様であった。

図1　日本人患者の血清中濃度推移（平均±標準偏差）（KEYNOTE-011試験）





表1　本剤2又は10mg/kgを単回投与したときの薬物動態パラメータの要約統計量（KEYNOTE-011試験）

| | $C_{max}$ (μg/mL) | $T_{max}$† (day) | $AUC_{0\text{-}28day}$ (μg・day/mL) | $t_{1/2}$ (day) | CL (mL/day/kg) | Vz (mL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤2mg/kg（3例） | 47.4 (18.6) | 0.223 (0.00208-0.233) | 507 (20.0) | 18.4 (56.1) ‡ | 2.46 (44.7) | 65.3 (21.3) |
| 本剤10mg/kg（7例） | 250 (23.2) | 0.00903 (0.000694-0.232) | 2219 (32.4) | 18.1 (68.4) ‡ | 2.93 (56.5) | 76.5 (34.4) |

幾何平均（幾何変動係数［%］）

†：中央値（範囲）

‡：$T_{last}$を超える$t_{1/2}$を有する患者1例を平均値に含む

16.1.2 反復投与

〈悪性黒色腫〉

国内第Ⅰ相試験（KEYNOTE-041試験）で、日本人の根治切除不能な悪性黒色腫患者に本剤2mg/kgを3週間間隔で反復静脈内持続投与注）したときの、初回（サイクル1）及び投与後21週（サイクル8）の血清中濃度推移を図2に、サイクル1及びサイクル8の薬物動態パラメータを表2に示す。サイクル8における、本剤のトラフ濃度及び$AUC_{0\text{-}21day}$の幾何平均は、それぞれ24.5μg/mL及び797μg・day/mLであった。本剤のトラフ濃度はサイクル8（21週）までにおおむね定常状態に到達した。

図2　日本人患者のサイクル1及びサイクル8の血清中濃度推移（平均±標準偏差）（KEYNOTE-041試験）





表2　本剤2mg/kgを3週間間隔で投与したときの薬物動態パラメータの要約統計量（KEYNOTE-041試験）

| | $C_{max}$ (μg/mL) | $C_{trough}$ (μg/mL) | $AUC_{0\text{-}21day}$ (μg・day/mL) | CL (mL/day/kg) |
|---|---|---|---|---|
| サイクル1（42例） | 40.9 (28.1) | 11.3†‡ (19.0) | 393† (18.2) | NA |
| サイクル8（28例） | 61.8 (24.5) | 24.5§‖ (48.8) | 797§ (32.4) | 2.51§ (32.4) |

幾何平均（幾何変動係数［%］）

†：41例

‡：サイクル2投与前の血清中濃度

§：25例

‖：サイクル9投与前の血清中濃度


NA：該当なし

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-024試験）で、PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者（薬物動態解析対象152例、日本人21例を含む）に、本剤200mgを3週間間隔で反復静脈内持続投与したときの、日本人及び外国人患者における血清中トラフ濃度推移を図3に示す。初回（サイクル1）の$C_{max}$の幾何平均（幾何変動係数）は67.5μg/mL（23%）で、投与後21週（サイクル8）のトラフ濃度†の幾何平均（幾何変動係数）は30.6μg/mL（50%）であった。

†：サイクル8投与前の血清中濃度

図3　日本人及び外国人患者の血清中トラフ濃度推移（平均±標準偏差）（KEYNOTE-024試験）




16.1.3 母集団薬物動態解析

本剤200mgを3週間間隔（Q3W）又は400mgを6週間間隔（Q6W）で投与したときの母集団薬物動態解析に基づく薬物動態パラメータと海外第Ⅰ相試験（KEYNOTE-555試験）にて本剤400mgをQ6Wで投与したときの実測値に基づく薬物動態パラメータを比較した結果は、表3のとおりであった。母集団薬物動態解析には、国際共同第Ⅱ／Ⅲ相試験（KEYNOTE-010試験）、国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-024試験）、海外第Ⅰ相試験（KEYNOTE-001試験）、海外第Ⅱ相試験（KEYNOTE-002試験）及び海外第Ⅲ相試験（KEYNOTE-006試験）に組み入れられた患者2,993例のデータ（うち日本人は83例）を含む。

表3　本剤投与後の薬物動態パラメータの要約

| | 用法・用量 | $C_{max}$ (μg/mL) | $C_{avg}$ (μg/mL) | $C_{trough}$ (μg/mL) |
|---|---|---|---|---|
| サイクル1 | 200mg Q3W† | 59.1 (58.5, 59.7) | 27.9 (27.7, 28.1) | 18.1‡ (17.8, 18.3) |
| | 400mg Q6W† | 123 (122, 124) | 32.4 (32.0, 32.7) | 10.6‡ (10.4, 10.8) |
| | 400mg Q6W（実測値） | 136.0§ (135.6, 136.4) | NA | 14.9‖ (14.4, 15.4) |
| 定常状態 | 200mg Q3W† | 92.8 (91.7, 94.1) | 50.4 (49.8, 51.0) | 30.9 (30.5, 31.4) |
| | 400mg Q6W† | 148 (146, 149) | 50.7 (50.1, 51.3) | 20.3 (19.8, 20.9) |

†：2,993例×100回のシミュレーションにより算出した幾何平均値の中央値（2.5%点, 97.5%点）

$C_{avg}$：平均血清中濃度

‡：サイクル2投与前の血清中濃度

§：56例の幾何平均値（95%信頼区間）

‖：41例の幾何平均値（95%信頼区間）

NA：該当なし

16.8 その他

本剤の有効性及び安全性に対する曝露-反応解析の結果、本剤200mgをQ3Wで投与した際と本剤400mgをQ6Wで投与した際の有効性及び安全性に明確な差異はないと予測された。

注）本剤の承認用法及び用量は、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈悪性黒色腫〉

#### 17.1.1 国内第Ⅰ相試験（KEYNOTE-041試験）

化学療法歴のない又はイピリムマブを含まない2レジメンまでの化学療法歴を有する根治切除不能な悪性黒色腫患者42例（有効性解析対象37例）を対象に、本剤2mg/kg 3週間間隔投与[注1)]の有効性及び安全性が検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目である奏効率［RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は、24%（95%信頼区間：12～41）であった。

安全性解析対象例42例中34例（81.0%）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、そう痒症6例（14.3%）、斑状丘疹状皮疹6例（14.3%）及び倦怠感5例（11.9%）であった。

#### 17.1.2 海外第Ⅱ相試験（KEYNOTE-002試験）

イピリムマブによる治療歴を有する根治切除不能な悪性黒色腫患者を対象に、本剤2mg/kg 3週間間隔投与[注1)]及び10mg/kg 3週間間隔投与[注1)]の有効性及び安全性が、化学療法（ダカルバジン、テモゾロミド、カルボプラチン、パクリタキセル又はカルボプラチン+パクリタキセル）を対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤は化学療法と比較して、PFSを有意に延長した（表1、図1及び図2）[1)]。


本剤2mg/kg 3週間間隔投与[注1)]の安全性解析対象例178例中121例（68.0%）、及び本剤10mg/kg 3週間間隔投与[注1)]の安全性解析対象例179例中133例（74.3%）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、本剤2mg/kgの3週間間隔投与[注1)]で疲労40例（22.5%）、そう痒症37例（20.8%）及び発疹21例（11.8%）、本剤10mg/kgの3週間間隔投与[注1)]で疲労52例（29.1%）、そう痒症42例（23.5%）、下痢19例（10.6%）及び発疹18例（10.1%）であった。

表1　有効性成績（KEYNOTE-002試験）

| | | 本剤2mg/kg Q3W（180例） | 本剤10mg/kg Q3W（181例） | 化学療法（179例） |
|---|---|---|---|---|
| OS | 中央値［月］（95%信頼区間） | 13.4（11.0, 16.4） | 14.7（11.3, 19.5） | 11.0（8.9, 13.8） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.86（0.67, 1.10）0.1173 | 0.74（0.57, 0.96）0.0106 | − |
| PFS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 2.9（2.8, 3.8） | 2.9（2.8, 4.7） | 2.7（2.5, 2.8） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.57（0.45, 0.73）<0.0001 | 0.50（0.39, 0.64）<0.0001 | − |

†：RECISTガイドライン1.1版に基づく独立した放射線科医及び腫瘍専門医による評価
‡：層別Cox比例ハザードモデルによる化学療法との比較
§：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与


図1　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-002試験）




at risk数

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤 2 mg/kg Q3W | 180 | 131 | 95 | 70 | 61 | 11 | 0 |
| 本剤10mg/kg Q3W | 181 | 138 | 99 | 79 | 67 | 12 | 0 |
| 化学療法 | 179 | 115 | 80 | 60 | 48 | 9 | 0 |

図2　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-002試験）




at risk数

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤 2 mg/kg Q3W | 180 | 153 | 74 | 53 | 26 | 9 | 4 | 2 |
| 本剤10mg/kg Q3W | 181 | 158 | 82 | 55 | 39 | 15 | 5 | 1 |
| 化学療法 | 179 | 128 | 43 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 |

#### 17.1.3 海外第Ⅲ相試験（KEYNOTE-006試験）

イピリムマブによる治療歴のない又はイピリムマブを含まない1レジメンまでの化学療法歴を有する根治切除不能な悪性黒色腫患者を対象に、本剤10mg/kg 3週間間隔投与[注1)]及び10mg/kg 2週間間隔投与[注1)]の有効性及び安全性が、イピリムマブを対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤はイピリムマブと比較して、OS及びPFSを有意に延長した（表2、図3及び図4）[2)]。


本剤10mg/kg 3週間間隔投与[注1)]の安全性解析対象例277例中202例（72.9%）、及び本剤10mg/kg 2週間間隔投与[注1)]の安全性解析対象例278例中221例（79.5%）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、本剤10mg/kg 3週間間隔投与[注1)]で疲労53例（19.1%）、下痢40例（14.4%）、そう痒症39例（14.1%）、発疹37例（13.4%）、関節痛32例（11.6%）、悪心31例（11.2%）、無力症31例（11.2%）及び尋常性白斑31例（11.2%）、本剤10mg/kg 2週間間隔投与[注1)]で疲労58例（20.9%）、下痢47例（16.9%）、発疹41例（14.7%）、そう痒症40例（14.4%）、無力症32例（11.5%）及び悪心28例（10.1%）であった。

表2　有効性成績（KEYNOTE-006試験）

| | | 本剤10mg/kg Q3W（277例） | 本剤10mg/kg Q2W（279例） | イピリムマブ（278例） |
|---|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | NE（NE, NE） | NE（NE, NE） | NE（13, NE） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.69（0.52, 0.90）0.00358 | 0.63（0.47, 0.83）0.00052 | − |
| PFS‖¶ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 4.1（2.9, 6.9） | 5.5（3.4, 6.9） | 2.8（2.8, 2.9） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.58（0.47, 0.72）<0.00001 | 0.58（0.46, 0.72）<0.00001 | − |

†：中間解析時のデータ：2015年3月3日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるイピリムマブとの比較
§：層別ログランク検定
‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく独立した放射線科医及び腫瘍専門医による評価
¶：中間解析時のデータ：2014年9月3日カットオフ
Q3W：3週間間隔投与、Q2W：2週間間隔投与、NE：Not Estimated


図3　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-006試験）




at risk数

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤10mg/kg Q2W | 279 | 266 | 248 | 233 | 219 | 212 | 177 | 67 | 19 | 0 |
| 本剤10mg/kg Q3W | 277 | 266 | 251 | 238 | 215 | 202 | 158 | 71 | 18 | 0 |
| イピリムマブ | 278 | 242 | 212 | 188 | 169 | 157 | 117 | 51 | 17 | 0 |

図4　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-006試験）




| at risk数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤10mg/kg Q2W | 279 | 231 | 147 | 98 | 49 | 7 | 2 | 0 |
| 本剤10mg/kg Q3W | 277 | 235 | 133 | 95 | 53 | 7 | 1 | 1 |
| イピリムマブ | 278 | 186 | 88 | 42 | 18 | 2 | 0 | 0 |

注1）悪性黒色腫の場合、本剤の承認用法及び用量は、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。ただし、術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

17.1.4 国際共同第Ⅲ相試験（EORTC-1325-MG／KEYNOTE-054試験）

完全切除後のステージⅢ［ⅢA期（リンパ節転移1mm超）、ⅢB期及びⅢC期］の悪性黒色腫患者（日本人15例を含む）を対象に、術後補助療法として本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、プラセボを対照として検討された。全患者集団で、本剤はプラセボと比較して、主要評価項目である無再発生存期間（RFS）を有意に延長した（表3及び図5）。


安全性解析対象例509例中396例（77.8%）（日本人9例中5例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労143例（28.1%）、下痢94例（18.5%）、そう痒症85例（16.7%）、甲状腺機能低下症73例（14.3%）、悪心58例（11.4%）及び関節痛51例（10.0%）であった。［5.1 参照］

表3　有効性成績（EORTC-1325-MG／KEYNOTE-054試験）

| | | 本剤200mg Q3W（514例） | プラセボ（505例） |
|---|---|---|---|
| RFS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | NE（NE, NE） | 20.4（16.2, NE） |
| | ハザード比‡（98%信頼区間）P値§ | 0.57（0.43, 0.74）<0.0001 | − |

†：中間解析時のデータ：2017年10月2日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボとの比較
§：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与、NE：Not Estimated

図5　RFSのKaplan-Meier曲線（EORTC-1325-MG／KEYNOTE-054試験）




| at risk数 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 514 | 438 | 413 | 392 | 313 | 182 | 73 | 15 | 0 |
| プラセボ | 505 | 415 | 363 | 323 | 264 | 157 | 60 | 15 | 0 |

17.1.5 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-716試験）

完全切除後のステージⅡB期又はⅡC期の悪性黒色腫患者（日本人3例を含む）を対象に、術後補助療法として本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、プラセボを対照とした二重盲検試験で検討された。1回目の中間解析（2020年12月4日データカットオフ）において、全患者集団で、本剤はプラセボと比較して、主要評価項目である無再発生存期間（RFS）を有意に延長した（表4及び図6）。


安全性解析対象例483例中400例（82.8%）（日本人2例中2例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、そう痒症117例（24.2%）、疲労102例（21.1%）、下痢90例（18.6%）、関節痛78例（16.1%）、発疹76例（15.7%）及び甲状腺機能低下症75例（15.5%）であった（2回目の中間解析、2021年6月21日データカットオフ）。［5.1 参照］

表4　有効性成績（KEYNOTE-716試験）

| | | 本剤200mg Q3W（487例） | プラセボ（489例） |
|---|---|---|---|
| RFS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | NE（22.6, NE） | NE（NE, NE） |
| | 1年RFS率［%］（95%信頼区間） | 90.5（87.1, 93.0） | 83.1（79.0, 86.5） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.65（0.46, 0.92）0.00658 | − |

†：1回目の中間解析時のデータ：2020年12月4日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボとの比較
§：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与、NE：Not Estimated

図6　RFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-716試験）




| at risk数 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 487 | 465 | 401 | 340 | 249 | 149 | 71 | 21 | 1 | 0 |
| プラセボ | 489 | 475 | 400 | 336 | 229 | 149 | 77 | 27 | 1 | 0 |

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

17.1.6 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-189試験）

化学療法歴のない、*EGFR*遺伝子変異陰性及び*ALK*融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌患者616例（日本人10例を含む）を対象に、本剤200mg、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤の併用療法3週間間隔投与の有効性及び安全性が、プラセボ、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤の併用療法を対照とした二重盲検試験で検討された。両群とも、プラチナ製剤（シスプラチン又はカルボプラチン）は担当医師が患者ごとに選択し、投与は最大4コースまでとした。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤とペメトレキセドナトリウム水和物の併用投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤の併用療法はプラセボ、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤の併用療法と比較して、OS及びPFSを有意に延長した（表5、図7及び図8）[3)]。

安全性解析対象例405例中372例（91.9%）（日本人4例中3例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、悪心187例（46.2%）、貧血154例（38.0%）、疲労134例（33.1%）、好中球減少症101例（24.9%）及び食欲減退84例（20.7%）であった。［5.3、7.1 参照］

表5　有効性成績（KEYNOTE-189試験）


| | | 本剤200mg Q3W、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤[注2)]（410例） | プラセボ、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤[注3)]（206例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | NE（NE, NE） | 11.3（8.7, 15.1） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.49（0.38, 0.64）<0.00001 | − |
| PFS†‖ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 8.8（7.6, 9.2） | 4.9（4.7, 5.5） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.52（0.43, 0.64）<0.00001 | − |

†：中間解析時のデータ：2017年11月8日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボ、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤の併用療法との比較
§：層別ログランク検定
‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく盲検下独立中央判定
Q3W：3週間間隔投与、NE：Not Estimated

注2）本剤200mg、ペメトレキセドナトリウム水和物500mg/m²、シスプラチン75mg/m²又はカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量の順にQ3W（各コースの1日目に投与）で4コース投与後、本剤200mg及びペメトレキセドナトリウム水和物500mg/m²をQ3Wで投与した。


注3）プラセボ、ペメトレキセドナトリウム水和物500mg/m²、シスプラチン75mg/m²又はカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量の順にQ3W（各コースの1日目に投与）で4コース投与後、プラセボ及びペメトレキセドナトリウム水和物500mg/m²をQ3Wで投与した。

図7　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-189試験）




| at risk数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤 | 410 | 377 | 347 | 278 | 163 | 71 | 18 | 0 |
| プラセボ、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤 | 206 | 183 | 149 | 104 | 59 | 25 | 8 | 0 |

図8　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-189試験）




| at risk数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤 | 410 | 322 | 256 | 148 | 60 | 17 | 5 | 0 |
| プラセボ、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤 | 206 | 140 | 80 | 40 | 16 | 3 | 1 | 0 |

17.1.7 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-407試験）

化学療法歴のない、切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌患者559例（日本人50例を含む）を対象に、本剤200mg、カルボプラチン及びパクリタキセル又はパクリタキセル（アルブミン懸濁型）（nab-パクリタキセル）の併用療法3週間間隔投与の有効性及び安全性が、プラセボ、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセルの併用療法を対照とした二重盲検試験で検討された。両群とも、パクリタキセル又はnab-パクリタキセルは、担当医師が患者ごとに選択し、投与は最大4コースまでとした。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセルの併用療法はプラセボ、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセルの併用療法と比較して、OS及びPFSを有意に延長した（表6、図9及び図10）[4]。

安全性解析対象例278例中265例（95.3%）（日本人22例中22例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、脱毛症126例（45.3%）、貧血123例（44.2%）、好中球減少症97例（34.9%）、悪心85例（30.6%）、血小板減少症81例（29.1%）及び下痢61例（21.9%）であった。[7.1 参照]

表6　有効性成績（KEYNOTE-407試験）


| | | 本剤200mg Q3W、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセル注4)（278例） | プラセボ、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセル注5)（281例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 15.9（13.2, NE） | 11.3（9.5, 14.8） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.64（0.49, 0.85）<br>0.0008 | − |
| PFS†‖ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 6.4（6.2, 8.3） | 4.8（4.2, 5.7） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.56（0.45, 0.70）<br><0.0001 | − |

†：中間解析時のデータ：2018年4月3日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボ、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセルの併用療法との比較
§：層別ログランク検定
‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく盲検下独立中央判定
Q3W：3週間間隔投与、NE：Not Estimated

注4）本剤200mg、パクリタキセル200mg/m²又はnab-パクリタキセル100mg/m²、カルボプラチンAUC 6mg・min/mL相当量の順にQ3W（本剤、カルボプラチン及びパクリタキセルは各コースの1日目に投与、nab-パクリタキセルは各コースの1、8、15日目に投与）で4コース投与後、本剤200mgをQ3Wで投与した。


注5）プラセボ、パクリタキセル200mg/m²又はnab-パクリタキセル100mg/m²、カルボプラチンAUC 6mg・min/mL相当量の順にQ3W（プラセボ、カルボプラチン及びパクリタキセルは各コースの1日目に投与、nab-パクリタキセルは各コースの1、8、15日目に投与）で4コース投与後、プラセボをQ3Wで投与した。

図9　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-407試験）




| at risk数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセル | 278 | 256 | 188 | 124 | 62 | 17 | 2 | 0 |
| プラセボ、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセル | 281 | 246 | 175 | 93 | 45 | 16 | 4 | 0 |

図10　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-407試験）




| at risk数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセル | 278 | 223 | 142 | 57 | 23 | 5 | 0 |
| プラセボ、カルボプラチン及びパクリタキセル又はnab-パクリタキセル | 281 | 190 | 90 | 26 | 12 | 4 | 0 |

17.1.8 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-042試験）

化学療法歴のない、*EGFR*遺伝子変異陰性、*ALK*融合遺伝子陰性及びPD-L1陽性（TPS≧1%）の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者（日本人93例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、プラチナ製剤を含む化学療法を対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）とされ、本剤はプラチナ製剤を含む化学療法と比較して、OSを有意に延長した（表7及び図11）[5]。


安全性解析対象例636例中399例（62.7%）（日本人47例中34例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は甲状腺機能低下症69例（10.8%）であった。[5.2、5.3 参照]

表7　有効性成績（KEYNOTE-042試験）
（PD-L1発現がTPS≧1%の患者）

| | | 本剤200mg Q3W（637例） | プラチナ製剤を含む化学療法（637例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 16.7（13.9, 19.7） | 12.1（11.3, 13.3） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.81（0.71, 0.93）<br>0.002 | − |

†：中間解析時のデータ：2018年2月26日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラチナ製剤を含む化学療法との比較
§：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与

図11　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-042試験）
（PD-L1発現がTPS≧1%の患者）




| at risk数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 637 | 463 | 365 | 214 | 112 | 35 | 2 | 0 |
| プラチナ製剤を含む化学療法 | 637 | 485 | 316 | 166 | 88 | 24 | 1 | 0 |

17.1.9 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-024試験）

化学療法歴のない、*EGFR*遺伝子変異陰性、*ALK*融合遺伝子陰性及びPD-L1陽性（TPS≧50%）の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者（日本人40例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、プラチナ製剤を含む化学療法を対照として検討された。

なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は無増悪生存期間（PFS）、副次評価項目は全生存期間（OS）とされ、本剤はプラチナ製剤を含む化学療法と比較して、PFS及びOSを有意に延長した（表8、図12及び図13）[6]。


安全性解析対象例154例中113例（73.4%）（日本人21例中20例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、下痢22例（14.3%）、疲労16例（10.4%）及び発熱16例（10.4%）であった。[5.2、5.3 参照]

表8　有効性成績（KEYNOTE-024試験）
（PD-L1発現がTPS≧50%の患者）

| | | 本剤200mg Q3W<br>（154例） | プラチナ製剤を含む化学療法<br>（151例） |
|---|---|---|---|
| PFS† | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | 10.3<br>（6.7, NE） | 6.0<br>（4.2, 6.2） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.50<br>（0.37, 0.68）<br><0.001 | − |
| OS‖ | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | NE<br>（NE, NE） | NE<br>（9.4, NE） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.60<br>（0.41, 0.89）<br>0.005 | − |


†：RECISTガイドライン1.1版に基づく独立中央判定
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラチナ製剤を含む化学療法との比較
§：層別ログランク検定
‖：中間解析時のデータ：2016年5月9日カットオフ
Q3W：3週間間隔投与、NE：Not Estimated

図12　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-024試験）
（PD-L1発現がTPS≧50%の患者）




| at risk数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 154 | 104 | 89 | 44 | 22 | 3 | 1 |
| プラチナ製剤を含む化学療法 | 151 | 99 | 70 | 18 | 9 | 1 | 0 |

図13　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-024試験）
（PD-L1発現がTPS≧50%の患者）




| at risk数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 154 | 136 | 121 | 82 | 39 | 11 | 2 | 0 |
| プラチナ製剤を含む化学療法 | 151 | 123 | 106 | 64 | 34 | 7 | 1 | 0 |

17.1.10 国際共同第Ⅱ／Ⅲ相試験（KEYNOTE-010試験）

プラチナ製剤を含む化学療法歴[注6)]を有するPD-L1陽性（TPS≧1%）の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者（日本人91例を含む）を対象に、本剤2mg/kg 3週間間隔投与[注7)]及び10mg/kg 3週間間隔投与[注7)]の有効性及び安全性が、ドセタキセルを対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤はドセタキセルと比較して、OSを有意に延長した（表9及び図14）[7)]。本剤2mg/kg 3週間間隔投与[注7)]の安全性解析対象例339例中215例（63.4%）（日本人28例中22例を含む）、及び本剤10mg/kg 3週間間隔投与[注7)]の安全性解析対象例343例中226例（65.9%）（日本人34例中30例）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、本剤2mg/kg 3週間間隔投与[注7)]で疲労46例（13.6%）、食欲減退46例（13.6%）及び悪心37例（10.9%）、本剤10mg/kg 3週間間隔投与[注7)]で疲労49例（14.3%）及び発疹44例（12.8%）であった。［5.2、5.3 参照］


注6）*EGFR*遺伝子変異陽性又は*ALK*融合遺伝子陽性の患者では、プラチナ製剤を含む化学療法による治療歴に加え、それぞれEGFR阻害作用又はALK阻害作用を有する抗悪性腫瘍剤による治療歴を有する患者が組み入れられた。

表9　有効性成績（KEYNOTE-010試験）
（PD-L1発現がTPS≧1%の患者）

| | | 本剤2mg/kg<br>Q3W<br>（344例） | 本剤10mg/kg<br>Q3W<br>（346例） | ドセタキセル<br><br>（343例） |
|---|---|---|---|---|
| OS | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | 10.4<br>（9.4, 11.9） | 12.7<br>（10.0, 17.3） | 8.5<br>（7.5, 9.8） |
| | ハザード比†<br>（95%信頼区間）<br>P値‡ | 0.71<br>（0.58, 0.88）<br><0.001 | 0.61<br>（0.49, 0.75）<br><0.001 | − |

†：層別Cox比例ハザードモデルによるドセタキセルとの比較
‡：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与

図14　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-010試験）
（PD-L1発現がTPS≧1%の患者）




| at risk数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤2mg/kg Q3W | 344 | 259 | 115 | 49 | 12 | 0 |
| 本剤10mg/kg Q3W | 346 | 255 | 124 | 56 | 6 | 0 |
| ドセタキセル | 343 | 212 | 79 | 33 | 1 | 0 |

注7）切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の場合、本剤の承認用法及び用量は、通常、成人には、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。

〈非小細胞肺癌における術前・術後補助療法〉

17.1.11 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-671試験）

臨床病期Ⅱ期、ⅢA期又はⅢB期の周術期の非小細胞肺癌患者[注8)] 797例（日本人82例を含む）を対象に、術前補助療法としての本剤と化学療法との併用療法、及び術後補助療法としての本剤単独療法[注9)]の有効性及び安全性が、術前補助療法としてのプラセボと化学療法との併用療法、及び術後補助療法としてのプラセボ投与[注10)]を対照とした二重盲検試験で検討された[8)]。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無イベント生存期間（EFS）とされ、術前補助療法としての本剤と化学療法との併用療法、及び術後補助療法としての本剤単独療法は、術前補助療法としてのプラセボと化学療法との併用療法、及び術後補助療法としてのプラセボ投与と比較してOS及びEFSを有意に延長した（表10、図15及び図16）。安全性解析対象例396例中383例（96.7%）（日本人39例中39例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、悪心216例（54.5%）、好中球数減少169例（42.7%）、貧血143例（36.1%）、白血球数減少111例（28.0%）、疲労108例（27.3%）、便秘107例（27.0%）及び食欲減退92例（23.2%）であった（2023年7月10日データカットオフ）。［5.4、7.2 参照］

表10　有効性成績（KEYNOTE-671試験）

| 術前補助療法／術後補助療法 | | 本剤と化学療法との併用療法／本剤[注9)]<br>（397例） | プラセボと化学療法との併用療法／プラセボ[注10)]<br>（400例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | NE<br>（NE, NE） | 52.4<br>（45.7, NE） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.72<br>（0.56, 0.93）<br>0.00517 | − |
| EFS‖ | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | NE<br>（34.1, NE） | 17.0<br>（14.3, 22.0） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.58<br>（0.46, 0.72）<br><0.00001 | − |


†：中間解析時のデータ：2023年7月10日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと化学療法との併用療法／プラセボとの比較
§：層別ログランク検定
‖：中間解析時のデータ：2022年7月29日カットオフ（EFSは治験担当医師による評価）
NE：Not Estimated

注8）臨床病期はAmerican Joint Committee on Cancer（AJCC）/ Union for International Cancer Control（UICC）病期分類（第8版）に基づく。なお、ⅢB期はT3N2M0、T4N2M0に該当する患者が対象とされた。*EGFR*遺伝子変異陽性又は*ALK*融合遺伝子陽性の患者を含む。

注9）術前補助療法として本剤200mg 3週間間隔投与（Q3W）（各コースの1日目に投与）と以下の化学療法を最大4コース併用し、術後補助療法として本剤200mg Q3W（各コースの1日目に投与）を13コース投与した［扁平上皮非小細胞肺癌：ゲムシタビン1000mg/m²（1コース21日間、各コースの1、8日目に投与）、シスプラチン75mg/m²（1コース21日間、各コースの1日目に投与）を投与。非扁平上皮非小細胞肺癌：ペメトレキセド500mg/m²、シスプラチン75mg/m²をQ3Wで各コースの1日目に投与］。


注10）術前補助療法としてプラセボQ3W（各コースの1日目に投与）と注9）と同一の化学療法を最大4コース併用し、術後補助療法としてプラセボQ3W（各コースの1日目に投与）を13コース投与した。

図15　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-671試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と化学療法との併用療法／本剤 | 397 | 371 | 347 | 327 | 277 | 205 | 148 | 108 | 69 | 32 | 4 | 0 |
| プラセボと化学療法との併用療法／プラセボ | 400 | 379 | 347 | 319 | 256 | 176 | 125 | 77 | 39 | 20 | 4 | 0 |

図16　EFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-671試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と化学療法との併用療法／本剤 | 397 | 330 | 236 | 172 | 117 | 72 | 42 | 11 | 0 | 0 |
| プラセボと化学療法との併用療法／プラセボ | 400 | 294 | 183 | 124 | 74 | 38 | 24 | 9 | 1 | 0 |

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

17.1.12 国際共同第Ⅱ相試験（KEYNOTE-087試験）

再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫患者（210例、日本人10例を含む）の以下の3つのコホートを対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が検討された。

- 自家造血幹細胞移植施行後に、ブレンツキシマブ ベドチンによる治療を受けた患者（コホート1）
- 自家造血幹細胞移植非適応であり、かつブレンツキシマブ ベドチンによる治療を受けた患者（コホート2）
- 自家造血幹細胞移植施行後に、ブレンツキシマブ ベドチンによる治療（一次治療又は救援化学療法の一環としてのブレンツキシマブ ベドチンによる前治療は含まない）を受けていない患者（コホート3）

なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。

主要評価項目である奏効率［改訂IWG criteria（2007）に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は、表11のとおりであった。

なお、事前に設定された閾値奏効率は、いずれのコホートも20%であった。

安全性解析対象例210例中144例（68.6%）（日本人10例中8例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、甲状腺機能低下症26例（12.4%）及び発熱22例（10.5%）であった。[5.5 参照]

表11　有効性成績（KEYNOTE-087試験）

| | | コホート1（69例） | コホート2（81例） | コホート3（60例） |
|---|---|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 15（21.7） | 18（22.2） | 13（21.7） |
| | 部分奏効（PR） | 35（50.7） | 35（43.2） | 27（45.0） |
| | 安定（SD） | 13（18.8） | 9（11.1） | 13（21.7） |
| | 進行（PD） | 3（4.3） | 17（21.0） | 7（11.7） |
| | 評価不能 | 3（4.3） | 2（2.5） | 0 |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 72.5（60.4, 82.5） | 65.4（54.0, 75.7） | 66.7（53.3, 78.3） |

17.1.13 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-204試験）

1レジメン以上の化学療法歴を有する再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫患者[注11] 304例（日本人16例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、ブレンツキシマブ ベドチン1.8mg/kg 3週間間隔投与を対照として検討された。主要評価項目は無増悪生存期間（PFS）[注12] 及び全生存期間（OS）とされ、本剤はブレンツキシマブ ベドチンと比較して、PFSを有意に延長した（表12及び図17）[9]。

安全性解析対象例148例中110例（74.3%）（日本人9例中8例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、甲状腺機能低下症23例（15.5%）、発熱19例（12.8%）、そう痒症16例（10.8%）であった。[5.5 参照]

注11）自家造血幹細胞移植施行後に再発、又は自家造血幹細胞移植の適応とならない患者が対象とされた。


注12）自家造血幹細胞移植後又は同種造血幹細胞移植後の臨床データ及び画像データを含めて評価を行うこととされた。

表12　有効性成績（KEYNOTE-204試験）

| | | 本剤200mg Q3W（151例） | ブレンツキシマブ ベドチン（153例） |
|---|---|---|---|
| PFS†‡ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 13.2（10.9, 19.4） | 8.3（5.7, 8.8） |
| | ハザード比§（95%信頼区間）P値‖ | 0.65（0.48, 0.88）0.0027 | − |

†：中間解析時のデータ：2020年1月16日カットオフ
‡：改訂IWG criteria（2007）に基づく独立中央判定
§：層別Cox比例ハザードモデルによるブレンツキシマブ ベドチンとの比較
‖：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与

図17　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-204試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 151 | 116 | 96 | 74 | 65 | 55 | 44 | 35 | 18 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ブレンツキシマブ ベドチン | 153 | 103 | 63 | 41 | 32 | 26 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |

〈根治切除不能な尿路上皮癌〉

17.1.14 国際共同第Ⅲ相試験（EV-302／KEYNOTE-A39試験）

化学療法歴のない根治切除不能な尿路上皮癌患者[注13] 886例（日本人40例を含む）を対象に、本剤とエンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）との併用療法の有効性及び安全性が、プラチナ製剤を含む化学療法（ゲムシタビン及びシスプラチン又はカルボプラチン）を対照として検討された。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤とエンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）との併用療法はプラチナ製剤を含む化学療法と比較して、OS及びPFSを有意に延長した（表13、図18及び図19）[10]。

安全性解析対象例440例中427例（97.0%）（日本人19例中19例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、末梢性感覚ニューロパチー220例（50.0%）、そう痒症175例（39.8%）、脱毛症146例（33.2%）、斑状丘疹状皮疹144例（32.7%）、疲労129例（29.3%）、下痢121例（27.5%）、食欲減退118例（26.8%）及び悪心89例（20.2%）であった。

表13　有効性成績（EV-302／KEYNOTE-A39試験）

| | | 本剤とエンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）との併用療法[注14]（442例） | プラチナ製剤を含む化学療法[注15]（444例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 31.5（25.4, NE） | 16.1（13.9, 18.3） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.47（0.38, 0.58）<0.00001 | − |
| PFS†‖ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 12.5（10.4, 16.6） | 6.3（6.2, 6.5） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.45（0.38, 0.54）<0.00001 | − |


†：中間解析時のデータ：2023年8月8日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラチナ製剤を含む化学療法との比較
§：層別ログランク検定によるP値（両側）
‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく盲検下独立中央判定
NE：Not Estimated

注13）術前又は術後補助化学療法が行われた場合は、終了後12ヵ月超を経過した後に再発した患者が対象とされた。

注14）21日を1コースとして、本剤200mgを1日目に、エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）1.25mg/kgを1、8日目に投与した。併用投与時においては、エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）を最初に投与し、本剤はエンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）の投与終了から約30分の間隔をおいて投与を開始した。なお、本剤の投与は最大35コースまでとした。


注15）21日を1コースとして、ゲムシタビン1000mg/m²を1、8日目に、治験担当医師が選択したプラチナ製剤（シスプラチン70mg/m²又はカルボプラチンAUC 4.5又は5mg・min/mL相当量）を1日目に投与した。プラチナ製剤を含む化学療法は最大6コースまでとした。また、試験開始後にプラチナ製剤を含む化学療法後の維持療法としてアベルマブ（遺伝子組換え）の投与が許容された。

図18　OSのKaplan-Meier曲線（EV-302／KEYNOTE-A39試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤とエンホルツマブ　ペドチン（遺伝子組換え）との併用療法 | 442 | 426 | 409 | 394 | 376 | 331 | 270 | 222 | 182 | 141 | 108 | 67 | 36 | 22 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| プラチナ製剤を含む化学療法 | 444 | 423 | 393 | 356 | 317 | 263 | 209 | 164 | 125 | 90 | 60 | 37 | 25 | 18 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 |

図19　PFSのKaplan-Meier曲線（EV-302／KEYNOTE-A39試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤とエンホルツマブ　ペドチン（遺伝子組換え）との併用療法 | 442 | 409 | 361 | 303 | 253 | 204 | 167 | 132 | 102 | 73 | 45 | 33 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
| プラチナ製剤を含む化学療法 | 444 | 380 | 297 | 213 | 124 | 78 | 56 | 41 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |

### 17.1.15 海外第Ⅱ相試験（KEYNOTE-052試験）

化学療法歴のないシスプラチンを含む化学療法に不適格の根治切除不能な尿路上皮癌患者370例を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が検討された。主要評価項目である奏効率［RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は、表14のとおりであった[11)]。

安全性解析対象例370例中249例（67.3%）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労67例（18.1%）、そう痒症66例（17.8%）、発疹43例（11.6%）、食欲減退40例（10.8%）及び甲状腺機能低下症37例（10.0%）であった（2018年9月26日データカットオフ）。

表14　有効性成績（KEYNOTE-052試験）

| | | 370例 |
|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 33（8.9） |
| | 部分奏効（PR） | 73（19.7） |
| | 安定（SD） | 67（18.1） |
| | 疾患進行（PD） | 157（42.4） |
| | 評価不能（NE） | 40（10.8） |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 28.6（24.1, 33.5） |

### 17.1.16 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-045試験）

プラチナ製剤を含む化学療法歴[注16)]を有する局所進行性又は転移性の尿路上皮癌患者542例（日本人52例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、化学療法（パクリタキセル、ドセタキセル又はvinflunine）[注17)]を対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤は化学療法と比較して、OSを有意に延長した（表15及び図20）[12)]。

安全性解析対象例266例中162例（60.9%）（日本人30例中16例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、そう痒症52例（19.5%）、疲労37例（13.9%）及び悪心29例（10.9%）であった。

注16）①プラチナ製剤を含む化学療法（一次治療）後に疾患進行を認めた患者及び②プラチナ製剤を含む化学療法による術前・術後補助化学療法後12ヵ月以内に再発した患者が組み入れられた。


注17）本邦ではvinflunineは未承認であるため、パクリタキセル又はドセタキセルのいずれかを選択した。

表15　有効性成績（KEYNOTE-045試験）

| | | 本剤200mg Q3W（270例） | 化学療法（272例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 10.3（8.0, 11.8） | 7.4（6.1, 8.3） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.73（0.59, 0.91）0.002 | – |
| PFS†‖ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 2.1（2.0, 2.2） | 3.3（2.3, 3.5） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.98（0.81, 1.19）0.416 | – |

†：中間解析時のデータ：2016年9月7日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによる化学療法との比較
§：層別ログランク検定
‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく独立中央判定
Q3W：3週間間隔投与

図20　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-045試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 270 | 226 | 194 | 169 | 147 | 131 | 87 | 54 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 化学療法 | 272 | 232 | 171 | 138 | 109 | 89 | 55 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |

〈がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）〉

### 17.1.17 国際共同第Ⅱ相試験（KEYNOTE-164試験　コホートA）

フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカンによる化学療法歴のある切除不能な局所進行又は転移性のミスマッチ修復（MMR）欠損又はMSI-Highを有する結腸・直腸癌患者61例（日本人7例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目である奏効率［RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は表16のとおりであった。

安全性解析対象例61例中35例（57.4%）（日本人7例中5例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、関節痛10例（16.4%）、悪心9例（14.8%）、下痢8例（13.1%）、無力症7例（11.5%）及びそう痒症7例（11.5%）であった。[5.11 参照]

表16　有効性成績（KEYNOTE-164試験　コホートA）

| | | 61例 |
|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 0 |
| | 部分奏効（PR） | 17（27.9） |
| | 安定（SD） | 14（23.0） |
| | 疾患進行（PD） | 28（45.9） |
| | 評価不能（NE） | 2（3.3） |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 27.9（17.1, 40.8） |

### 17.1.18 国際共同第Ⅱ相試験（KEYNOTE-158試験）

一次治療として標準的な化学療法歴のある切除不能な局所進行又は転移性のミスマッチ修復（MMR）欠損又はMSI-Highを有する固形癌患者94例（日本人7例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が検討された。MSI-Highと診断された後に本試験に登録された83例（グループK）における主要評価項目である奏効率［RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は表17のとおりであった。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。

安全性解析対象例94例中58例（61.7%）（日本人7例中5例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労11例（11.7%）及びそう痒症11例（11.7%）であった。

表17　有効性成績（KEYNOTE-158試験）

| | | グループK 83例† |
|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 4（4.8） |
| | 部分奏効（PR） | 25（30.1） |
| | 安定（SD） | 20（24.1） |
| | 疾患進行（PD） | 24（28.9） |
| | 評価不能（NE） | 10（12.0） |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 34.9（24.8, 46.2） |

†：日本人3例を含む

本試験に登録された94例におけるがん種別の奏効率［RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は表18のとおりであった。[5.11 参照]

表18　がん種別の有効性成績（KEYNOTE-158試験）

| がん種 | 例数（%） | 奏効（CR+PR）［奏効率（%）］ |
|---|---|---|
| | 94例 | |
| 子宮内膜癌 | 24（25.5） | 13（54.2） |
| 胃癌 | 13（13.8） | 6（46.2） |
| 小腸癌 | 13（13.8） | 4（30.8） |
| 膵癌 | 10（10.6） | 1（10.0） |
| 胆道癌 | 9（9.6） | 2（22.2） |
| 副腎皮質癌 | 3（3.2） | 1（33.3） |
| 中皮腫 | 3（3.2） | 0 |
| 小細胞肺癌 | 3（3.2） | 2（66.7） |
| 子宮頸癌 | 2（2.1） | 1（50.0） |
| 神経内分泌腫瘍 | 2（2.1） | 0 |
| 甲状腺癌 | 2（2.1） | 0 |
| 尿路上皮癌 | 2（2.1） | 1（50.0） |

| がん種 | 例数（%）<br>94例 | 奏効（CR+PR）<br>［奏効率（%）］ |
|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 1（1.1） | 0 |
| 卵巣癌 | 1（1.1） | 0 |
| 前立腺癌 | 1（1.1） | 0 |
| 後腹膜腫瘍 | 1（1.1） | 1（100） |
| 唾液腺癌 | 1（1.1） | 1（100） |
| 肉腫 | 1（1.1） | 1（100） |
| 精巣腫瘍 | 1（1.1） | 0 |
| 扁桃癌 | 1（1.1） | 1（100） |

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉

17.1.19 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-426試験）

化学療法歴のない、根治切除不能又は転移性の淡明細胞型腎細胞癌患者861例（日本人94例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与とアキシチニブ開始用量として5mg 1日2回投与の併用療法の有効性及び安全性が、スニチニブ50mg 1日1回4週間投与後2週間休薬を対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤とアキシチニブの併用投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤とアキシチニブの併用療法は、スニチニブ単独投与と比較してOS及びPFSを有意に延長した（表19、図21及び図22）。


安全性解析対象例429例中413例（96.3%）（日本人44例中44例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、下痢210例（49.0%）、高血圧179例（41.7%）、甲状腺機能低下症135例（31.5%）、疲労130例（30.3%）、手掌・足底発赤知覚不全症候群119例（27.7%）、ALT増加102例（23.8%）、発声障害98例（22.8%）、AST増加97例（22.6%）、食欲減退94例（21.9%）及び悪心91例（21.2%）であった。［7.6 参照］

表19　有効性成績（KEYNOTE-426試験）

| | | 本剤200mg Q3W、アキシチニブ[注18]<br>（432例） | スニチニブ[注19]<br>（429例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | NE<br>（NE, NE） | NE<br>（NE, NE） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.53<br>（0.38, 0.74）<br>0.00005 | − |
| PFS†‖ | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | 15.1<br>（12.6, 17.7） | 11.0<br>（8.7, 12.5） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.69<br>（0.56, 0.84）<br>0.00012 | − |


†：中間解析時のデータ：2018年8月24日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるスニチニブとの比較
§：層別ログランク検定
‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく盲検下独立中央判定
注18）本剤200mgをQ3W、アキシチニブ開始用量として5mg（経口）をbidで投与した。
注19）スニチニブ50mgを4週間qd経口投与後2週間休薬した。
Q3W：3週間間隔投与、NE：Not Estimated、bid：1日2回、qd：1日1回

図21　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-426試験）




| at risk数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W 及びアキシチニブ | 432 | 417 | 378 | 256 | 136 | 18 | 0 |
| スニチニブ | 429 | 401 | 341 | 211 | 110 | 20 | 0 |

図22　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-426試験）




| at risk数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W 及びアキシチニブ | 432 | 357 | 251 | 140 | 42 | 3 | 0 |
| スニチニブ | 429 | 302 | 193 | 89 | 29 | 1 | 0 |

17.1.20 国際共同第Ⅲ相試験（E7080-307／KEYNOTE-581試験）

化学療法歴のない根治切除不能又は転移性の淡明細胞型腎細胞癌患者[注20] 712例（日本人73例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与とレンバチニブ20mg 1日1回投与の併用療法の有効性及び安全性が、スニチニブ50mg 1日1回4週間投与後2週間休薬を対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤とレンバチニブの併用療法は、スニチニブ単独投与と比較してPFSを有意に延長した（表20及び図23）[13]。

安全性解析対象例352例中341例（96.9%）（日本人42例中42例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、下痢192例（54.5%）、高血圧184例（52.3%）、甲状腺機能低下症150例（42.6%）、食欲減退123例（34.9%）、口内炎113例（32.1%）、疲労113例（32.1%）、手掌・足底発赤知覚不全症候群99例（28.1%）、蛋白尿97例（27.6%）、悪心94例（26.7%）、発声障害87例（24.7%）、発疹77例（21.9%）及び無力症71例（20.2%）であった。［7.6 参照］


注20）腫瘍組織において組織学的又は細胞学的に淡明細胞が確認された患者が対象とされた。

表20　有効性成績（E7080-307／KEYNOTE-581試験）

| | | 本剤200mg Q3W、レンバチニブ[注21]<br>（355例） | スニチニブ[注22]<br>（357例） |
|---|---|---|---|
| PFS† | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | 23.9<br>（20.8, 27.7） | 9.2<br>（6.0, 11.0） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.39<br>（0.32, 0.49）<br><0.0001 | − |

†：RECISTガイドライン1.1版に基づく盲検下独立中央判定
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるスニチニブとの比較
§：層別ログランク検定によるP値（両側）
注21）本剤200mgをQ3W、レンバチニブ20mg（経口）をqdで投与した。
注22）スニチニブ50mgを4週間qd経口投与後2週間休薬した。
Q3W：3週間間隔投与、qd：1日1回

図23　PFSのKaplan-Meier曲線
（E7080-307／KEYNOTE-581試験）




| at risk 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤 200mg Q3W 及びレンバチニブ | 355 | 321 | 300 | 276 | 259 | 235 | 213 | 186 | 160 | 136 | 126 | 106 | 80 | 56 | 30 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| スニチニブ | 357 | 262 | 218 | 145 | 124 | 107 | 85 | 69 | 62 | 49 | 42 | 32 | 25 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | | |

〈腎細胞癌における術後補助療法〉

17.1.21 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-564試験）

腎摘除術又は腎部分切除術後の再発リスクが高い[注23] 淡明細胞型腎細胞癌患者994例（日本人59例を含む）を対象に、術後補助療法として本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、プラセボを対照とした二重盲検試験で検討された。主要評価項目は無病生存期間（DFS）とされ、本剤はプラセボと比較して、DFSを有意に延長した（表21及び図24）[14]。


安全性解析対象例488例中386例（79.1%）（日本人27例中18例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労99例（20.3%）、そう痒症91例（18.6%）、甲状腺機能低下症86例（17.6%）、下痢77例（15.8%）、発疹73例（15.0%）及び甲状腺機能亢進症50例（10.2%）であった。［5.12 参照］

表21　有効性成績（KEYNOTE-564試験）

| | | 本剤200mg Q3W<br>（496例） | プラセボ<br>（498例） |
|---|---|---|---|
| DFS† | 中央値［月］<br>（95%信頼区間） | NE<br>（NE, NE） | NE<br>（NE, NE） |
| | 2年DFS率［%］<br>（95%信頼区間） | 77.3<br>（72.8, 81.1） | 68.1<br>（63.5, 72.2） |
| | ハザード比‡<br>（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.68<br>（0.53, 0.87）<br>0.0010 | − |

†：中間解析時のデータ：2020年12月14日カットオフ（DFSは治験担当医師による評価）
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボとの比較
§：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与、NE：Not Estimated

図24　DFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-564試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 496 | 457 | 414 | 371 | 233 | 151 | 61 | 21 | 1 | 0 |
| プラセボ | 498 | 436 | 389 | 341 | 209 | 145 | 56 | 19 | 1 | 0 |

注23）以下の（i）又は（ii）の患者が組み入れられた。
（i）術後の病理組織学的診断により下記のいずれかに該当する患者（GradeはFuhrman分類）
・pT2、Grade 4又は肉腫様変化を伴う、N0かつM0
・pT3/4、Grade問わず、N0かつM0
・pT問わず、Grade問わず、N1かつM0
（ii）M1 no evidence of disease（M1 NED）であり、原発巣及び遠隔転移巣ともに、腎摘除術時点又は腎摘除術後1年以内のいずれかの時点で完全切除可能であった患者

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

17.1.22 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-048試験）

化学療法歴のない、再発又は転移性の頭頸部扁平上皮癌[注24]患者882例（日本人67例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与、プラチナ製剤及び5-FU併用療法、又は本剤200mg 3週間間隔投与単独療法の有効性及び安全性が、セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU併用療法を対照として検討された。プラチナ製剤（シスプラチン又はカルボプラチン）は担当医師が選択し、プラチナ製剤及び5-FUの投与は最大6コースまでとした。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤とプラチナ製剤及び5-FUの併用投与又は本剤の単独投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤、プラチナ製剤及び5-FU併用療法はセツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU併用療法と比較して、OSを有意に延長した（表22及び図25）。また、本剤の単独療法はセツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU併用療法と比較して、OSは非劣性を示した（表23及び図26）。


本剤、プラチナ製剤及び5-FU併用療法において、安全性解析対象例276例中263例（95.3%）（日本人25例中25例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、貧血133例（48.2%）、悪心124例（44.9%）、好中球減少症91例（33.0%）、疲労84例（30.4%）、粘膜の炎症77例（27.9%）、血小板減少症75例（27.2%）、嘔吐75例（27.2%）、口内炎67例（24.3%）及び食欲減退62例（22.5%）であった。本剤単独療法において、安全性解析対象例300例中175例（58.3%）（日本人23例中17例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労43例（14.3%）及び甲状腺機能低下症39例（13.0%）であった。

表22　本剤併用療法の有効性成績（KEYNOTE-048試験）

| | | 本剤200mg Q3W、プラチナ製剤及び5-FU[注25]（281例） | セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU[注26]（278例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 13.0（10.9, 14.7） | 10.7（9.3, 11.7） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.77（0.63, 0.93）<br>0.00335 | − |

†：中間解析時のデータ：2018年6月13日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるセツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU併用療法との比較
§：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与

図25　本剤併用療法のOSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-048試験）





| at risk数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W、プラチナ製剤及び5-FU | 281 | 227 | 169 | 122 | 75 | 40 | 10 | 1 | 0 | |
| セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU | 278 | 227 | 147 | 100 | 51 | 20 | 5 | 1 | 0 | |

表23　本剤単独療法の有効性成績（KEYNOTE-048試験）

| | | 本剤200mg Q3W（301例） | セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU[注26]（300例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 11.6（10.5, 13.6） | 10.7（9.3, 11.7） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）<br>P値§ | 0.85（0.71, 1.03）<br>0.00014 | − |

†：中間解析時のデータ：2018年6月13日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるセツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU併用療法との比較
§：層別ログランク検定（非劣性P値）
Q3W：3週間間隔投与

図26　本剤単独療法のOSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-048試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 301 | 225 | 172 | 125 | 81 | 37 | 18 | 2 | 0 | |
| セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU | 300 | 245 | 158 | 107 | 57 | 26 | 10 | 1 | 0 | |

CPS［PD-L1を発現した細胞数（腫瘍細胞、マクロファージ及びリンパ球）を総腫瘍細胞数で除し、100を乗じた値］に関する部分集団に基づき、CPS別に解析を行った。［5.14、5.15、7.5 参照］

表24　本剤単独療法のOS†の有効性成績（KEYNOTE-048試験、PD-L1発現状況別）

| PD-L1発現 | 投与群 | 例数 | 中央値［月］（95%信頼区間） | ハザード比（95%信頼区間） |
|---|---|---|---|---|
| CPS＜1 | 本剤200mg Q3W | 44 | 7.9（4.7, 13.6） | 1.37（0.86, 2.20）‡ |
| | セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU[注26] | 45 | 11.3（9.1, 15.9） | |
| 1≦CPS＜20 | 本剤200mg Q3W | 124 | 10.8（9.0, 12.6） | 0.90（0.68, 1.18）‡ |
| | セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU[注26] | 133 | 10.1（8.7, 12.1） | |
| CPS≧20 | 本剤200mg Q3W | 133 | 14.9（11.6, 21.5） | 0.61（0.45, 0.83）§ |
| | セツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU[注26] | 122 | 10.7（8.8, 12.8） | |

†：中間解析時のデータ：2018年6月13日カットオフ
‡：非層別Cox比例ハザードモデルによるセツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU併用療法との比較（探索的な解析）
§：層別Cox比例ハザードモデルによるセツキシマブ、プラチナ製剤及び5-FU併用療法との比較
Q3W：3週間間隔投与

注24）頭頸部癌の原発巣は口腔、中咽頭、下咽頭及び喉頭。
注25）本剤200mg、シスプラチン100mg/m²又はカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量及び5-FU 1000mg/m²/day（4日間持続点滴投与）の順に3週間間隔で6コース投与後、本剤200mgを3週間間隔で投与した。
注26）セツキシマブ（初回400mg/m²、2回目以降250mg/m²）、シスプラチン100mg/m²又はカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量及び5-FU 1000mg/m²/day（4日間持続点滴投与）の順に3週間間隔（セツキシマブのみ1週間間隔）で6コース投与後、セツキシマブ250mg/m²を1週間間隔で投与した。

〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

17.1.23 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-590試験）

化学療法歴のない根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌及び食道腺癌並びに食道胃接合部（Siewert分類type Ⅰ）の腺癌患者749例（日本人141例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与、5-FU及びシスプラチン併用療法の有効性及び安全性が、プラセボ、5-FU及びシスプラチン併用療法を対照として二重盲検試験で検討された。シスプラチンの投与は最大6コースまでとした。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤と5-FU及びシスプラチンの併用投与又は本剤の単独投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤、5-FU及びシスプラチン併用療法はプラセボ、5-FU及びシスプラチン併用療法と比較して、OS及びPFSを有意に延長した（表25、図27及び図28）[15]。

安全性解析対象例370例中364例（98.4%）（日本人74例中73例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、悪心233例（63.0%）、食欲減退145例（39.2%）、貧血143例（38.6%）、疲労135例（36.5%）、好中球数減少135例（36.5%）、嘔吐110例（29.7%）、下痢97例（26.2%）、好中球減少症96例（25.9%）、口内炎96例（25.9%）及び白血球数減少89例（24.1%）であった。


表25　有効性成績（KEYNOTE-590試験）

| | | 本剤200mg Q3W、5-FU及びシスプラチン[注27)]（373例） | プラセボ、5-FU及びシスプラチン[注28)]（376例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 12.4（10.5, 14.0） | 9.8（8.8, 10.8） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.73（0.62, 0.86）<0.0001 | − |
| PFS‖ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 6.3（6.2, 6.9） | 5.8（5.0, 6.0） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.65（0.55, 0.76）<0.0001 | − |

†：中間解析時のデータ：2020年7月2日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボ、5-FU及びシスプラチン併用療法との比較
§：層別ログランク検定
‖：治験担当医師による評価
Q3W：3週間間隔投与


注27）本剤200mg、シスプラチン80mg/m²及び5-FU 800mg/m²/day（5日間持続点滴投与）の順に3週間間隔で6コース投与後、本剤200mg及び5-FU 800mg/m²/day（5日間持続点滴投与）を3週間間隔で投与した。
注28）プラセボ、シスプラチン80mg/m²及び5-FU 800mg/m²/day（5日間持続点滴投与）の順に3週間間隔で6コース投与後、プラセボ及び5-FU 800mg/m²/day（5日間持続点滴投与）を3週間間隔で投与した。

図27　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-590試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W、5-FU及びシスプラチン | 373 | 348 | 295 | 235 | 187 | 151 | 118 | 68 | 36 | 17 | 7 | 2 | 0 |
| プラセボ、5-FU及びシスプラチン | 376 | 338 | 274 | 200 | 147 | 108 | 82 | 51 | 28 | 15 | 4 | 1 | 0 |

図28　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-590試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W、5-FU及びシスプラチン | 373 | 289 | 210 | 96 | 79 | 55 | 45 | 25 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
| プラセボ、5-FU及びシスプラチン | 376 | 278 | 172 | 62 | 36 | 22 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |

### 17.1.24 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-181試験）

一次治療として標準的な化学療法歴のある根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌及び食道腺癌患者628例（日本人152例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、化学療法（パクリタキセル、ドセタキセル又はイリノテカン）を対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）とされ、主解析対象として設定された（i）PD-L1陽性（CPS[注29)]≧10）集団、（ii）扁平上皮癌集団及び（iii）ITT集団におけるOSの結果は事前に規定された基準を満たさなかった。一方、事前規定された解析対象ではないものの、PD-L1陽性（CPS≧10）かつ扁平上皮癌の患者167例（日本人77例を含む）において以下の有効性成績が得られた（表26及び図29）。

PD-L1陽性（CPS≧10）かつ扁平上皮癌の患者における安全性解析対象例85例中55例（64.7%）（日本人40例中26例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労10例（11.8%）及び食欲減退10例（11.8%）であった。[5.16 参照]


注29）PD-L1を発現した細胞数（腫瘍細胞、マクロファージ及びリンパ球）を総腫瘍細胞数で除し、100を乗じた値

表26　有効性成績（KEYNOTE-181試験）
［PD-L1陽性（CPS≧10）かつ扁平上皮癌の患者］

| | | 本剤200mg Q3W（85例） | 化学療法（82例） |
|---|---|---|---|
| OS | 中央値［月］（95%信頼区間） | 10.3（7.0, 13.5） | 6.7（4.8, 8.6） |
| | ハザード比†（95%信頼区間） | 0.64（0.46, 0.90） | − |

†：層別Cox比例ハザードモデルによる化学療法との比較
Q3W：3週間間隔投与

図29　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-181試験）
［PD-L1陽性（CPS≧10）かつ扁平上皮癌の患者］




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 85 | 79 | 70 | 56 | 51 | 43 | 40 | 30 | 27 | 21 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 化学療法 | 82 | 74 | 54 | 42 | 34 | 23 | 18 | 14 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |

〈治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌〉

### 17.1.25 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-177試験）

化学療法歴のない（術後補助療法を除く）治癒切除不能な進行・再発のミスマッチ修復（MMR）欠損又はMSI-Highを有する結腸・直腸癌患者307例（日本人22例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が、担当医師の選択する化学療法［5-FU・ホリナート・オキサリプラチン療法（mFOLFOX6）、mFOLFOX6とベバシズマブ若しくはセツキシマブとの併用療法、5-FU・ホリナート・イリノテカン療法（FOLFIRI）、又はFOLFIRIとベバシズマブ若しくはセツキシマブとの併用療法］を対照として検討された。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は無増悪生存期間（PFS）及び全生存期間（OS）とされ、本剤は化学療法と比較してPFSを有意に延長した（表27及び図30）[16)]。


安全性解析対象例153例中122例（79.7%）（日本人12例中10例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、下痢38例（24.8%）、疲労32例（20.9%）、そう痒症21例（13.7%）、悪心19例（12.4%）、AST増加17例（11.1%）、発疹17例（11.1%）、関節痛16例（10.5%）及び甲状腺機能低下症16例（10.5%）であった。

表27　有効性成績（KEYNOTE-177試験）

| | | 本剤200mg Q3W（153例） | 化学療法[注30)]（154例） |
|---|---|---|---|
| PFS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 16.5（5.4, 32.4） | 8.2（6.1, 10.2） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.60（0.45, 0.80）0.0002 | − |

†：RECISTガイドライン1.1版に基づく独立中央判定
‡：Cox比例ハザードモデルによる化学療法との比較
§：ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与

図30　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-177試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W | 153 | 96 | 77 | 72 | 64 | 60 | 55 | 37 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 化学療法 | 154 | 100 | 68 | 43 | 33 | 22 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |

注30）化学療法の各レジメンは以下のとおり投与した。
mFOLFOX6：
オキサリプラチン85mg/m²、ホリナート400mg/m²又はレボホリナート200mg/m²、5-FU 400mg/m²（急速静注）、5-FU 2400mg/m²（46～48時間持続静注）を2週間間隔で投与した。
FOLFIRI：
イリノテカン塩酸塩水和物180mg/m²、ホリナート400mg/m²又はレボホリナート200mg/m²、5-FU 400mg/m²（急速静注）、5-FU 2400mg/m²（46～48時間持続静注）を2週間間隔で投与した。
ベバシズマブ：
5mg/kgを2週間間隔で投与した。
セツキシマブ：
初回は400mg/m²、2回目以降は250mg/m²を1週間間隔で投与した。

〈PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌〉

17.1.26 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-355試験）

転移・再発乳癌に対する全身性の前治療歴のない転移・再発又は局所進行性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の乳癌患者847例（日本人87例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与+化学療法（ゲムシタビン及びカルボプラチン、パクリタキセル又はnab-パクリタキセル）の併用療法の有効性及び安全性が、プラセボ+化学療法（ゲムシタビン及びカルボプラチン、パクリタキセル又はnab-パクリタキセル）の併用療法を対照とした二重盲検試験で検討された。両群とも、ゲムシタビン及びカルボプラチン、パクリタキセル又はnab-パクリタキセルは、担当医師が患者ごとに選択した。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は無増悪生存期間（PFS）及び全生存期間（OS）とされ、本剤+化学療法の併用療法はプラセボ+化学療法の併用療法と比較して、PD-L1陽性（CPS注31）≧10）の患者323例（日本人28例を含む）においてPFSを有意に延長した（表28及び図31）[17]。

PD-L1陽性（CPS≧10）の患者における安全性解析対象例219例中212例（96.8%）（日本人19例中19例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、貧血107例（48.9%）、悪心90例（41.1%）、好中球減少症87例（39.7%）、脱毛症76例（34.7%）、疲労64例（29.2%）、好中球数減少52例（23.7%）、下痢48例（21.9%）、ALT増加47例（21.5%）及び嘔吐44例（20.1%）であった。[5.20、7.7 参照]

注31）PD-L1を発現した細胞数（腫瘍細胞、マクロファージ及びリンパ球）を総腫瘍細胞数で除し、100を乗じた値

表28　有効性成績（KEYNOTE-355試験）
［PD-L1陽性（CPS≧10）の患者］


| | | 本剤200mg Q3W +化学療法注32)（220例） | プラセボ+化学療法注33)（103例） |
|---|---|---|---|
| PFS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 9.7（7.6, 11.3） | 5.6（5.3, 7.5） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.65（0.49, 0.86）0.0012 | − |

†：RECISTガイドライン1.1版に基づく盲検下独立中央判定
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボ+化学療法との比較
§：層別ログランク検定
Q3W：3週間間隔投与

注32）本剤200mg Q3W（各コースの1日目に投与）と以下の化学療法（担当医師が患者ごとに選択）を併用した［ゲムシタビン1000mg/m²及びカルボプラチンAUC 2mg・min/mL相当量（1コース21日間、各コースの1、8日目に投与）、パクリタキセル90mg/m²（1コース28日間、各コースの1、8、15日目に投与）又はnab-パクリタキセル100mg/m²（1コース28日間、各コースの1、8、15日目に投与）］。

注33）プラセボQ3W（各コースの1日目に投与）と以下の化学療法（担当医師が患者ごとに選択）を併用した［ゲムシタビン1000mg/m²及びカルボプラチンAUC 2mg・min/mL相当量（1コース21日間、各コースの1、8日目に投与）、パクリタキセル90mg/m²（1コース28日間、各コースの1、8、15日目に投与）又はnab-パクリタキセル100mg/m²（1コース28日間、各コースの1、8、15日目に投与）］。

図31　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-355試験）
［PD-L1陽性（CPS≧10）の患者］




at risk数

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤200mg Q3W+化学療法 | 220 | 173 | 122 | 96 | 63 | 52 | 44 | 37 | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| プラセボ+化学療法 | 103 | 80 | 41 | 30 | 18 | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 |

〈ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法〉

17.1.27 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-522試験）

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスク注34)の周術期の乳癌患者1,174例（日本人76例を含む）を対象に、術前薬物療法としての本剤と化学療法との併用療法、及び術後薬物療法としての本剤単独療法注35)の有効性及び安全性が、術前薬物療法としてのプラセボと化学療法との併用療法、及び術後薬物療法としてのプラセボ投与注36)を対照とした二重盲検試験で検討された。主要評価項目の一つは無イベント生存期間（EFS）とされ、術前の本剤と化学療法との併用療法及び術後の本剤単独投与は、術前のプラセボと化学療法との併用療法及び術後のプラセボ投与と比較してEFSを有意に延長した（表29及び図32）[18]。

安全性解析対象例783例中774例（98.9%）（日本人45例中45例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、悪心495例（63.2%）、脱毛症471例（60.2%）、貧血429例（54.8%）、好中球減少症367例（46.9%）、疲労330例（42.1%）、下痢238例（30.4%）、ALT増加204例（26.1%）、嘔吐200例（25.5%）、無力症198例（25.3%）、発疹196例（25.0%）、便秘188例（24.0%）、好中球数減少185例（23.6%）、AST増加157例（20.1%）であった。[5.21、7.8 参照]

表29　有効性成績（KEYNOTE-522試験）

| 術前薬物療法／術後薬物療法 | | 本剤と化学療法との併用療法／本剤注35)（784例） | プラセボと化学療法との併用療法／プラセボ注36)（390例） |
|---|---|---|---|
| EFS† | 3年EFS率（%）（95%信頼区間） | 84.5（81.7, 86.9） | 76.8（72.2, 80.7） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.63（0.48, 0.82）0.00031 | − |


†：中間解析時のデータ：2021年3月23日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと化学療法との併用療法／プラセボとの比較
§：層別ログランク検定

注34）術前薬物療法を開始する前に、画像診断又は臨床診断によりTNM分類でT1cかつN1～2、又はT2～4かつN0～2に該当する遠隔転移を有しない患者が対象とされた。なお、TNM分類について、治験実施計画書第1版ではAmerican Joint Committee on Cancer（AJCC）第7版が、治験実施計画書改訂第2版以降はAJCC第8版が用いられた。

注35）術前薬物療法として本剤200mg 3週間間隔投与（Q3W）（各コースの1日目に投与）と以下の化学療法を併用し、術後薬物療法として本剤200mg Q3W（各コースの1日目に投与）を9コース投与した［パクリタキセル80mg/m² 1週間間隔投与（QW）（1コース21日間、各コースの1、8、15日目に投与）及びカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量Q3W（1コース21日間、各コースの1日目に投与）又はAUC 1.5mg・min/mL 相当量QW（1コース21日間、各コースの1、8、15日目に投与）を4コース、その後ドキソルビシン塩酸塩60mg/m² Q3W又はエピルビシン塩酸塩90mg/m² Q3W（1コース21日間、各コースの1日目に投与）及びシクロホスファミド（無水物換算）600mg/m² Q3W（1コース21日間、各コースの1日目に投与）を4コース投与。ドキソルビシン又はエピルビシンは、治験担当医師が患者ごとに選択した］。

注36）術前薬物療法としてプラセボQ3W（各コースの1日目に投与）と注35）と同一の化学療法を併用し、術後薬物療法としてプラセボQ3W（各コースの1日目に投与）を9コース投与した。

図32　EFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-522試験）




at risk数

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と化学療法との併用療法／本剤 | 784 | 781 | 769 | 751 | 728 | 718 | 702 | 692 | 681 | 671 | 652 | 551 | 433 | 303 | 165 | 28 | 0 | 0 |
| プラセボと化学療法との併用療法／プラセボ | 390 | 386 | 382 | 368 | 358 | 342 | 328 | 319 | 310 | 304 | 297 | 250 | 195 | 140 | 83 | 17 | 0 | 0 |

〈進行・再発の子宮体癌〉

17.1.28 国際共同第Ⅲ相試験（NRG-GY018／KEYNOTE-868試験）

化学療法歴のない注37)進行・再発の子宮体癌患者注38)810例（日本人7例を含む）を対象に、患者のミスマッチ修復（MMR）の状態に基づきMMR正常（pMMR）（588例）又はMMR欠損（dMMR）（222例）の集団別に、本剤と化学療法（パクリタキセル及びカルボプラチン）との併用療法、及びその後の本剤単独療法注39)の有効性及び安全性が、プラセボと化学療法との併用療法、及びその後のプラセボ投与注40)を対照とした二重盲検試験で検討された。主要評価項目は無増悪生存期間（PFS）とされ、pMMR及びdMMRのいずれの集団でも本剤と化学療法との併用療法、及びその後の本剤単独療法は、プラセボと化学療法との併用療法、及びその後のプラセボ投与と比較してPFSを有意に延長した（表30、図33及び図34）。

安全性解析対象例382例中365例（95.5%）（日本人2例中2例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、疲労225例（58.9%）、貧血178例（46.6%）、脱毛症163例（42.7%）、悪心146例（38.2%）、末梢性感覚ニューロパチー117例（30.6%）、便秘112例（29.3%）、下痢110例（28.8%）、末梢性ニューロパチー98例（25.7%）、白血球数減少97例（25.4%）、血小板数減少93例（24.3%）、好中球数減少87例（22.8%）及び関節痛80例（20.9%）であった。[5.23、7.9参照]

表30　PFS†の有効性成績（NRG-GY018／KEYNOTE-868試験、MMRの状態別）

| MMRの状態 | 投与群 | 例数 | 中央値［月］(95%信頼区間) | ハザード比‖ (95%信頼区間) P値¶ |
|---|---|---|---|---|
| pMMR‡ | 本剤と化学療法との併用療法、及びその後の本剤単独療法注39) | 294 | 13.1 (10.6, 19.5) | 0.57 (0.44, 0.74) <0.0001 |
| | プラセボと化学療法との併用療法、及びその後のプラセボ投与注40) | 294 | 8.7 (8.4, 11.0) | |
| dMMR§ | 本剤と化学療法との併用療法、及びその後の本剤単独療法注39) | 110 | NE (30.7, NE) | 0.34 (0.22, 0.53) <0.0001 |
| | プラセボと化学療法との併用療法、及びその後のプラセボ投与注40) | 112 | 8.3 (6.5, 12.3) | |

†：RECISTガイドライン1.1版に基づく治験担当医師判定
‡：中間解析時のデータ：2022年12月6日カットオフ
§：中間解析時のデータ：2022年12月16日カットオフ
‖：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと化学療法との併用療法、及びその後のプラセボ投与との比較
¶：層別ログランク検定
NE：Not Estimated

図33　PFSのKaplan-Meier曲線（NRG-GY018／KEYNOTE-868試験）（pMMRの患者）






図34　PFSのKaplan-Meier曲線（NRG-GY018／KEYNOTE-868試験）（dMMRの患者）




注37）術後補助療法として化学療法歴がある患者の場合、当該化学療法終了後12ヵ月を超えて再発した患者は組入れ可能とされた。
注38）以下のいずれかに該当する患者が対象とされた。
・RECISTガイドライン1.1版に基づく測定可能病変を有するInternational Federation of Gynecology and Obstetrics（以下、「FIGO」）分類（2009年版）Ⅲ期又はⅣA期の子宮体癌患者
・RECISTガイドライン1.1版に基づく測定可能病変の有無を問わないFIGO分類（2009年版）ⅣB期又は再発の子宮体癌患者
注39）本剤200mg 3週間間隔（Q3W）投与（各コースの1日目に投与）とパクリタキセル175mg/m² ［過敏症反応のためパクリタキセルの継続ができない患者に対しては、ドセタキセル75mg/m²（日本は60-70mg/m²）又はアルブミン懸濁型パクリタキセル175mg/m²の投与が可能とされた］及びカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量の順にQ3W投与（各コースの1日目に投与）を6コース投与し、その後、維持療法として本剤400mg 6週間間隔（Q6W）で投与した（試験開始時、維持療法期の本剤は200mg Q3W投与であったが、試験途中で400mg Q6W投与に変更された）。
注40）プラセボQ3W投与（各コースの1日目に投与）と注39）と同一の化学療法を6コース投与し、その後、維持療法としてプラセボQ6Wで投与した（試験開始時、維持療法期のプラセボはQ3W投与であったが、試験途中でQ6W投与に変更された）。

17.1.29 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-775／E7080-309試験）
プラチナ製剤を含む化学療法歴のある切除不能な進行・再発の子宮体癌患者827例（日本人104例を含む）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与とレンバチニブ20mg 1日1回投与の併用療法の有効性及び安全性が、化学療法（ドキソルビシン又はパクリタキセル）を対照として検討された。化学療法は担当医師が患者ごとに選択した。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで投与を継続することが可能とされた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤とレンバチニブの併用療法は、化学療法と比較してOS及びPFSを有意に延長した（表31、図35及び図36）[19]。また、無作為化前に選択された化学療法群の薬剤［①ドキソルビシン（605例）又は②パクリタキセル（222例）］別の部分集団解析を事後的に実施した結果、化学療法群に対する本剤とレンバチニブの併用療法群のPFSのハザード比（95%信頼区間）は、それぞれ①0.47（0.39, 0.58）及び②0.85（0.61, 1.20）であった。また、OSのハザード比（95%信頼区間）は、それぞれ①0.49（0.39, 0.61）及び②1.40（0.93, 2.12）であった。
安全性解析対象例406例中395例（97.3%）（日本人52例中51例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、高血圧249例（61.3%）、甲状腺機能低下症222例（54.7%）、下痢171例（42.1%）、悪心158例（38.9%）、食欲減退151例（37.2%）、疲労113例（27.8%）、蛋白尿105例（25.9%）、嘔吐98例（24.1%）、体重減少91例（22.4%）、関節痛87例（21.4%）及び手掌・足底発赤知覚不全症候群84例（20.7%）であった（2021年2月8日データカットオフ）。[5.23、7.9参照]

表31　有効性成績（KEYNOTE-775／E7080-309試験）

| | | 本剤200mg Q3W、レンバチニブ注41) (411例) | 化学療法注42) (416例) |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］(95%信頼区間) | 18.3 (15.2, 20.5) | 11.4 (10.5, 12.9) |
| | ハザード比‡ (95%信頼区間) P値§ | 0.62 (0.51, 0.75) <0.0001 | − |
| PFS‖ | 中央値［月］(95%信頼区間) | 7.2 (5.7, 7.6) | 3.8 (3.6, 4.2) |
| | ハザード比‡ (95%信頼区間) P値§ | 0.56 (0.47, 0.66) <0.0001 | − |

†：中間解析時のデータ：2020年10月26日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによる化学療法との比較
§：層別ログランク検定
‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく盲検下独立中央判定
注41）本剤200mgをQ3W、レンバチニブ20mg（経口）をqdで投与した。
注42）ドキソルビシン塩酸塩60mg/m²をQ3W、又はパクリタキセル80mg/m²を各コース（1コース28日間）の1、8、15日目に投与した。
Q3W：3週間間隔投与、qd：1日1回

図35　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-775／E7080-309試験）






図36　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-775／E7080-309試験）



〈がん化学療法後に増悪したTMB-Highを有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）〉

17.1.30 国際共同第Ⅱ相試験（KEYNOTE-158試験　グループA～J）

化学療法歴[注43]のある進行・再発の固形癌患者[注44]を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が検討された。本剤の有効性は、TMBスコア[注45]が10以上の場合をTMB-Highと事前に定義し、解析計画に従って、グループA～Jに登録された固形癌患者に対して解析を行った。TMB-Highを有する102例（日本人6例を含む）及びTMB-Highを有しない689例（日本人71例を含む）における、主要評価項目である奏効率［RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は表32のとおりであった。なお、画像評価で疾患進行が認められた場合に、疾患進行を示す症状が認められない等の臨床的に安定している患者では、次回以降の画像評価で疾患進行が認められるまで本剤の投与を継続することが可能とされた。

グループA～Jに登録されTMB-Highを有すると判定された安全性解析対象例105例中67例（63.8%）（日本人6例中5例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労17例（16.2%）、甲状腺機能低下症13例（12.4%）、無力症13例（12.4%）、食欲減退11例（10.5%）及びそう痒症11例（10.5%）であった。

注43）一次治療として標準的に実施されている化学療法並びに日常診療で用いられている手術及び放射線療法を含む治療に抵抗性又は不耐容の患者を組み入れることとされた。

注44）各グループにおいて、それぞれ以下の患者が組み入れられた。
A：肛門癌（扁平上皮癌）、B：胆道癌（胆嚢及び胆管の腺癌、ただしファーター膨大部腫瘍を除く）、C：肺、虫垂、小腸、結腸、直腸及び膵臓由来の神経内分泌腫瘍（高分化型又は中分化型神経内分泌腫瘍）、D：子宮内膜癌（肉腫又は間葉系腫瘍を除く）、E：子宮頸癌（扁平上皮癌）、F：外陰癌（扁平上皮癌）、G：小細胞肺癌、H：中皮腫、I：甲状腺癌、J：唾液腺癌（肉腫又は間葉系腫瘍を除く）

注45）5%以上のアレル頻度で検出された同義変異及び非同義変異から、生殖細胞系列の変異及び既知又は機能的意義があると考えられる変異を除いた百万塩基あたりの変異の数（mutations/megabase）。

表32　有効性成績（KEYNOTE-158試験）

| | | TMB-High 102例 | Non TMB-High 689例 |
|---|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 4（3.9） | 11（1.6） |
| | 部分奏効（PR） | 26（25.5） | 32（4.6） |
| | 安定（SD） | 14（13.7） | 228（33.1） |
| | Non-CR/Non-PD† | 0 | 3（0.4） |
| | 疾患進行（PD） | 48（47.1） | 349（50.7） |
| | 評価不能（NE） | 10（9.8） | 66（9.6） |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 29.4（20.8, 39.3） | 6.2（4.6, 8.3） |

†：中央判定で登録時点では測定病変なしとされ、治験薬投与後にNon-CR/Non-PDと評価された患者

TMB-Highを有する102例（日本人6例を含む）及びTMB-Highを有しない689例（日本人71例を含む）における、がん種別の奏効率［RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は表33のとおりであった（2019年6月27日データカットオフ）。［5.27 参照］

表33　がん種別の有効性成績（KEYNOTE-158試験）

| がん種 | TMB-High | | Non TMB-High | |
|---|---|---|---|---|
| | 例数 102例 | 奏効（CR+PR）［奏効率（%）］ | 例数 689例 | 奏効（CR+PR）［奏効率（%）］ |
| 小細胞肺癌 | 34 | 10（29.4） | 42 | 4（9.5） |
| 子宮頸癌 | 16 | 5（31.3） | 59 | 7（11.9） |
| 子宮内膜癌 | 15 | 7（46.7） | 67 | 4（6.0） |
| 肛門癌 | 14 | 1（7.1） | 75 | 8（10.7） |
| 外陰癌 | 12 | 2（16.7） | 60 | 2（3.3） |
| 神経内分泌腫瘍 | 5 | 2（40.0） | 82 | 1（1.2） |
| 唾液腺癌 | 3 | 1（33.3） | 79 | 3（3.8） |
| 甲状腺癌 | 2 | 2（100） | 78 | 3（3.8） |
| 中皮腫 | 1 | 0 | 84 | 9（10.7） |
| 胆道癌 | 0 | − | 63 | 2（3.2） |

−：推定不可

〈進行又は再発の子宮頸癌〉

17.1.31 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-826試験）

根治的治療の適応がなく、化学療法歴のない（化学放射線療法としての投与歴は除く）進行又は再発の子宮頸癌患者617例（日本人57例を含む）を対象に、本剤と他の抗悪性腫瘍剤（パクリタキセル及びプラチナ製剤±ベバシズマブ）との併用療法[注46]の有効性及び安全性が、プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47]を対照とした二重盲検試験で検討された。なお、617例の患者の63%がベバシズマブの投与を受けた。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法はプラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法と比較してOS及びPFSを有意に延長した（表34、図37及び図38）[20]。

安全性解析対象例307例中298例（97.1%）（日本人35例中35例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、脱毛症171例（55.7%）、貧血149例（48.5%）、悪心104例（33.9%）、下痢76例（24.8%）、末梢性ニューロパチー75例（24.4%）、疲労70例（22.8%）、末梢性感覚ニューロパチー69例（22.5%）、好中球減少症68例（22.1%）及び嘔吐63例（20.5%）であった。

表34　有効性成績（KEYNOTE-826試験）

| | | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注46]（308例） | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47]（309例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 24.4（19.2, NE） | 16.5（14.5, 19.4） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.67（0.54, 0.84）0.0003 | − |
| PFS†‖ | 中央値［月］（95%信頼区間） | 10.4（9.1, 12.1） | 8.2（6.4, 8.4） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.65（0.53, 0.79）<0.0001 | − |

†：中間解析時のデータ：2021年5月3日カットオフ


‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法との比較

§：層別ログランク検定

‖：RECISTガイドライン1.1版に基づく治験担当医師判定


NE：Not Estimated

図37　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-826試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 308 | 291 | 277 | 254 | 228 | 201 | 145 | 89 | 36 | 6 | 0 |
| プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 309 | 295 | 268 | 234 | 191 | 160 | 116 | 60 | 28 | 4 | 0 |

図38　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-826試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 308 | 263 | 229 | 155 | 123 | 110 | 70 | 35 | 10 | 0 | |
| プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 309 | 259 | 195 | 113 | 89 | 71 | 39 | 13 | 1 | 0 | |

CPS［PD-L1を発現した細胞数（腫瘍細胞、マクロファージ及びリンパ球）を総腫瘍細胞数で除し、100を乗じた値］に関する部分集団に基づき、CPS別に解析を行った（中間解析時のデータ：2021年5月3日データカットオフ）。［5.28、7.11 参照］

表35　OSの有効性成績（KEYNOTE-826試験、PD-L1発現状況別）

| PD-L1発現 | 投与群 | 例数 | 中央値［月］（95%信頼区間） | ハザード比†（95%信頼区間） |
|---|---|---|---|---|
| CPS＜1 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注46] | 35 | 19.0（12.6, 21.4） | 1.00（0.53, 1.89）‡ |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47] | 34 | 18.9（11.7, 21.3） | |
| 1≦CPS＜10 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注46] | 115 | 24.4（18.2, NE） | 0.67（0.46, 0.97）‡ |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47] | 116 | 15.9（13.4, 23.5） | |
| CPS≧10 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注46] | 158 | NE（19.1, NE） | 0.61（0.44, 0.84） |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47] | 159 | 16.4（14.0, 25.0） | |

†：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法との比較

‡：探索的な解析

NE：Not Estimated

表36　PFS†の有効性成績（KEYNOTE-826試験、PD-L1発現状況別）

| PD-L1発現 | 投与群 | 例数 | 中央値［月］（95%信頼区間） | ハザード比‡（95%信頼区間） |
|---|---|---|---|---|
| CPS＜1 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注46] | 35 | 8.1 (6.1, 12.6) | 0.94 (0.52, 1.70) § |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47] | 34 | 8.2 (6.2, 10.4) | |
| 1≦CPS＜10 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注46] | 115 | 11.2 (8.3, 15.3) | 0.68 (0.49, 0.94) § |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47] | 116 | 8.2 (6.3, 10.0) | |
| CPS≧10 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注46] | 158 | 10.4 (8.9, 15.1) | 0.58 (0.44, 0.77) |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注47] | 159 | 8.1 (6.2, 8.8) | |

†：RECISTガイドライン1.1版に基づく治験担当医師判定
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法との比較
§：探索的な解析

注46）本剤200mg 3週間間隔投与（Q3W）（各コースの1日目に投与）と以下の抗悪性腫瘍剤（治験担当医師が患者ごとに選択）のいずれかを併用した。
・パクリタキセル175mg/m²及びプラチナ製剤（シスプラチン50mg/m²又はカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量）の順にQ3W（各コースの1日目に投与、シスプラチンは各コースの1日目又は2日目に投与）で投与。
・パクリタキセル175mg/m²、プラチナ製剤（シスプラチン50mg/m²又はカルボプラチンAUC 5mg・min/mL相当量）及びベバシズマブ15mg/kgの順にQ3W（各コースの1日目に投与、シスプラチンは各コースの1日目又は2日目に投与）で投与。

注47）プラセボQ3W（各コースの1日目に投与）と注46）と同一の抗悪性腫瘍剤（治験担当医師が患者ごとに選択）のいずれかを併用した。

〈局所進行子宮頸癌〉

17.1.32 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-A18試験）

未治療[注48]の国際産婦人科連合（FIGO）2014進行期分類のⅠB2～ⅡB期（リンパ節転移陽性）又はⅢ～ⅣA期（リンパ節転移陽性又は陰性）の局所進行子宮頸癌患者1,060例（日本人90例を含む）を対象に、本剤と同時化学放射線療法[注49]（シスプラチン同時併用下での外部照射、及びその後の小線源治療）（CCRT）との併用の有効性及び安全性が、プラセボとCCRTとの併用[注50]を対照とした二重盲検試験で検討された。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤とCCRTとの併用はプラセボとCCRTとの併用と比較してOS[21]及びPFS[22]を有意に延長した（表37、図39及び図40）。


安全性解析対象例528例中512例（97.0%）（日本人41例中41例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、貧血317例（60.0%）、悪心304例（57.6%）、下痢268例（50.8%）、白血球数減少173例（32.8%）、好中球数減少156例（29.5%）、嘔吐135例（25.6%）、白血球減少症125例（23.7%）、血小板数減少116例（22.0%）、好中球減少症114例（21.6%）及び甲状腺機能低下症112例（21.2%）であった（2024年1月8日データカットオフ）。[5.30 参照]

表37　有効性成績（KEYNOTE-A18試験）

| | | 本剤とCCRTとの併用[注49]（529例） | プラセボとCCRTとの併用[注50]（531例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | NE (NE, NE) | NE (NE, NE) |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.67 (0.50, 0.90) 0.0040 | − |
| PFS‖¶ | 中央値［月］（95%信頼区間） | NE (NE, NE) | NE (NE, NE) |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.70 (0.55, 0.89) 0.0020 | − |

†：中間解析時のデータ：2024年1月8日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボとCCRTとの併用との比較
§：層別ログランク検定
‖：中間解析時のデータ：2023年1月9日カットオフ
¶：RECISTガイドライン1.1版に基づく治験担当医師判定
NE：Not Estimated


図39　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-A18試験）




at risk数

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤とCCRTとの併用 | 529 | 527 | 522 | 509 | 500 | 463 | 412 | 374 | 326 | 273 | 210 | 136 | 63 | 11 | 1 |
| プラセボとCCRTとの併用 | 531 | 527 | 518 | 508 | 493 | 455 | 405 | 366 | 316 | 259 | 194 | 125 | 58 | 12 | 0 |

図40　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-A18試験）




at risk数

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤とCCRTとの併用 | 529 | 462 | 400 | 331 | 282 | 222 | 171 | 100 | 26 | 3 | 0 | | | | |
| プラセボとCCRTとの併用 | 531 | 463 | 379 | 306 | 263 | 208 | 149 | 88 | 20 | 0 | 0 | | | | |

注48）子宮頸癌に対する根治的手術、放射線治療又は全身療法を受けておらず、かつ免疫療法による治療歴のない患者

注49）本剤200mgを3週間間隔投与（Q3W）（各コースの1日目に投与）で5コース、シスプラチン40mg/m²を1週間間隔投与（QW）で5回又は6回投与及び放射線治療（外部照射とその後の小線源治療）後、本剤400mgを6週間間隔投与（Q6W）（各コースの1日目に投与）で15コース投与した。

注50）プラセボをQ3W（各コースの1日目に投与）で5コース及び注49）と同一のCCRT併用後、プラセボをQ6W（各コースの1日目に投与）で15コース投与した。

〈再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫〉

17.1.33 国内第Ⅰ相試験（KEYNOTE-A33試験）

再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫患者[注51]（7例）を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が検討された。主要評価項目である奏効率［改訂IWG criteria（2007）に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は、表38のとおりであった。

安全性解析対象例7例中5例（71.4%）に副作用が認められた。副作用（10%以上、本試験においては全副作用）は、ALT増加、AST増加、好中球減少症及び発熱各2例（28.6%）、咳嗽、紅斑、発熱性好中球減少症及び頭痛各1例（14.3%）であった。[5.32 参照]

注51）自家造血幹細胞移植後に再発が認められた、又は自家造血幹細胞移植後60日以内にCR若しくはPRが得られなかった患者、又は自家造血幹細胞移植に不適格である場合、2種類以上の前治療を受け、無効若しくは直近の治療後に再発した患者が組み入れられた。

表38　有効性成績（KEYNOTE-A33試験）

| | | 7例 |
|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 1（14.3） |
| | 部分奏効（PR） | 2（28.6） |
| | 安定（SD） | 1（14.3） |
| | 疾患進行（PD） | 3（42.9） |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 42.9（9.9, 81.6） |

17.1.34 海外第Ⅱ相試験（KEYNOTE-170試験）

再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫患者[注52] 53例を対象に、本剤200mg 3週間間隔投与の有効性及び安全性が検討された。主要評価項目である奏効率［改訂IWG criteria（2007）に基づく中央判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は、表39のとおりであった。安全性解析対象例53例中30例（56.6%）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、好中球減少症10例（18.9%）であった。[5.32 参照]

注52）自家造血幹細胞移植後に再発が認められた、又は自家造血幹細胞移植後60日以内にCR若しくはPRが得られなかった患者、又は自家造血幹細胞移植に不適格である場合、2種類以上の前治療を受け、無効若しくは直近の治療後に再発した患者が組み入れられた。

表39　有効性成績（KEYNOTE-170試験）

| | | 53例 |
|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 10（18.9） |
| | 部分奏効（PR） | 14（26.4） |
| | 安定（SD） | 5（9.4） |
| | 疾患進行（PD） | 13（24.5） |
| | 評価不能 | 11（20.8） |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 45.3（31.6, 59.6） |

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

17.1.35 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-859試験）

化学療法歴のないHER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃又は食道胃接合部腺癌患者1,579例（日本人101例を含む）を対象に、本剤と化学療法との併用療法[注53]の有効性及び安全性が、プラセボと化学療法との併用療法[注54]を対照とした二重盲検試験で検討された。主要評価項目は全生存期間（OS）とされ、本剤と化学療法との併用療法はプラセボと化学療法との併用療法と比較してOSを有意に延長した（表40及び図41）[23]。


安全性解析対象例785例中751例（95.7%）（日本人48例中48例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、悪心325例（41.4%）、下痢252例（32.1%）、貧血243例（31.0%）、嘔吐215例（27.4%）、血小板数減少196例（25.0%）、好中球数減少193例（24.6%）、手掌・足底発赤知覚不全症候群189例（24.1%）、食欲減退168例（21.4%）及び疲労157例（20.0%）であった。

表40　有効性成績（KEYNOTE-859試験）

| | | 本剤と化学療法との併用療法[注53)]（790例） | プラセボと化学療法との併用療法[注54)]（789例） |
|---|---|---|---|
| OS† | 中央値［月］（95%信頼区間） | 12.9（11.9, 14.0） | 11.5（10.6, 12.1） |
| | ハザード比‡（95%信頼区間）P値§ | 0.78（0.70, 0.87）<0.0001 | − |

†：中間解析時のデータ：2022年10月3日カットオフ
‡：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと化学療法との併用療法との比較
§：層別ログランク検定

図41　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-859試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と化学療法との併用療法 | 790 | 663 | 490 | 343 | 240 | 143 | 95 | 55 | 19 | 3 | 0 |
| プラセボと化学療法との併用療法 | 789 | 636 | 434 | 274 | 169 | 95 | 58 | 26 | 10 | 0 | 0 |

CPS［PD-L1を発現した細胞数（腫瘍細胞、マクロファージ及びリンパ球）を総腫瘍細胞数で除し、100を乗じた値］に関する部分集団に基づき、CPS別に解析を行った（中間解析時のデータ：2022年10月3日データカットオフ）。［5.34.1、7.12 参照］

表41　OSの有効性成績（KEYNOTE-859試験、PD-L1発現状況別）

| PD-L1発現 | 投与群 | 例数 | 中央値［月］（95%信頼区間） | ハザード比†（95%信頼区間） |
|---|---|---|---|---|
| CPS＜1 | 本剤と化学療法との併用療法[注53)] | 172 | 12.7（11.4, 15.0） | 0.94（0.74, 1.20）‡ |
| | プラセボと化学療法との併用療法[注54)] | 172 | 12.2（9.5, 14.0） | |
| 1≦CPS＜10 | 本剤と化学療法との併用療法[注53)] | 336 | 11.0（10.1, 12.2） | 0.83（0.71, 0.98）‡ |
| | プラセボと化学療法との併用療法[注54)] | 344 | 10.9（9.9, 11.9） | |
| CPS≧10 | 本剤と化学療法との併用療法[注53)] | 280 | 15.7（14.0, 19.4） | 0.65（0.53, 0.79） |
| | プラセボと化学療法との併用療法[注54)] | 273 | 11.8（10.3, 12.7） | |

†：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと化学療法との併用療法との比較
‡：探索的な解析

注53）本剤200mg 3週間間隔投与（Q3W）（各コースの1日目に投与）と以下の化学療法（治験担当医師が患者ごとに選択）のいずれかを併用した。
・シスプラチン80mg/m² Q3W（各コースの1日目に投与）及び5-FU 800mg/m²/day Q3W（5日間持続点滴投与）を6コース投与後、5-FU 800mg/m²/day Q3W（5日間持続点滴投与）を投与。
・オキサリプラチン130mg/m² Q3W（各コースの1日目に投与）及びカペシタビン1000mg/m² Q3W（各コース1～14日目に1日2回経口投与）を6コース投与後、カペシタビン1000mg/m² Q3W（各コース1～14日目に1日2回経口投与）を投与。

注54）プラセボQ3W（各コースの1日目に投与）と注53）と同一の化学療法（治験担当医師が患者ごとに選択）のいずれかを併用した。

**17.1.36 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-811試験）

化学療法歴のないHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃又は食道胃接合部腺癌患者698例（日本人84例を含む）を対象に、本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注55)]の有効性及び安全性が、プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注56)]を対照とした二重盲検試験で検討された[24)]。主要評価項目は全生存期間（OS）及び無増悪生存期間（PFS）とされ、本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法はプラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法と比較してOS[25)]及びPFSを有意に延長した。
探索的に実施されたCPS［PD-L1を発現した細胞数（腫瘍細胞、マクロファージ及びリンパ球）を総腫瘍細胞数で除し、100を乗じた値］別のOS及びPFSの解析結果は下表のとおりであった。［5.34.2、7.12 参照］

表42　OS†の有効性成績（KEYNOTE-811試験、PD-L1発現状況別）

| PD-L1発現 | 投与群 | 例数 | 中央値［月］（95%信頼区間） | ハザード比‡（95%信頼区間） |
|---|---|---|---|---|
| CPS＜1 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注55)] | 52 | 18.2（13.9, 22.9） | 1.10（0.72, 1.68）§ |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注56)] | 52 | 20.4（16.4, 24.7） | |
| CPS≧1 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注55)] | 298 | 20.1（17.9, 22.9） | 0.79（0.66, 0.95）§ |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注56)] | 296 | 15.7（13.5, 18.5） | |


†：最終解析時のデータ：2024年3月20日カットオフ
‡：非層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法との比較
§：探索的な解析

表43　PFS†の有効性成績（KEYNOTE-811試験、PD-L1発現状況別）

| PD-L1発現 | 投与群 | 例数 | 中央値［月］（95%信頼区間） | ハザード比‡（95%信頼区間） |
|---|---|---|---|---|
| CPS＜1 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注55)] | 52 | 9.5（8.3, 11.3） | 1.17（0.73, 1.89）§ |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注56)] | 52 | 9.6（7.9, 13.0） | |
| CPS≧1 | 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注55)] | 298 | 10.8（8.5, 12.5） | 0.70（0.58, 0.85）§ |
| | プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法[注56)] | 296 | 7.2（6.8, 8.4） | |


†：中間解析時のデータ：2022年5月25日カットオフ
‡：非層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法との比較
§：探索的な解析

図42　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-811試験）
［PD-L1陽性（CPS≧1）の患者］




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 298 | 288 | 265 | 241 | 207 | 190 | 166 | 143 | 127 | 115 | 102 | 86 | 78 | 67 | 59 | 51 | 48 | 42 | 32 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 296 | 276 | 244 | 215 | 180 | 154 | 135 | 117 | 104 | 93 | 85 | 73 | 63 | 56 | 50 | 38 | 30 | 21 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 |

図43　PFSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-811試験）
［PD-L1陽性（CPS≧1）の患者］




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 298 | 250 | 200 | 150 | 116 | 84 | 61 | 48 | 40 | 33 | 26 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| プラセボと他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 | 296 | 231 | 150 | 98 | 76 | 54 | 38 | 24 | 20 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 |

注55）本剤200mg 3週間間隔投与（Q3W）（各コースの1日目に投与）と以下の抗悪性腫瘍剤（治験担当医師が患者ごとに選択）のいずれかを併用した。
・トラスツズマブ初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg Q3W（各コースの1日目に投与）、シスプラチン80mg/m² Q3W（各コースの1日目に投与）及び5-FU 800mg/m²/day Q3W（5日間持続点滴投与）を投与。
・トラスツズマブ初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg Q3W（各コースの1日目に投与）、オキサリプラチン130mg/m² Q3W（各コースの1日目に投与）及びカペシタビン1000mg/m² Q3W（各コース1～14日目に1日2回経口投与）を投与。

注56）プラセボQ3W（各コースの1日目に投与）と注55）と同一の抗悪性腫瘍剤（治験担当医師が患者ごとに選択）のいずれかを併用した。

安全性解析対象例350例中341例（97.4%）（日本人44例中41例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、下痢166例（47.4%）、悪心154例（44.0%）、貧血110例（31.4%）、好中球数減少94例（26.9%）、食欲減退92例（26.3%）、血小板数減少91例（26.0%）、嘔吐88例（25.1%）、末梢性感覚ニューロパチー84例（24.0%）及び手掌・足底発赤知覚不全症候群80例（22.9%）であった。

〈治癒切除不能な胆道癌〉

17.1.37 国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-966試験）

化学療法歴のない治癒切除不能な胆道癌患者[注57] 1,069例（日本人102例を含む）を対象に、本剤と化学療法との併用療法[注58]の有効性及び安全性が、プラセボと化学療法との併用療法[注59]を対照とした二重盲検試験で検討された。

主要評価項目は全生存期間（OS）とされ、本剤と化学療法との併用療法はプラセボと化学療法との併用療法と比較してOSを有意に延長した（表44及び図44）[26]。

安全性解析対象例529例中493例（93.2%）（日本人58例中55例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、好中球数減少321例（60.7%）、貧血278例（52.6%）、血小板数減少199例（37.6%）、悪心195例（36.9%）、疲労154例（29.1%）及び白血球数減少139例（26.3%）であった。

表44　有効性成績（KEYNOTE-966試験）

| | | 本剤と化学療法との併用療法[注58]（533例） | プラセボと化学療法との併用療法[注59]（536例） |
|---|---|---|---|
| OS | 中央値［月］（95%信頼区間） | 12.7（11.5, 13.6） | 10.9（9.9, 11.6） |
| | ハザード比†（95%信頼区間）P値‡ | 0.83（0.72, 0.95）0.0034 | − |


†：層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボと化学療法との併用療法との比較
‡：層別ログランク検定

注57）術前又は術後補助療法としてゲムシタビン又はシスプラチンが投与された患者、及び治癒切除不能と診断された時点以前の6ヵ月間に術前又は術後補助療法が施行中であった患者は対象外とした。

注58）本剤200mg（各コースの1日目に投与）と化学療法としてゲムシタビン1000mg/m²及びシスプラチン25mg/m²（各コースの1、8日目に投与、ゲムシタビンは疾患進行又は許容できない毒性の発現まで、シスプラチンは最大8コース）を3週間間隔（Q3W）で投与した。

注59）プラセボ（各コースの1日目に投与）と注58）と同一の化学療法をQ3Wで投与した。

図44　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-966試験）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤と化学療法との併用療法 | 533 | 505 | 469 | 430 | 374 | 326 | 275 | 238 | 204 | 175 | 142 | 108 | 88 | 56 | 35 | 21 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| プラセボと化学療法との併用療法 | 536 | 504 | 454 | 394 | 349 | 287 | 236 | 213 | 181 | 148 | 115 | 81 | 59 | 43 | 28 | 20 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |

**〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

**17.1.38 国内第Ⅰb相試験（KEYNOTE-A17試験）

化学療法歴のない切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫患者19例を対象に、本剤、ペメトレキセドナトリウム及びシスプラチンの併用療法[注60]の忍容性、安全性及び有効性が検討された。ペメトレキセドナトリウム及びシスプラチンの投与は最大4～6コースとした。副次評価項目である奏効率［modified RECISTに基づく治験担当医師判定による完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）］は、表45のとおりであった。

安全性解析対象例19例中18例（94.7%）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、悪心16例（84.2%）、便秘12例（63.2%）、貧血11例（57.9%）、倦怠感9例（47.4%）、下痢7例（36.8%）、白血球数減少7例（36.8%）、味覚不全6例（31.6%）、好中球減少症6例（31.6%）、食欲減退5例（26.3%）、しゃっくり5例（26.3%）、肺臓炎5例（26.3%）、好中球数減少4例（21.1%）及び発疹4例（21.1%）であった。［7.13 参照］

注60）本剤200mg、ペメトレキセドナトリウム500mg/m²、シスプラチン75mg/m²の順に3週間間隔（各コースの1日目に投与）で最大4～6コース投与後、本剤200mgを3週間間隔で投与した。

表45　有効性成績（KEYNOTE-A17試験）

| | | 19例 |
|---|---|---|
| 例数（%） | 完全奏効（CR） | 0（0.0） |
| | 部分奏効（PR） | 14（73.7） |
| | 安定（SD） | 4（21.1） |
| | 疾患進行（PD） | 0（0.0） |
| | 評価不能（NE） | 1（5.3） |
| 奏効率（CR+PR）（%）（95%信頼区間） | | 73.7（48.8, 90.9） |

**17.1.39 海外第Ⅱ／Ⅲ相試験（KEYNOTE-483試験）

化学療法歴のない切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫患者を対象に、本剤、ペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤[注61]の併用療法[注62]の有効性及び安全性が、ペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤の併用療法[注63]を対照として検討された。第Ⅲ相パート（有効性解析対象例440例）の主要評価項目は全生存期間（OS）とされ、本剤、ペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤の併用療法はペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤の併用療法と比較して、OSを有意に延長した（表46及び図45）。

第Ⅱ／Ⅲ相パートに登録された安全性解析対象例241例中217例（90.0%）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、疲労120例（49.8%）、悪心119例（49.4%）、下痢56例（23.2%）、嘔吐50例（20.7%）及び口内炎49例（20.3%）であった。［7.13 参照］

表46　有効性成績（KEYNOTE-483試験　第Ⅲ相パート）

| | | 本剤、ペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤[注62]（222例） | ペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤[注63]（218例） |
|---|---|---|---|
| OS | 中央値［月］（95%信頼区間） | 17.3（14.4, 21.3） | 16.1（13.1, 18.2） |
| | ハザード比†（95%信頼区間）P値‡ | 0.79（0.64, 0.98）§ 0.0162 | − |


†：層別Cox比例ハザードモデルによるペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤の併用療法との比較
‡：層別ログランク検定、有意水準（片側）0.0204
§：有意水準に対応した95.92%信頼区間は（0.63, 0.99）

注61）併用する化学療法はシスプラチン及びペメトレキセドナトリウムと設定されたが、シスプラチンが禁忌である場合は、個別にCanadian Cancer Trials Group（CCTG）によるレビュー及び承認を受けた上でカルボプラチン及びペメトレキセドナトリウムの投与も可能とされた。また、シスプラチンに対する忍容性がないと判断された場合には、シスプラチンをカルボプラチンに変更可能とされた。

注62）本剤200mg、ペメトレキセドナトリウム500mg/m²、シスプラチン75mg/m²又はカルボプラチンAUC 5又は6mg・min/mL相当量の順に3週間間隔（Q3W）（各コースの1日目に投与）で最大6コース投与後、本剤200mgをQ3Wで投与した。

注63）ペメトレキセドナトリウム500mg/m²、シスプラチン75mg/m²又はカルボプラチンAUC 5又は6mg・min/mL相当量の順にQ3W（各コースの1日目に投与）で最大6コース投与した。

図45　OSのKaplan-Meier曲線（KEYNOTE-483試験　第Ⅲ相パート）




| at risk数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本剤、ペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤 | 222 | 196 | 143 | 109 | 86 | 54 | 25 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ペメトレキセドナトリウム及びプラチナ製剤 | 218 | 176 | 128 | 92 | 68 | 40 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

本薬はヒトPD-1に対する抗体であり、PD-1とそのリガンド（PD-L1及びPD-L2）との結合を阻害することにより、腫瘍特異的な細胞傷害性T細胞を活性化させ、腫瘍増殖を抑制すると考えられる。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）
（Pembrolizumab（Genetical Recombination））
分子量：約149,000
本　質：遺伝子組換えヒト化モノクローナル抗体であり、マウス抗ヒトPD-1抗体の相補性決定部、並びにヒトIgG4のフレームワーク部及び定常部からなり、H鎖228番目のアミノ酸残基がProに置換されている。チャイニーズハムスター卵巣細胞により産生される447個のアミノ酸残基からなるH鎖2本及び218個のアミノ酸残基からなるL鎖2本で構成される糖タンパク質である。

## 20. 取扱い上の注意

20.1 凍結を避けること。
20.2 外箱開封後は遮光して保存すること。［14.1.2 参照］

## 21. 承認条件

〈悪性黒色腫、進行・再発の子宮体癌、がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量（TMB-High）を有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）、局所進行子宮頸癌、再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫〉

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

## 22. 包装

1バイアル（4mL）

## 23. 主要文献


1) Ribas A, et al. Lancet Oncol. 2015；16：908-18.
2) Robert C, et al. N Engl J Med. 2015；372：2521-32.
3) Gandhi L, et al. N Engl J Med. 2018；378：2078-92.
4) Paz-Ares L, et al. N Engl J Med. 2018；379：2040-51.
5) Mok TSK, et al. Lancet. 2019；393：1819-30.
6) Reck M, et al. N Engl J Med. 2016；375：1823-33.
7) Herbst R, et al. Lancet. 2016；387：1540-50.
8) Heather W, et al. N Engl J Med. 2023；389：491-503.
9) Kuruvilla J, et al. Lancet Oncol. 2021；22：512-24.
10) Powles T, et al. N Engl J Med. 2024；390：875-88.
11) Vuky J, et al. J Clin Oncol. 2020；38：2658-66.
12) Bellmunt J, et al. N Engl J Med. 2017；376：1015-26.
13) Motzer R, et al. N Engl J Med. 2021；384：1289-1300.
14) Choueiri TK, et al. N Engl J Med. 2021；385：683-94.
15) Sun J, et al. Lancet. 2021；398：759-71.
16) André T, et al. N Engl J Med. 2020；383：2207-18.
17) Cortes J, et al. Lancet. 2020；396：1817-28.
18) Schmid P, et al. N Engl J Med. 2022；386：556-67.
19) Makker V, et al. N Engl J Med. 2022；386：437-48.
20) Colombo N, et al. N Engl J Med. 2021；385：1856-67.
21) Lorusso D, et al. Lancet. 2024；404：1321-32.
22) Lorusso D, et al. Lancet. 2024；403：1341-50.
23) Rha SY, et al. Lancet Oncol. 2023；24：1181-95.
** 24) Janjigian YY, et al. Lancet. 2023；402：2197-208.
** 25) Janjigian YY, et al. N Engl J Med. 2024；391：1360-2.
26) Kelley RK, et al. Lancet. 2023；401：1853-65.


## 24. 文献請求先及び問い合わせ先


MSD株式会社　MSDカスタマーサポートセンター
東京都千代田区九段北1-13-12
医療関係者の方：フリーダイヤル 0120-024-961


## 26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元


ＭＳＤ株式会社
東京都千代田区九段北1−13−12