

## 適正使用のお願い

－ワンタキソテール®のご使用にあたって－

タキソイド系抗悪性腫瘍剤

**ワンタキソテール®**点滴静注20mg/1mL

**ワンタキソテール®**点滴静注80mg/4mL

**ドセタキセル水和物製剤**

2011年7月

サノフィ・アベンティス株式会社

〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、ドセタキセル水和物製剤として事前の溶解操作が不要の「ワンタキソテール®点滴静注 20mg/1mL」「ワンタキソテール®点滴静注 80mg/4mL」を発売させていただくこととなりました。

「ワンタキソテール®点滴静注」は従来の「タキソテール®点滴静注用 20mg」「同 80mg」と効能・効果、用法・用量は同じですが、以下の点が異なりますので、本剤のご使用にあたっては、十分にご留意いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

### ① ドセタキセル濃度が2倍

ドセタキセル濃度が以下の通り異なります。

- ワンタキソテール：20 mg/mL
- 従来のタキソテール（添付溶解液に溶解後のプレミックス液）：10 mg/mL



**抜き取り量が、従来のタキソテールの半量となります。  
ご使用になる製剤の薬剤濃度をご確認ください。**

### ② 無水エタノール含有

本剤は無水エタノールを予め含有し、その含有量が以下の通り異なります。

	従来のタキソテール		ワンタキソテール（本剤）	
	20mg 製剤の 添付溶解液	80mg 製剤の 添付溶解液	20mg/1mL 製剤	80mg/4mL 製剤
無水エタノール 重量	0.18g	0.72g	0.395g	1.58g



**本剤は無水エタノールを予め含有しています。  
アルコールに過敏な患者様には十分にご注意ください。**