

## C型慢性肝炎治療薬 ソブリアード<sup>®</sup>カプセルを 服用する患者さんにご家族の方へ

～早期発見がとても大切です～

血中ビリルビン値が上昇し、重篤な肝機能障害や腎機能障害  
が起こることがあります。

ソブリアード<sup>®</sup>カプセルの服用中や服用終了後に下記  
のような症状が見られましたら、すぐに受診してくだ  
さい。

- 眼や皮膚が黄色くなった
  - 尿の色が濃くなった
  - 疲れやすい
  - 食欲不振、吐き気、嘔吐
  - かゆみ
- など

ソブリアード<sup>®</sup>カプセルの服用中は、定期的に医療機関を受診し、  
血液検査を受けてください。服用終了後も、体に異常を感じたら  
受診してください。

### 患者向医薬品ガイド

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「医薬品医療機器総合機構ホームページ」  
URL: <http://www.info.pmda.go.jp/>  
患者向医薬品ガイド ([http://www.info.pmda.go.jp/guide\\_ippan/guide.html](http://www.info.pmda.go.jp/guide_ippan/guide.html))

【お問合せ先】 ヤンセンファーマ株式会社 メディカルインフォメーションセンター  
フリーダイヤル：0120-23-6299

- 2014年10月24日～11月7日の受付時間：9:00～17:40（土・日・祝日を含む）
- 上記期間以外の受付時間：9:00～17:40（土・日・祝日・会社休日を除く）