

第十六改正日本薬局方第一追補 正誤表(その2)

平成26年3月25日

厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡

1. 一般試験法

該当箇所	頁	行	正	誤
9.41 試葉・試液 1-ヘキサンオール	33 右	↓ 6	<u>0.816~0.821</u>	<u>1.415~1.420</u>

2. 医薬品各条

該当箇所	頁	行	正	誤
パラオキシ安息香酸ブチル	112 右	↑ 22	また、試料溶液のパラオキシ安息香酸ブチル以外のピークの合計面積は、標準溶液のパラオキシ安息香酸ブチルのピーク面積の2倍より大きくない(1.0%)。ただし、標準溶液のパラオキシ安息香酸ブチルのピーク面積の1/5以下のピークは計算しない(0.1%)。	また、試料溶液のパラオキシ安息香酸ブチル及び <u>パラオキシ安息香酸</u> 以外のピークの合計面積は、標準溶液のパラオキシ安息香酸ブチルのピーク面積の2倍より大きくない(1.0%)。ただし、標準溶液のパラオキシ安息香酸ブチルのピーク面積の1/5以下のピークは計算しない(0.1%)。
ヒプロメロース酢酸エステル コハク酸エステル	120 右	↑ 19	薄めたリン酸(<u>17→200</u>) 10 mL	薄めたリン酸(<u>1→50</u>) 10 mL

3. 参照スペクトル

該当箇所	頁	行	正	誤
	178	↓ 2	参照紫外可視吸収スペクトル	参照紫外可視吸光スペクトル