リンコマイシン塩酸塩水和物

基原及び純度試験(3)の項を次のように改める.

本品は，*Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis*の培養によって得られる抗細菌活性を有する化合物の塩酸塩である.

本品は定量するとき， 換算した脱水物1 mg 当たり850～930 µg (力価)を含む．ただし，本品の力価は，リンコマイシン($C_{18}H_{34}N_2O_6S$：406.54)としての量を質量(力価)で示す.

純度試験

（３） リンコマイシンB　定量法の試料溶液を試料溶液とする．この液20 µLにつき，次の条件で液体クロマトグラフィー〈*2.01*〉により試験を行う．試料溶液のリンコマイシンのピーク面積及びリンコマイシンに対する相対保持時間約0.5のリンコマイシンBのピーク面積を自動積分法により測定するとき，リンコマイシンBのピーク面積は，リンコマイシン及びリンコマイシンBの合計面積の2.0 %以下である.

試験条件

定量法の試験条件を準用する.

システム適合性

システムの性能及びシステムの再現性は定量法のシステム適合性を準用する.

検出の確認：試料溶液1 mLを正確に量り，移動相を加えて正確に50 mLとする．この液20 µLから得たリンコマイシンのピーク面積が，試料溶液のリンコマイシンのピーク面積の1.4～2.6 %になることを確認する.