

医療関係者各位

「リクシアナ[®]錠」と「リフキシマ[®]錠」の 販売名類似による取り違え注意のお願い

2017年10月

第一三共株式会社
あすか製薬株式会社

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

また、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、第一三共株式会社製品「リクシアナ[®]錠（一般名：エドキサバントシル酸塩水和物）：経口FXa阻害剤（抗凝固剤）」と、あすか製薬株式会社製品「リフキシマ[®]錠（一般名：リファキシミン）：難吸収性リファマイシン系抗菌薬（肝性脳症における高アンモニア血症改善薬）」につきまして、販売名が類似していることから、誤った調剤による死亡例が報告されました。

「リクシアナ[®]錠」または「リフキシマ[®]錠」を処方・調剤いただく際には、今一度販売名、
効能・効果および用法・用量をご確認いただき、また、処方時に薬剤オーダーリングシステム等
をご使用の場合は、販売名の前に薬効を記載する等の予防策を検討するなど、取り違え防止に
一層のご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。



謹白

<事例>

リフキシマ[®]錠を処方された肝性脳症の患者に、誤って抗凝固剤のリクシアナ[®]錠が調剤されました。結果として、通常用量を超えたリクシアナ[®]錠が複数回投与され、消化管出血が発現し、死亡に至りました。

裏面も必ずご覧ください。

「**リクシアナ[®]錠**」または「**リフキシマ[®]錠**」を処方・調剤いただく際には、**販売名、効能・効果および用法・用量**をご確認ください。

販売名	リクシアナ[®]錠	リフキシマ[®]錠
一般名	エドキサバンチル酸塩水和物	リファキシミン
効能・効果	<p>① 非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制</p> <p>② 静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制</p> <p>③ 下記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術</p>	肝性脳症における高アンモニア血症の改善
用法・用量	<p><効能・効果①②> 通常、成人には、エドキサバンとして以下の用量を1日1回経口投与する。 体重60kg以下：30mg 体重60kg超：60mg なお、腎機能、併用薬に応じて1日1回30mgに減量する。</p> <p><効能・効果③> 通常、成人には、エドキサバンとして30mgを1日1回経口投与する。</p>	通常、成人にはリファキシミンとして 1回400mg を 1日3回 食後に経口投与する。
製品 (製品写真)	<p>リクシアナ[®]錠15mg</p>  <p>リクシアナ[®]錠30mg</p>  <p>リクシアナ[®]錠60mg</p> 	<p>リフキシマ[®]錠200mg</p> 
製造販売元	<p>第一三共株式会社 【お問い合わせ先】製品情報センター TEL 0120-189-132 受付時間 月～金 9:00～17:30 (祝日および当社休日を除く)</p>	<p>あすか製薬株式会社 【お問い合わせ先】くすり相談室 TEL 0120-848-339 受付時間 月～金 9:00～17:30 (祝日および当社休日を除く)</p>

製品のご使用にあたっては最新の添付文書をご確認ください。