

## エクリズマブ（遺伝子組換え）製剤の「使用上の注意」の改訂について

平成31年3月22日  
医薬安全対策課

### 1. 品目の概要

[一般名] エクリズマブ（遺伝子組換え）

[販売名] ソリリス点滴静注 300mg

[承認取得者] アレクシオンファーマ合同会社

[効能・効果] (1) 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制  
(2) 非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制  
(3) 全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）

### 2. 背景

(1) エクリズマブ（遺伝子組換え）製剤（以下「本剤」という。）の非典型溶血性尿毒症症候群 (atypical hemolytic uremic syndrome : 以下「aHUS」という。) に対する使用にあたっては、添付文書にて、髄膜炎菌感染症に関する注意及び適切な処置のほか、日本小児科学会及び日本腎臓学会の診断基準等を参考に aHUS の診断の適切な実施を求めている。

(2) 一般社団法人日本腎臓学会及び公益社団法人日本小児科学会が作成した「非典型溶血性尿毒症症候群 (aHUS) 診療ガイド 2015」によれば、aHUS は、2013 年の本邦の診断基準における先天性及び後天性の補体制御異常による aHUS のみを「aHUS」または「補体関連 HUS」と定義しており、血栓性微小血管症 (thrombotic microangiopathy: 以下「TMA」という。) の原因となる他の病態による TMA (二次性 TMA (その他の TMA)) は含まれないとされている（図 1 参照）。

TMA								
2013年 本邦診断基準	STEC-HUS	TTP	aHUS					
			補体制御異常	代謝関連	薬剤	感染	妊娠	
2015年 本診療ガイド	STEC-HUS	TTP	aHUS	二次性TMA(その他のTMA)				
			補体関連HUS	代謝関連	薬剤	感染	妊娠	疾患

図 1 日本腎臓学会と日本小児科学会による 2013 年診断基準と、本診療ガイドの aHUS 定義の違い

\* 「非典型溶血性尿毒症症候群 (aHUS) 診療ガイド 2015」より

- (3) アレクシオンファーマ合同会社が配布している aHUS に関する情報提供資材を確認したところ、一般社団法人日本腎臓学会及び公益社団法人日本小児科学会が作成した「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド 2015」とは異なる情報が含まれており、本剤の投与対象である aHUS に二次性 TMA（その他の TMA）が含まれているとの誤解を生じる可能性があることが確認された。
- (4) これらの状況を踏まえ、アレクシオンファーマ合同会社に対し、「エクリズマブ（遺伝子組換え）製剤の適正使用について」（平成 30 年 10 月 12 日付け薬生薬審発 1012 第 9 号・薬生安発 1012 第 5 号・薬生監麻発 1012 第 4 号通知）により、本剤の適正使用に必要な情報提供活動を行うよう通知した（別紙 1）。

### **3. 改訂の概要及び措置**

- 上記背景を踏まえ、本剤の aHUS に対する使用について、効能又は効果の範囲を明確化する必要があると考え、以下の点を「使用上の注意」に記載することが必要と判断した（別紙 2）。
  - (1) 本剤の適用である aHUS は、一般社団法人日本腎臓学会及び公益社団法人日本小児科学会が作成した「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド 2015」で定義される補体制御異常による aHUS であること。
  - (2) 二次性血栓性微小血管症の患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していないこと（使用経験がない）。
- 厚生労働省では、本剤について添付文書の改訂指示通知を平成 31 年 2 月 8 日に発出した（別紙 3）。

写

薬生薬審発 1012 第 9 号  
薬生安発 1012 第 5 号  
薬生監麻発 1012 第 4 号  
平成 30 年 10 月 12 日

アレクシオンファーマ合同会社  
代表社員アレクシオン・ホールディング・ビーヴィ  
職務執行者 伊藤 嘉規 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

#### エクリズマブ（遺伝子組換え）製剤の適正使用について

エクリズマブ（遺伝子組換え）製剤（販売名：ソリリス点滴静注 300mg）（以下「本剤」という。）は、ヒト補体である C5 に対し高い親和性を示すヒト化モノクローナル抗体であり、平成 25 年 9 月 13 日に「非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制」を効能・効果として追加する、製造販売承認事項一部変更承認を受けています。

本剤の非典型溶血性尿毒症症候群（atypical hemolytic uremic syndrome：以下「aHUS」という。）に対する使用にあたっては、添付文書にて、髄膜炎菌感染症に関する注意及び適切な処置や、一般社団法人日本腎臓学会及び公益社団法人日本小児科学会の診断基準等を参考に aHUS の診断の適切な実施等を求めているところです。

また、両学会が作成している「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド 2015」によれば、国内での aHUS は、2013 年の本邦の診断基準における先天性、および後天

性の補体制御異常による aHUS のみを「aHUS」または「補体関連 HUS」と定義しており、血栓性微小血管障害（thrombotic microangiopathy：以下「TMA」という。）の原因となる他の病態による TMA（二次性 TMA（その他の TMA）「以下「二次性 TMA」という。）は含まれないとされております。

今般、貴社が配布している複数の資材において、「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド 2015」とは異なる情報が含まれており、本剤の投与対象である aHUS に二次性 TMA が含まれているとの誤解を生じる可能性があることが確認されました。つきましては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第 68 条の 2 第 1 項の規定に基づく、製造販売業者による本剤の適正使用に必要な情報提供活動の一環として、下記の事項の実施をお願いします。

## 記

1. 従前の資材が不適切であった旨及び本剤の aHUS への使用に際しての鑑別診断は添付文書及び「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド 2015」の内容に即して実施されるべき旨について、書面により本剤を使用する医療関係者に周知し、従前の資材の回収を行うこと。また、その実施状況を定期的に文書で厚生労働省に報告すること。
2. 本剤の aHUS への使用症例においては、aHUS の鑑別診断に関する情報を収集し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和 36 年厚生省令第 1 号）第 228 条の 20 第 1 項の規定に基づく副作用等報告の際に、これらの情報を平成 26 年 10 月 2 日付け薬食発 1002 第 20 号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品等の副作用等の報告について」で定める別紙様式第 2 (一) 「副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過」にあわせて記入すること。
3. 貴社が配布している複数の資材について、本剤の投与対象である aHUS に二次性 TMA が含まれていると誤認されがないよう、内容の削除、訂正をする等適切なものに改めること。

## エクリズマブ（遺伝子組換え）製剤 「使用上の注意」の改訂

		下線部追記、取消線部削除	
		改訂前	改訂後
		<効能・効果に関連する使用上の注意>	
共通			共通
	1. (略)		1. (略)
		発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制	
	1. ~5. (略)		1. ~5. (略)
		非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制	非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制
		1. 本剤の適用にあたっては、日本小児科学会及び日本腎臓学会の診断基準等を参考に、非典型溶血性尿毒症症候群と診断された患者を対象とすること。	1. 極めて稀な疾患であるため、本剤の効果を評価するには、 <u>補体制御異常にによる非典型溶血性尿毒症症候群</u> の患者に使用すること。
			※「非典型溶血性尿毒症症候群 (aHUS) 診療ガイド2015」 (日本腎臓学会・日本小児科学会) を参考にすること。
		2. 二次性血栓性微小血管症の患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない（使用経験がない）。	2. 二次性血栓性微小血管症の患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない（使用経験がない）。
		全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）	全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）
	1. (略)		1. (略)



薬生安発 0208 第 2 号  
平成 31 年 2 月 8 日

日本製薬団体連合会  
安全性委員会委員長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

### 「使用上の注意」の改訂について

医薬品の使用上の注意事項については、各種情報、資料を基に評価・検討を行い、整備を図っているところです。

エクリズマブ（遺伝子組換え）製剤（販売名：ソリリス点滴静注 300mg）（以下「本剤」という。）の効能又は効果の一つである非典型溶血性尿毒症症候群（atypical hemolytic uremic syndrome : aHUS）は、一般社団法人日本腎臓学会及び公益社団法人日本小児科学会が作成した「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド 2015」によれば、血栓性微小血管症（thrombotic microangiopathy:以下「TMA」）という。）の原因となる他の病態による TMA（二次性 TMA（その他の TMA））は含まないとされています。

今般、本剤の効能又は効果の範囲を明確化すべく、別紙のとおり、「使用上の注意」を改訂し、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずるよう関係製造販売業者あて通知しましたので、お知らせします。

【医薬品名】エクリズマブ（遺伝子組換え）

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

〔効能・効果に関連する使用上の注意〕の項の非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制に関する記載を

「補体制御異常による非典型溶血性尿毒症症候群※の患者に使用すること。

※「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド2015」（日本腎臓学会・日本小児科学会）を参考にすること。」

と改め、

「二次性血栓性微小血管症の患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない（使用経験がない）。」

を追記する。

\*\* 2019年2月改訂(第11版)  
\* 2018年7月改訂(第10版)

日本標準商品分類番号 876399
----------------------

貯法：遮光し、凍結を避け、2～8℃

で保存すること。

使用期限：製造後2年6ヶ月(外箱に表示の期限内に使用すること)

注)注意—医師の処方箋により使用すること

抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤  
生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品<sup>注</sup>

## ソリリス®点滴静注300mg

Eculizumab (Genetical Recombination)

エクリズマブ(遺伝子組換え)点滴静注製剤

承認番号	22200AMX00316000
葉巻収載	2010年6月
販売開始	2010年6月
効能追加	2017年12月
国際誕生	2007年3月

### 【警告】

- 本剤の投与により、髄膜炎菌感染症を発症することがあり、死亡例も認められているため、以下の点に十分注意すること(<効能・効果に関する使用上の注意>及び「重大な副作用」の項参照)。
  - 本剤の投与に際しては、髄膜炎菌感染症の初期徵候(発熱、頭痛、頸部硬直等)に注意して観察を十分に行い、髄膜炎菌感染症が疑われた場合には、直ちに診察し、抗菌剤の投与等の適切な処置を行うこと。
  - 緊急な治療を要する場合等を除いて、原則、本剤投与前に髄膜炎菌に対するワクチンを接種すること。必要に応じてワクチンの追加接種を考慮すること。
  - 髄膜炎菌感染症は致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び医師のもとで、あるいは髄膜炎菌感染症の診断及び治療が可能な医療施設との連携下で投与すること。
  - 髄膜炎菌感染症のリスクについて患者に説明し、当該感染症の初期徵候を確実に理解させ、髄膜炎菌感染症に関連する副作用が発現した場合には、主治医に連絡するよう患者に注意を与えること。
- 本剤は、発作性夜間ヘモグロビン尿症、非典型溶血性尿毒症症候群、あるいは全身型重症筋無力症に十分な知識を持つ医師のもとで、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。また、本剤投与開始に先立ち、本剤は疾病を完治させる薬剤ではないことを含め、本剤の有効性及び危険性を患者又はその家族に十分説明し、同意を得てから投与すること。

### 【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- 髄膜炎菌感染症に罹患している患者[症状を悪化させるおそれがある。]
- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

### 【組成・性状】

1バイアル(ストッパー付)30mL中	
有効成分	エクリズマブ(遺伝子組換え) 300 mg
添加物	塩化ナトリウム 263.1 mg リン酸二水素ナトリウム 13.8 mg リン酸一水素ナトリウム 53.4 mg ボリソルベート80 6.6 mg
性状	無色透明な液
pH	pH 6.8～7.2
浸透圧比 (生理食塩液対比)	約1(日局生理食塩液により希釈後(5mg/mL))

本剤は、マウス骨髓腫由来細胞を用いて製造される。製造工程において、培地成分としてウシの血清由来成分(アルブミン)及びウシの胎仔由来成分(血清)を使用している。

### 【効能・効果】

発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制  
非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制  
全身型重症筋無力症(免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る)

### <効能・効果に関する使用上の注意>

共通

- 本剤は補体C5の開裂を阻害し、終末補体複合体C5b-9の生成を抑制すると考えられるため、髄膜炎菌をはじめとする莢膜形成細菌による感染症を発症しやすくなる可能性があることから、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤投与の是非を慎重に検討し、適切な対象患者に対し投与を開始すること。また、本剤投与に際しては、緊急な治療を要する場合等を除いて、原則、本剤投与開始の少なくとも2週間前までに髄膜炎菌に対するワクチンを接種すること。特に小児への本剤投与に際しては、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型に対するワクチンの接種状況を確認し、未接種の場合にはそれぞれのワクチンの接種を検討すること(【臨床成績】の項参照)。

### 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制

- フローサイトメトリー法等により検査を行い、発作性夜間ヘモグロビン尿症と確定診断された患者に投与を開始すること。
- 本剤を投与開始する際には、溶血のため赤血球輸血が必要と考えられ、今後も輸血の継続が見込まれる患者を対象とすること。
- 本剤による血栓塞栓症の抑制効果、腎機能改善効果及び延命効果は確認されていない。
- 本剤の急性溶血発作に対する改善効果は確認されていない。
- 本剤投与によりPNH赤血球クローンが増加するため、本剤を中止した場合に重篤な血管内溶血が認められるおそれがあることから、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤投与の是非を慎重に検討し、適切な対象患者に対し投与を開始すること。

### \* 非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制

- 補体制御異常による非典型溶血性尿毒症症候群<sup>\*</sup>の患者に使用すること。  
※「非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)診療ガイド2015」(日本腎臓学会・日本小児科学会)を参考すること。
- 二次性血栓性微小血管症の患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない(使用経験がない)。

全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）

1. 本剤は、抗アセチルコリン受容体抗体陽性の患者に投与すること。

#### 【用法・用量】

##### 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制

通常、成人には、エクリズマブ（遺伝子組換え）として、1回600 mgから投与を開始する。初回投与後、週1回の間隔で初回投与を含め合計4回点滴静注し、その1週間後（初回投与から4週間後）から1回900 mgを2週に1回の間隔で点滴静注する。

##### 非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制

通常、エクリズマブ（遺伝子組換え）として、下記の用法・用量で点滴静注する。

年齢又は体重	導入期	維持期
18歳以上	1回900mgを週1回で計4回	初回投与4週間後から1回1200mgを2週に1回
18歳未満		
40kg以上	1回900mgを週1回で計4回	初回投与4週間後から1回1200mgを2週に1回
30kg以上 40kg未満	1回600mgを週1回で計2回	初回投与2週間後から1回900mgを2週に1回
20kg以上 30kg未満	1回600mgを週1回で計2回	初回投与2週間後から1回600mgを2週に1回
10kg以上 20kg未満	1回600mgを週1回で計1回	初回投与1週間後から1回300mgを2週に1回
5kg以上 10kg未満	1回300mgを週1回で計1回	初回投与1週間後から1回300mgを3週に1回

##### 全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）

通常、成人には、エクリズマブ（遺伝子組換え）として、1回900 mgから投与を開始する。初回投与後、週1回の間隔で初回投与を含め合計4回点滴静注し、その1週間後（初回投与から4週間後）から1回1200 mgを2週に1回の間隔で点滴静注する。

#### ＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

##### 共通

1. 本剤を投与する際には、日局生理食塩液、日局ブドウ糖注射液（5%）又は日局リンゲル液を用いて5 mg/mLに希釈すること。（「適用上の注意」の項参照）
2. 本剤は独立した点滴ラインより、希釈した液を18歳以上では25～45分、18歳未満では1～4時間かけて点滴静注するが、患者の年齢、体重に応じて適宜調整すること。

##### 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制

1. 本剤の血中濃度の低下により急性の溶血発作の発現が懸念されるため、投与間隔を遵守すること。
2. 本剤投与開始2週までに血清中乳酸脱水素酵素（LDH）活性の低下が認められない場合には、本剤の投与継続の要否を検討すること。

##### 非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制

1. 本剤の血中濃度の低下により、血栓性微小血管障害の増悪が懸念されるため、投与間隔を遵守すること。

##### 全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）

1. 本剤の血中濃度低下により症状悪化が懸念されるため、投与間隔を遵守すること。
2. 本剤の全身型重症筋無力症患者を対象とした臨床

試験では、ほとんどの治療反応例で投与開始後12週までに症状の改善が得られた。全身型重症筋無力症患者で他の免疫抑制剤を併用している患者においては、髄膜炎菌感染症のリスクが高い可能性があることから、リスクベネフィットを考慮し、投与開始後12週までに症状の改善が認められない患者では、本剤の投与中止を検討すること。

##### 非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制及び全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）

1. 血漿交換により本剤の一部が除去されること、新鮮凍結血漿内には補体C5が含まれることから、本剤投与中に血漿交換又は新鮮凍結血漿輸注を施行する必要がある場合は、血漿交換の施行後又は新鮮凍結血漿輸注の施行前に、下表を参考に本剤の補充投与を考慮すること。なお、下表はシミュレーション結果に基づき設定されたものであることから、補充投与後は患者の状態を慎重に観察すること。

	直近の本剤投与量	本剤の補充用量	補充投与の時期
血漿交換	300mg	1回につき300mg	施行後
	600mg以上	1回につき600mg	60分以内
新鮮凍結血漿輸注	300mg以上	1回につき300mg	施行60分前

#### 【使用上の注意】

##### 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 1) 髄膜炎菌感染症の既往のある患者[本剤により髄膜炎菌感染症に罹患しやすくなる可能性がある。]
- 2) 感染症の患者又は感染症が疑われる患者[本剤は補体C5の開裂を阻害し、終末補体複合体C5b-9の生成を抑制すると考えられる。特に莢膜形成細菌（髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌等）による感染症に罹患しやすくなる可能性がある。]

##### 2. 重要な基本的注意

- (1) 発作性夜間ヘモグロビン尿症においては、本剤投与によりPNH赤血球クローニングが増加するため、本剤を中止した場合に重篤な血管内溶血が認められるおそれがある。本剤の投与を中止した患者に対しては、最低8週間、血管内溶血及びそれに付随する臨床症状の変化を注意深く観察し、必要に応じて適切な処置を行うこと。
- (2) 非典型溶血性尿毒症症候群においては、本剤投与開始後は血小板数等を定期的にモニタリングし、改善傾向が認められない場合は、本剤の投与継続の要否を検討すること。なお、本剤を中止した場合に重度の血栓性微小血管障害が発現するおそれがあるため、本剤の投与中止後、最低12週間は患者の状態を注意深く観察し、必要に応じて適切な処置を行うこと。

##### 3. 相互作用

##### 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
人免疫グロブリン製剤 (ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン等)	人免疫グロブリン製剤との併用投与によって本剤の血清中濃度が低下することがあるので、併用する場合には、患者の状態を十分に観察すること。	本剤のエンドソームにおけるリサイクリング機構が、人免疫グロブリン製剤との継続的な併用投与により阻害され、本剤の血清中濃度が低下する可能性がある <sup>1)(2)(3)</sup> 。

#### \* 4. 副作用

##### 発作性夜間ヘモグロビン尿症

国内臨床試験の29例中27例(93.1%)に副作用が認められ、主なものは頭痛(51.7%)、鼻咽頭炎(37.9%)及び悪心(20.7%)等であった。(承認時)

海外臨床試験の195例中193例(99.0%)に有害事象が認められ、主なものは頭痛(51.3%)、鼻咽頭炎(42.1%)、上気道感染(30.8%)、悪心(25.1%)、下痢(22.1%)及び背部痛(20.0%)等であった。(承認時)

##### 非典型溶血性尿毒症症候群

国内臨床試験及びレトロスペクティブ調査の3例中2例に副作用が認められた。2例のうち1例に医療機器関連感染及び鼻咽頭炎が複数回認められ、別の1例には悪心、嘔吐、体温上昇、高アルブミン血症、口腔咽頭不快感、脱毛症、多毛症が認められた。(効能追加時)

海外臨床試験の37例中16例(43.2%)に副作用が認められ、主なものは白血球減少症(10.8%)、頭痛(8.1%)等であった。また、海外レトロスペクティブ調査の30例中22例に有害事象が認められ、主なものは発熱(30%)、嘔吐(23%)、咳嗽(23%)、上気道感染(20%)等であった。(効能追加時)

##### 全身型重症筋無力症

国際共同試験及びそれに続く長期投与試験の123例(日本人11例を含む)中81例(65.9%)に副作用が認められ、主なものは頭痛(14.6%)、下痢(12.2%)、上気道感染(12.2%)、悪心(9.8%)、鼻咽頭炎(8.9%)等であった。このうち、国内症例は11例中5例に副作用が認められ、鼻咽頭炎(27.3%)、頭痛(18.2%)等であった。(効能追加時)

#### (1)重大な副作用

1) 髄膜炎菌感染症(頻度不明)：髄膜炎菌感染症を誘発することがある。髄膜炎又は敗血症を発症し、急激に重症化することがあるので、本剤の投与に際しては、当該感染症の初期徵候(発熱、頭痛、項部硬直、差明、精神状態の変化、痙攣、悪心・嘔吐、紫斑、点状出血等)等の観察を十分に行うこと。髄膜炎菌感染症が疑われた場合には、直ちに診察し、抗菌剤の投与等の適切な処置を行うこと。髄膜炎菌に対するワクチンを接種しても発症した例や、死亡に至った例が認められている。

2) infusion reaction(頻度不明)：ショック、アナフィラキシー等があらわれることがある。発現した場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### (2)その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

	10%以上	5%～10%未満	5%未満	頻度不明 <sup>注1)</sup>
血液	-	白血球減少症	大球性貧血、好中球減少症	貧血、リンパ球減少症、凝固因子異常
耳及び迷路障害	-	耳鳴	-	回転性めまい、耳痛
眼	-	結膜出血	白内障、強膜出血	眼痛、結膜炎
胃腸	悪心、嘔吐	上腹部痛	腸炎	下痢、腹痛、便秘、消化不良、腹部膨満、腹部不快感、歯痛、アフタ性口内炎、嚥下障害、直腸出血、胃の不快感
全身障害及び投与局所	発熱	胸部不快感、疲労	腋窩痛、悪寒、注射部位硬結、倦怠感、末梢性浮腫	インフルエンザ様疾患、無力症、胸痛、注射部位疼痛、溢出、疼痛、冷感、腫脹
肝胆道	-	-	高ビリルビン血症	黄疸

	10%以上	5%～10%未満	5%未満	頻度不明 <sup>注1)</sup>
* 感染症	鼻咽頭炎	インフルエンザ	単純ヘルペス、麦粒腫、口腔ヘルペス、咽頭炎、医療機器関連感染	肺炎、上気道感染、尿路感染、真菌感染、ウイルス感染、気管支炎、膿瘍、蜂巣炎、消化管感染、膀胱炎、感染、副鼻腔炎、歯感染、下気道感染、膿瘍疹、気道感染、鼻炎、胃腸炎、ウイルス性胃腸炎、限局性感染、耳部感染、扁桃炎、腹膜炎、帯状疱疹、B Kウイルス感染、敗血症、ナイセリア感染(淋菌等)
臨床検査	-	ALP上昇、ビリルビン上昇	C-反応性蛋白増加、肝酵素増加、白血球数増加、尿中白血球陽性	ヘモグロビン減少、ハプトグロビン減少
代謝	-	-	食欲減退、糖尿病、高アルブミン血症	低カリウム血症、ヘモクロマトーシス
筋骨格	-	筋肉痛	関節痛、四肢痛	筋痙攣、背部痛、頸部痛、関節腫脹、筋骨格痛、側腹部痛、筋骨格系胸痛
神経系	頭痛	-	浮動性めまい、頭部不快感、感覺鈍麻	味覚異常、振戦、失神、嗜眠、片頭痛、知覚障害
生殖系	-	-	陰囊障害	陰出血
呼吸器	-	上気道炎	咳嗽、鼻閉、鼻漏、口腔咽頭不快感	呼吸困難、鼻出血、咽喉頭疼痛、湿性咳嗽、咽喉乾燥
皮膚	湿疹	発疹	皮膚乾燥、紅斑、多形紅斑、脱毛症、多毛症	そう痒症、尋麻疹、点状出血、発汗、皮膚炎
免疫系	-	-	-	季節性アレルギー
精神系	-	-	-	不眠症、うつ病、不安、憂鬱感
血管・心臓	-	高血圧、動悸	-	進行性高血圧、ほてり、血腫、静脈硬化症
腎及び尿路障害	-	-	-	排尿困難、血尿、腎痛
傷害	-	-	-	挫傷、擦過傷、転倒・転落、関節捻挫、四肢損傷
その他	-	皮膚乳頭腫	-	-

注1) 発現頻度は発作性夜間ヘモグロビン尿症を対象とした国内臨床試験C07-001、非典型溶血性尿毒症症候群を対象とした国内レトロスペクティブ調査研究試験C11-004J及び国内臨床試験C11-005J、ならびに全身型重症筋無力症を対象とした国際共同試験ECU-MG-301及びECU-MG-302における日本人患者の結果から集計し、それ以外の海外臨床試験、海外市販後及び国内市販後での報告は頻度不明とした。

#### 5. 高齢者への投与

高齢者では一般に生理機能(腎機能、肝機能、免疫機能等)が低下しているので、患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。

#### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

##### (1)妊娠

妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

## (2)授乳婦

授乳中の婦人には、授乳を中止させること。[授乳中の投与に関する安全性は確立していない。]

## 7. 小児等への投与

発作性夜間ヘモグロビン尿症患者及び全身型重症筋無力症患者において、低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

非典型溶血性尿毒症症候群患者において、低出生体重児、新生児又は2ヵ月未満の乳児に対する安全性は確立されていない（使用経験がない）。

## 8. 適用上の注意

### (1)調製時

調製後、微粒子及び変色がないか、目視検査を行うこと。（変色、異物、その他異常を認めたものは使用しないこと。）

- 1) 減菌シリソングでバイアルから全量を抜き取り、必要量を点滴バッグ等に注入する。
- 2) 日局生理食塩液、日局ブドウ糖注射液(5%)又は日局リングル液を点滴バッグ等に添加し、本剤を5mg/mLに希釈する。（希釈した液の容量は本剤300mgの場合60mL、600mgの場合120mL、900mgの場合180mL、1200mgの場合240mLである。）
- 3) 希釈した液を含有する点滴バッグ等を静かに倒立させるなど、緩やかに溶解し、混和する。（抗体タンパクが凝集するおそれがあるため、決して激しく振らないこと。）
- 4) 調製後、希釈した液は速やかに使用すること。なお、やむを得ず保存する場合は、希釈した液は2～25℃で保存し、24時間以内に使用すること。
- 5) 希釈した液を投与前に室温になるまで放置すること。（加熱しないこと。）

### (2)投与時

- 1) 本剤は点滴静注用としてのみ用い、急速静脈内投与、皮下投与、筋肉内投与をしないこと。
- 2) 本剤は独立したラインより投与するものとし、他の注射剤、輸液等と混合しないこと。
- 3) 希釈した液を18歳以上では25～45分、18歳未満では1～4時間かけて点滴静注すること。
- 4) 本剤の投与中に副作用が発現した場合は、医師の判断で投与速度を遅くする又は投与を中止し、投与終了後、患者の症状が安定するまで慎重に観察すること。

## 9. その他の注意


- 1) 臨床試験において抗体反応が検出された患者が認められたが、抗体発現と臨床効果又は有害事象との相関は認められなかった。
- 2) マウスの胚・胎児発生試験(60 mg/kgを器官形成期に静脈内投与)において、網膜形成異常が認められた<sup>4)</sup>。

## 【薬物動態】

### 発作性夜間ヘモグロビン尿症患者

#### 1. 国内臨床試験 C07-001 (AEGIS study<sup>5)</sup>)

発作性夜間ヘモグロビン尿症患者に本剤600 mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤900 mgを2週に1回の頻度で計5回静脈内投与した時の血清中濃度は、下図のように推移した。また、投与12週後における血清中トラフ濃度は $116.5 \pm 10.93 \mu\text{g}/\text{mL}$ であった。



図：国内臨床試験におけるエクリズマブの血清中濃度推移

血清中濃度の被験者数は10週のみ28例、他は29例であった。

## 2. 海外臨床試験

#### C04-001 (TRIUMPH study<sup>6)</sup>)

発作性夜間ヘモグロビン尿症患者(43例)に本剤600 mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤900 mgを2週に1回の頻度で計11回静脈内投与した時の血清中トラフ濃度は、投与1週時 $45.1 \pm 3.81 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与4週時 $113.5 \pm 8.70 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与6週時 $104.3 \pm 8.65 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与12週時 $96.5 \pm 9.38 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与26週時 $101.8 \pm 10.84 \mu\text{g}/\text{mL}$ であった(n=40～42)。

#### C04-002 (SHEPHERD study<sup>7)</sup>)

発作性夜間ヘモグロビン尿症患者(97例)に本剤600 mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤900 mgを2週に1回の頻度で計24回静脈内投与した時の血清中トラフ濃度は、投与1週時 $45.8 \pm 3.00 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与4週時 $104.5 \pm 5.08 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与6週時 $100.6 \pm 5.77 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与12週時 $92.6 \pm 5.36 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与26週時 $98.4 \pm 6.63 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与52週時 $110.3 \pm 8.92 \mu\text{g}/\text{mL}$ であった(n=92～96)。

## 非典型溶血性尿毒症症候群

#### 1. 国内臨床試験 C11-005J

本剤投与中の非典型溶血性尿毒症症候群患者3例に本剤1回600mg又は1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与した時の投与12週時の血清中濃度を測定した。

年齢	体重	1回投与量	投与12週時の血清中濃度 (μg/mL)	
			ピーク濃度	トラフ濃度
8歳	27.3kg	600mg	553.6	352.1
6歳	18.9kg	600mg <sup>a)</sup>	524.1	384.8
31歳	53.9kg	1200mg	517.1	377.1

a) 10kg以上20kg未満の患者に対する1回あたりの承認用量は300mgである。

## 2. 海外臨床試験

#### C08-002A/B

非典型溶血性尿毒症症候群患者(17例)に本剤900mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与した時の投与1日目の血清中ピーク濃度は $188.3 \pm 47.1 \mu\text{g}/\text{mL}$ であり、血清中トラフ濃度は投与4週時 $152.6 \pm 61.8 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与26週時 $194.8 \pm 83.1 \mu\text{g}/\text{mL}$ であった(n=13～16)。

#### C08-003A/B

非典型溶血性尿毒症症候群患者(20例)に本剤900mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与した時の投与1日目の血清中ピーク濃度は $222.7 \pm 48.9 \mu\text{g}/\text{mL}$ であり、血清中トラフ濃度は投与4週時 $222.4 \pm 53.3 \mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与26週時 $276.8 \pm 101.0 \mu\text{g}/\text{mL}$ であった(n=18～20)。

## 全身型重症筋無力症

### 国際共同試験 ECU-MG-301

全身型重症筋無力症患者(62例(日本人患者3例を含む))に本剤900mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与した時の投与1日目の血清中ピーク濃度は $336\pm112\mu\text{g}/\text{mL}$ であり、血清中トラフ濃度は投与4週時 $373\pm135\mu\text{g}/\text{mL}$ 、投与26週時 $341\pm172\mu\text{g}/\text{mL}$ であった(n=57~61)。日本人患者(3例)の血清中ピーク濃度及び血清中トラフ濃度は、外国人患者の5~95パーセンタイルの範囲内であった。

### 【臨床成績】

#### 発作性夜間ヘモグロビン尿症

発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象とした臨床試験は、すべて髄膜炎菌ワクチン接種下で実施された。

##### 1. 国内臨床試験 C07-001 (AEGIS study<sup>5)</sup>)

過去2年以内に赤血球輸血が必要と判断され、赤血球中のGPI欠損赤血球クローニー(PNHタイプIII)の存在比が10%以上の発作性夜間ヘモグロビン尿症患者29例を対象とし、本剤を投与した。ベースラインのLDH(中央値[最小値、最大値])は $1,814.0\text{ U/L}$ [ $627.8\text{ U/L}$ ,  $3,642.5\text{ U/L}$ ]、投与12週目のLDHは $244.0\text{ U/L}$ [ $187.0\text{ U/L}$ ,  $2,715.0\text{ U/L}$ ]であり、LDHの低下が認められた(p<0.0001、Wilcoxonの符号付順位検定)。

##### 2. 海外臨床試験 C04-001 (TRIUMPH study<sup>6)</sup>)

過去1年間に少なくとも4回赤血球輸血を受けており、赤血球中のGPI欠損赤血球クローニー(PNHタイプIII)の存在比が10%以上の発作性夜間ヘモグロビン尿症患者87例を対象とし、本剤又はプラセボを投与した。Hb安定化<sup>\*</sup>はプラセボ群で0.0%(0/44例)及び本剤群で48.8%(21/43例)の患者で達成された(p<0.001、Fisherの正確検定)。また、濃厚赤血球輸血単位数(中央値[最小値、最大値])は、プラセボ群で10単位[2単位、21単位]、本剤群で0単位[0単位、16単位]であった(p<0.001、Wilcoxonの順位和検定)。

\*各患者において、観察期間中(定義)における輸血時のHb値を輸血設定値とし、投与期間中にHb値が輸血設定値を上回り、かつ輸血を受けなかった場合にHb安定化が達成されたと定義

#### 非典型溶血性尿毒症症候群

非典型溶血性尿毒症症候群患者を対象とした臨床試験はすべて髄膜炎菌ワクチン接種下で実施された。また、髄膜炎菌ワクチン接種前又は接種後14日以内に本剤が投与される場合には抗菌剤が予防的に投与された。なお、国内臨床試験(C11-005J)の小児患者では肺炎球菌ワクチン及びインフルエンザ菌b型ワクチンの接種下で実施された。

##### 1. 国内臨床試験 C11-005J

本剤投与中の非典型溶血性尿毒症症候群患者3例を対象とした非盲検非対照試験において、本剤1回600mg又は1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与したときの血小板数の推移は下表のとおりであり、投与期間中3例とも施設基準下限値以上で推移した。また、投与期間中に血漿療法及び新規の透析を実施した患者は認められず、ベースラインから透析を実施していた1例では透析を離脱した。

年齢	体重	1回投与量	血小板数( $\times 10^4/\mu\text{L}$ )		
			施設基準値	ベースライン	投与期間中
8歳	27.3kg	600mg	12.0~41.0	23.7	19.1~31.1
6歳	18.9kg	600mg <sup>a)</sup>	13.0~35.0	36.2	24.1~41.2
31歳	53.9kg	1200mg	13.1~36.2	25.9	23.6~27.8

a) 10kg以上20kg未満の患者に対する1回あたりの承認用量は300mgである。

### 2. 海外臨床試験

#### C08-002A/B

18歳以上、又は12歳以上18歳未満かつ体重40kg以上

で血漿療法抵抗性の非典型溶血性尿毒症症候群患者17例を対象とした非盲検非対照試験において、本剤900mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与した。その結果、血小板数(平均値±標準偏差)は、ベースライン時 $10.9\pm3.2\times 10^4/\mu\text{L}$ から投与26週時 $21.0\pm6.8\times 10^4/\mu\text{L}$ に増加し、ベースラインから投与26週時の変化量の最小二乗平均値[95%信頼区間]は $7.3\times 10^4/\mu\text{L}$ [ $4.0\times 10^4/\mu\text{L}$ ,  $10.5\times 10^4/\mu\text{L}$ ]であった。

#### C08-003A/B

18歳以上、又は12歳以上18歳未満かつ体重40kg以上で血漿療法を8週間以上施行されている非典型溶血性尿毒症症候群患者20例を対象とした非盲検非対照試験において、本剤900mgを週1回で計4回、その1週間後から本剤1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与した。その結果、血栓性微小血管障害イベントフリー<sup>\*\*1</sup>を達成した患者割合は80%(16/20例)であった。

#### 3. 海外レトロスペクティブ調査 C09-001r

本剤の投与歴を有する非典型溶血性尿毒症症候群患者30例(生後2ヵ月以上12歳未満15例、12歳以上15例)を対象としたレトロスペクティブ調査が実施された結果、血小板数の正常化<sup>\*\*2</sup>を達成した患者割合は、12歳未満93.3%(14/15例)、12歳以上73.3%(11/15例)であった。また、血栓性微小血管障害イベントフリー<sup>\*\*1</sup>を達成した患者割合は、12歳未満73%(11/15例)、12歳以上60%(9/15例)であった。

\*1 ベースライン値からの25%を超える血小板数の減少、血漿療法施行、新規透析施行のいずれも認められなかった状態が12週間以上持続した場合と定義

\*2 2回以上の連続した測定で血小板数が $15.0\times 10^4/\mu\text{L}$ 以上が4週間以上持続した場合と定義

## 全身型重症筋無力症

全身型重症筋無力症患者を対象とした臨床試験は、すべて髄膜炎菌ワクチン接種下で実施された。

##### 1. 国際共同試験 ECU-MG-301<sup>8)</sup>

全身型重症筋無力症患者125例(日本人患者11例を含む)を対象に、プラセボ又は本剤900mgを週1回で計4回、その1週間後からプラセボ又は本剤1200mgを2週に1回の頻度で静脈内投与するプラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験を実施した。その結果、主要評価項目であるベースラインに対する投与26週のMG-ADL総スコアの変化量は下表のとおりであり、プラセボ群と本剤群の間に統計学的に有意な差が認められた。

	MG-ADL総スコア <sup>a)</sup>			臨床的イベント <sup>b)</sup>	Worst-Rank解析 <sup>c)</sup>
	ベースライン	投与26週	変化量	レスキュー治療	順位 <sup>d)</sup> 群間比較 <sup>e)</sup>
プラセボ群	9.9±2.6(51) 9.0(5,18)	7.0±3.36(51) 6.0(2,16)	-2.8±3.07(51) -2.0(-8,7)	62.2±55.40(12) 43.5(7,178)	70.8±4.38(63) -16.6 [-28.90, -4.23]
本剤群	10.3±3.06(56) 10.0(5,18)	5.6±4.11(56) 5.5(0,15)	-4.7±4.20(56) -4.5(-15,4)	95.7±71.50(6) 99.5(1,174)	54.2±4.42(62) p=0.0089

a) 上段: 平均値±標準偏差(評価例数)、下段: 中央値(最小値、最大値)、レスキュー治療を必要としなかった患者が評価対象

b) イベントまでの期間(日)、上段: 平均値±標準偏差(該当例数)、下段: 中央値(最小値、最大値)

c) ①レスキュー治療を受けた患者集団(レスキュー治療実施日までの日数が短い順)、②レスキュー治療を必要としなかった患者(投与26週のMG-ADL総スコアのベースラインからの変化量(LOCF)に基づく改善が小さい順)の順番で患者に対して最悪順位から順位付けを行い、その順位を応答変数とした投与群及びMGFA分類(クラス2a又は3a/4a/2b又は3b/4b)を因子、MG-ADL総スコアのベースライン値を共変量とした共分散分析モデルに基づく解析

d) 順位の調整平均値±標準誤差(共分散分析モデルに基づく)(評価例数)  
e) 上段: 群間差、中段: 群間差の95%信頼区間、下段: 群間比較のp値

また、重症筋無力症患者の病態及びレスキュー治療を受けずに症状悪化により早期中止した患者の影響を考慮して、事後の順位付け方法を変更したWorst-Rank解析においても、ベースラインに対する投与26週のMG-ADL総スコアの変化量についてプラセボ群と本剤群の間に統計学的に有意な差が認められた。

	MG-ADL総スコア <sup>a)</sup>		臨床的イベント <sup>b)</sup>		Worst-Rank解析 <sup>c)</sup>		
	ベースライン	投与26週	変化量	MGクリーゼ	レスキュー治療及び中止 <sup>d)</sup>	順位 <sup>e)</sup>	群間比較 <sup>f)</sup>
プラセボ群	9.9 ± 2.64 (51) 9.0 (5, 18)	7.0 ± 3.36 (51) 6.0 (2, 16)	-2.8 ± 3.07 (51) -2.0 (-8, 7)	0	62.2 ± 55.40 (12) 43.5 (7, 178)	70.2 ± 44.1 (63)	-15.4 -27.80, -2.92
本剤群	10.2 ± 2.98 (55) 10.0 (5, 18)	5.6 ± 4.02 (55) 5.0 (0, 15)	-4.7 ± 4.23 (55) -4.5 (-15, 4)	127.0 (1) 127 (127, 127)	80.7 ± 76.64 (6) 58.0 (1, 174)	54.8 ± 4.46 (62) p=0.0160	

- a) 上段: 平均値土標準偏差(評価例数)、下段: 中央値(最小値、最大値)、MGクリーゼを発現せず、レスキュー治療を必要とせず26週間の治験薬投与を完了した患者、及び中止例のうちレスキュー治療の実施基準に該当しなかった患者が評価対象  
b) イベントまでの期間(日)、上段: 平均値土標準偏差(該当例数)、下段: 中央値(最小値、最大値)  
c) ①投与26週までに死亡した患者集団(死亡したまでの日数が短い順)、②MGクリーゼを発現した患者集団(MGクリーゼ発現までの日数が短い順)、③レスキュー治療を受けた患者、又は試験を中止した患者のうちレスキュー治療の実施基準に該当する患者集団(レスキュー治療実施日又は中止日(両方)のイベントがある場合には早く発現した方)までの日数が短い順)、④レスキュー治療を受けなかった患者、又は試験を中止した患者のうちレスキュー治療の実施基準に該当しなかった患者集団(投与26週のMG-ADL総スコアのベースラインからの変化量(LOCF)に基づく改善が小さい順)の順番で患者に対して最悪順位から順位付けを行い、その順位を応答変数として投与群及びMGFA分類を因子、MG-ADL総スコアのベースラインを共変量とした共分散分析モデル  
d) 試験を中止した患者のうちレスキュー治療の実施基準に該当する患者集団  
e) 順位の調整平均値土標準誤差(共分散分析モデルに基づく)(評価例数)  
f) 上段: 群間差、下段: 群間差の95%信頼区間、下段: 群間比較のp値

## 2. 長期投与試験 ECU-MG-302<sup>9)</sup>

全身型重症筋無力症患者を対象に実施したプラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験を完了した患者を対象に実施した長期投与試験において、有効性の評価尺度であるMG-ADL総スコアの推移は下表のとおりであった。

	プラセボ-本剤集団		本剤-本剤集団			
	評価例数	総スコア数	変化量	評価例数	総スコア数	変化量
ベースライン (ECU-MG-301 試験)	60	9.9±2.60		56	10.3±3.03	
1週	60	6.0±3.85	-3.9±3.75	55	5.3±3.94	-5.0±4.07
4週	60	5.1±3.74	-4.8±3.73	55	5.5±3.81	-4.9±4.05
12週	60	5.2±3.25	-4.7±3.39	53	5.3±3.50	-4.8±3.38
26週	55	4.7±3.20	-4.9±3.20	49	5.1±3.77	-5.2±3.77
40週	31	3.8±2.76	-5.7±3.55	29	5.2±4.22	-5.1±4.65
52週	20	4.3±3.06	-5.3±3.24	20	5.8±3.75	-4.4±3.53
最終評価時(LOCF)	60	5.2±3.97	-4.7±4.24	56	6.1±4.36	-4.3±4.11

平均値土標準偏差

### 【薬効薬理】

- 本剤は抗ニワトリ赤血球抗体で感作させたニワトリ赤血球のヒト血清による溶血を抑制した<sup>10)</sup>。
- 本剤のヒトC5に対する解離定数(平均値土標準偏差)は46±1.6 pmol/L(25°C)、120±5.5 pmol/L(37°C)であった<sup>11)</sup>。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：エクリズマブ(遺伝子組換え)  
Eculizumab(Genetical Recombination)(JAN)  
本質：エクリズマブは、遺伝子組換えヒト化モノクローナル抗体であり、マウス抗ヒト補体C5 $\alpha$ 鎖抗体の相補性決定部及びヒトフレームワーク部からなる改変部、並びにヒトIgG由来定常部からなる。L鎖の定常部は $\kappa$ 鎖に由来する。また、H鎖定常部のCH1部、ヒンジ部及びCH2部の一部はIgG 2 ( $\gamma$ 2鎖)からなり、CH2部の残りとCH3部はIgG 4 ( $\gamma$ 4鎖)からなる。エクリズマブは、マウス骨髓腫(NSO)細胞により産生される。エクリズマブは、448個のアミノ酸残基からなるH鎖2分子及び214個のアミノ酸残基からなるL鎖2分子で構成される糖タンパク質(分子量:約145, 235)である。

### 【承認条件】

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

### 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制

- 国内の臨床試験成績は限られていることから、製造販売後一定期間は本剤を投与された全症例を対象に使用成績調査を実施し、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。
- 本剤の投与が、発作性夜間ヘモグロビン尿症の診断、治療に精通し、本剤のリスク等についても十分に管理できる医師・医療機関のもとで、髄膜炎菌感染症の診断、治療に精通した医師との連携を取った上でのみ行われるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。

### 非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制

- 国内の臨床試験成績は限られていることから、製造販売後一定期間は本剤を投与された全症例を対象に使用成績調査を実施し、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。
- 本剤の投与が、非典型溶血性尿毒症症候群の診断、治療に精通し、本剤のリスク等についても十分に管理できる医師・医療機関のもとで、髄膜炎菌感染症の診断、治療に精通した医師との連携を取った上でのみ行われるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。

### 全身型重症筋無力症(免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る)

- 国内の臨床試験成績は限られていることから、製造販売後一定期間は本剤を投与された全症例を対象に使用成績調査を実施し、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。
- 本剤の投与が、全身型重症筋無力症の診断、治療に精通し、本剤のリスク等についても十分に管理できる医師・医療機関のもとで、髄膜炎菌感染症の診断、治療に精通した医師との連携を取った上でのみ行われるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。

### 【包装】

ソリリス点滴静注300 mg 1バイアル30 mL

### 【主要文献】

- Jin F, et al. Hum Immunol, 2005; 66(4): 403-410.
- Wang W, et al. Clin Pharmacol Ther, 2008; 84(5): 548-558.
- Fitzpatrick AM, et al. J Peripher Nerv Syst, 2011; 16(2): 84-91.
- 社内資料: Benjamin RF, et al. マウスにおける胚-胎児発生に関する試験(2002年)
- Kanakura Y, et al. Int J Hematol, 2011; 93: 36-46.
- Hillmen P, et al. New England Journal of Medicine, 2006; 355: 1233-1243.
- Brodsky RA, et al. Blood, 2008; 111(4): 1840-1847.
- 社内資料: 第Ⅲ相プラセボ対照二重盲検比較臨床試験(ECU-MG-301 試験)(2016年)
- 社内資料: 第Ⅲ相 ECU-MG-301 継続試験(ECU-MG-302 試験)(2017年)
- 社内資料: Terrie LU, et al. 溶血性試験(2005年)
- 社内資料: Rekha P, et al. ヒト補体C5に対する親和性試験(2005年)

### 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料に關しても下記にご請求下さい。

### アレクシオンファーマ合同会社

メディカル インフォメーション センター  
〒150-0013  
東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号  
恵比寿ファーストスクエア  
TEL: 0120-577657

### 【製造販売元】

アレクシオンファーマ合同会社  
〒150-0013  
東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号  
恵比寿ファーストスクエア