医療関係者各位

「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の販売名類似による取り違え防止のお願い

2023年10月
ヤンセンファーマ株式会社
日本新薬株式会社

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「ザイティガ錠（アビラテロン酢酸エステル）、前立腺癌治療剤」（製造販売元 ヤンセンファーマ株式会社）と「ザルティア錠（タダラフィル）、前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤」（製造販売元 日本新薬株式会社）は、いずれも泌尿器科用薬で、販売名が類似していることから、2014年９月より取り違えに関する注意喚起を行ってまいりましたが、2022年12月末までに38件の処方間違い・薬剤取り違え事例が報告されております。

つきましては、本内容をご一読いただき、**これらの薬剤を処方または調剤いただく際には、販売名、薬効、用法及び用量等をご確認いただきますようお願い申し上げます。**また、処方オーダリングシステムをご利用の場合は、薬剤名検索時に一般名又は３文字以上を入力した場合に該当する薬剤を表示する等の防止策を講じていただきますようお願い申し上げます。

今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

【ザイティガ錠 / ザルティア錠の薬効、用法及び用量の違い】

販売名 （一般名）	**ザイティガ錠 250mg** **ザイティガ錠 500mg** （アビラテロン酢酸エステル）	**ザルティア錠 2.5mg** **ザルティア錠 5mg** （タダラフィル）
薬効	前立腺癌治療剤	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
用法及び用量	ザイティガ錠 250mg 通常1日1回 **4錠** ザイティガ錠 500mg 通常1日1回 **2錠**	ザルティア錠 2.5mg 通常1日1回 **2錠** ザルティア錠 5mg　通常1日1回 **1錠**
	必ず空腹時服用	—
	プレドニゾロン併用必須	—

処方時の薬剤選択ミス事例

事例 1

泌尿器科から発行された処方箋を調剤薬局が受けた。処方内容は、Rp1. ザイティガ錠 250mg 1 錠 分 1×14 日分朝食後服用、Rp2.【般】セフジニルカプセル 100mg 3 カプセル 分 3×7 日分毎食後服用であった。プレドニゾロンの併用は行われておらず、また、投与量も 250mg と通常の 1/4 の投与量となっているため、処方医に疑義照会を行った。処方内容を Rp1. ザルティア錠 5mg 1 錠 分 1×14 日分朝食後服用に変更するとの回答を得た。

出典：日本医療機能評価機構（薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業）薬局ヒヤリ・ハット事例 ID:49474 より改変

ザイティガ錠 / ザルティア錠の用法及び用量は異なります

ザイティガ錠 250mg・ザイティガ錠 500mg は、**空腹時服用**です
ザイティガ錠 250mg・ザイティガ錠 500mg は、**プレドニゾロンと併用投与**します
『**ザイティガ錠 250mg**：通常 **4 錠** / 日』 ⇔ 『**ザルティア錠 2.5mg**：通常 **2 錠** / 日』
『**ザイティガ錠 500mg**：通常 **2 錠** / 日』 ⇔ 『**ザルティア錠　5mg**：通常 **1 錠** / 日』
処方、薬剤調剤・監査・交付時に、用法及び用量が適切であるかご確認ください

事例 2

前医より前立腺癌疑いで当院受診。精査の結果、前立腺肥大症と診断され、前立腺肥大症の治療が継続された。当院における治療開始約半年後、効果不足にてザルティア錠を追加処方するつもりで、ザイティガ錠を処方してしまった。処方 17 日後に処方間違えに気付き、患者に連絡し服用中止。採血等の検査をするも特に異常なし。
当院の処方オーダリングシステムでは、ザイティガ錠には「**(腫)**」の文字が付加されているが、医師は気付くことができなかった。

処方オーダリングシステムでは、ザイティガ錠 / ザルティア錠の処方間違いを防止するために、薬剤名検索方法等の工夫をご検討ください。

【 薬剤名検索時工夫例 】

◇ 一般名検索とする

◇ 3 文字以上を入力し、一致している薬剤のみを表示させる

◇ 抗癌剤などは、先頭に特定の文字を入力し、該当する薬剤を表示させる
例）「**んざいて**」を入力した時のみ、**ザイティガ錠**を表示

「PMDA 医療安全情報（No.44 2014 年 5 月）」に薬剤名検索方法及び表示方法の具体例が掲載されております。処方間違いを防止する一助になりますので、併せてご検討ください。
http://www.pmda.go.jp/files/000144997.pdf

医師の皆様へのお願い

ザイティガ錠とザルティア錠の処方間違い防止のため、これらの薬剤を処方される際には、**販売名、薬効、用法及び用量等**をご確認いただきますようお願いいたします。

薬剤師の皆様へのお願い

ザイティガ錠とザルティア錠の薬剤取り違え防止のため、ご協力をお願いいたします。

報告された事例の中には、適切な処方監査により患者様への誤投与が未然に防止された事例も報告されております。

◇ **ザイティガ**錠が処方されている際には、**プレドニゾロンが併用**されていることをご確認ください。
また、**販売名と用法及び用量が合っているか**につきましてもご確認ください。

◇ **併用薬、病名等**の情報を利用し、**前回の処方歴及び薬歴との照合**をお願いいたします。

◇ 患者様へのインタビューにより、**どのような疾患で受診したか**につきましても、可能な限りご確認をお願いいたします。

施設内におけるヒヤリ・ハット事例等の周知のお願い

◇ 新しく配属になった医師、薬剤師、看護師等の医療従事者につきましても、ザイティガ錠とザルティア錠を間違えやすい医薬品として認知する機会（研修等）を設けることをご検討ください。

◇ ザイティガ錠とザルティア錠の販売名・薬効等を記載した表（本資料裏面）を、診療室、薬局内に掲示する等ご活用ください。

医療事故防止対策の強化に関するお願い

ザイティガ錠と**ザルティア錠**を間違えて処方・調剤・交付された事例が報告されています。これらの薬剤を処方又は調剤いただく際には、**販売名、薬効、用法及び用量等**をご確認ください。

ザイティガ錠 250mg ザイティガ錠 500mg	ザルティア錠 2.5mg ザルティア錠 5mg

<table>
<tr><td>一般名</td><td colspan="2">アビラテロン酢酸エステル</td><td colspan="2">タダラフィル</td></tr>
<tr><td>薬効</td><td colspan="2">前立腺癌治療剤</td><td colspan="2">前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤</td></tr>
<tr><td rowspan="3">用法
及び
用量</td><td>ザイティガ錠
250mg
通常、
1日1回４錠
 </td><td>ザイティガ錠
500mg
通常、
1日1回２錠
 </td><td>ザルティア錠
2.5mg
通常、
1日1回２錠
 </td><td>ザルティア錠
5mg
通常、
1日1回１錠
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">必ず空腹時服用</td><td colspan="2">―</td></tr>
<tr><td colspan="2">プレドニゾロン併用必須</td><td colspan="2">―</td></tr>
<tr><td>お問い
合わせ先</td><td colspan="2">ヤンセンファーマ株式会社
ヤンセンコールセンター
TEL：0120-183-275
FAX：0120-275-831
受付時間：9:00 ～ 17:40
（土・日・祝日及び当社休日を除く）</td><td colspan="2">日本新薬株式会社
くすり相談窓口
フリーダイヤル：0120-321-372
TEL：075-321-9064
FAX：075-321-9061
受付時間：9:00 ～ 17:30
（土・日・祝日を除く）</td></tr>
</table>

本比較表は、処方又は調剤を行う際の参考としてご活用ください。

ZYT-0209
2023年10月作成