

*** 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。***

レキップ[®]CR錠2mg・錠8mgは徐放性製剤です ～分割、粉砕、噛み砕いての 処方・投与・服用はしないでください～

2023年3月

グラクソ・スミスクライン株式会社


弊社製品「レキップ[®]CR錠2mg、8mg」につきまして、分割、粉砕、噛み砕くなど、誤った方法にて処方・投与・服用したとの情報^{*}を複数入手しております。

本剤は徐放性製剤であることから、服用に際して噛んだり、割ったり、砕いたりせずにそのまま服用することを電子添文及び患者向け資材などにて、注意喚起しております。


各医療関係者におかれましては、下記事項をご確認いただき、誤った方法にて処方・投与されないよう、処方入力時に粉砕指示が入力できなくなるように設定する等の処方オーダーリングシステム上の対策も含めて注意いただくとともに、患者様への服薬指導の徹底をお願いいたします。

[※出典：社内資料及び公益財団法人 日本医療機能評価機構（医療事故情報収集等事業及び薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業）]

- 本剤は、徐放性を持つ薬物層をバリア層で挟んだ三層構造による**徐放性製剤**です。
- 本剤を分割・粉砕、もしくは、噛み砕いて服用すると急激に血中濃度が上昇し、副作用が発現する恐れがあります。また、有効成分の消失を速め、効果が持続しない恐れがあります。
- 患者様には、**割ったり、砕いたりせずに、そのまま噛まずに服用する**よう、患者向け資材（レキップ[®]CR錠を服用される患者さまへ）もご活用の上、**服薬指導の徹底**をお願いいたします。
- 投与量を調節したい場合は、**レキップ[®]錠への変更**をご検討ください。



レキップ[®]CR錠の構造

患者向け資材（レキップ CR 錠を服用される患者さまへ）のお取り寄せ方法	
インターネットからの注文	<p>弊社医療関係者向け情報サイト GSKpro からご注文、ダウンロードいただけます。ご注文に際しては、お手数ではございますが、会員登録をお願い致します。</p> <p>右の2次元コードをご利用いただくと、以下の「資料ダウンロード・配送サービス」のページに簡単にアクセスが可能です。</p> <p>https://gskpro.com/ja-jp/resource/?_charset=UTF-8&o=or&t=cf-pharma-hcpportal-ja-jp%3Atag-resources-products-new%2Frequip-cr&%3Acq_csrf_token=undefined</p> 
お電話での注文及びお問合せ	<p>グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター</p> <p>TEL : 0120-561-007 (9 : 00~17 : 45/土日祝日及び当社休業日を除く)</p>

本剤の最新の電子添文等は、専用アプリ「添文ナビ」よりGS1バーコードを読み取りの上、ご参照下さい。

