

別紙 10

【薬効分類】眼科用薬

【医薬品名】スルファメトキサゾール含有製剤（一般用医薬品）

スルファメトキサゾールナトリウム含有製剤（一般用医薬品）

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行	改訂案								
<p>してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる） （新設）</p> <p>相談すること 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること （新設）</p>	<p>してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる） <u>次の人は使用しないこと</u> <u>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</u></p> <p>相談すること 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <u>まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。</u></p> <table border="1" data-bbox="1122 1241 2011 1442"> <thead> <tr> <th data-bbox="1122 1241 1319 1292">症状の名称</th> <th data-bbox="1319 1241 2011 1292">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1122 1295 1319 1347"><u>ショック</u></td> <td data-bbox="1319 1295 2011 1347">使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1122 1350 1319 1401"><u>（アナフィラ</u></td> <td data-bbox="1319 1350 2011 1401">すれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1122 1404 1319 1442"><u>キシー）</u></td> <td data-bbox="1319 1404 2011 1442"><u>意識の混濁等があらわれる。</u></td> </tr> </tbody> </table>	症状の名称	症 状	<u>ショック</u>	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のか	<u>（アナフィラ</u>	すれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、	<u>キシー）</u>	<u>意識の混濁等があらわれる。</u>
症状の名称	症 状								
<u>ショック</u>	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のか								
<u>（アナフィラ</u>	すれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、								
<u>キシー）</u>	<u>意識の混濁等があらわれる。</u>								