

別紙 2

【薬効分類】 2 1 4 血圧降下剤

【医薬品名】 エプレレノン

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行			改訂案		
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 〈高血圧症〉 カリウム製剤を投与中の患者			2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 〈高血圧症〉 カリウム製剤 <u>（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減に使用する場合のヨウ化カリウムを除く。）</u> を投与中の患者		
10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと） 〈高血圧症〉			10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと） 〈高血圧症〉		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸カリウム ヨウ化カリウム 酢酸カリウム	血清カリウム値が上昇するおそれがある。	カリウム貯留作用が増強するおそれがある。	カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸カリウム ヨウ化カリウム <u>（放射性ヨウ素による甲状腺の</u>	血清カリウム値が上昇するおそれがある。	カリウム貯留作用が増強するおそれがある。

<p>10.2 併用注意（併用に注意すること） （新設）</p>	<p><u>内部被曝の予防・低減に 使用する場合を除く。）</u> 酢酸カリウム</p>							
	<p>10.2 併用注意（併用に注意すること） <u>〈高血圧症〉</u></p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1128 528 1491 571"><u>薬剤名等</u></th> <th data-bbox="1503 528 1778 571"><u>臨床症状・措置方法</u></th> <th data-bbox="1783 528 1998 571"><u>機序・危険因子</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1128 574 1491 865"> ヨウ化カリウム（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減に使用する場合） </td> <td data-bbox="1503 574 1778 865"> 血清カリウム値が上昇する可能性がある<u>ので、血清カリウム値を定期的に観察するなど十分に注意すること。</u> </td> <td data-bbox="1783 574 1998 865"> カリウム貯留作用が増強するお<u>それがある。</u> </td> </tr> </tbody> </table>	<u>薬剤名等</u>	<u>臨床症状・措置方法</u>	<u>機序・危険因子</u>	ヨウ化カリウム（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減に使用する場合）	血清カリウム値が上昇する可能性がある <u>ので、血清カリウム値を定期的に観察するなど十分に注意すること。</u>	カリウム貯留作用が増強するお <u>それがある。</u>	
<u>薬剤名等</u>	<u>臨床症状・措置方法</u>	<u>機序・危険因子</u>						
ヨウ化カリウム（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減に使用する場合）	血清カリウム値が上昇する可能性がある <u>ので、血清カリウム値を定期的に観察するなど十分に注意すること。</u>	カリウム貯留作用が増強するお <u>それがある。</u>						