



患者さんに 信頼できる医薬品情報を届けたい

協議会の患者への情報提供について

- サリドマイド薬害問題を教訓としたRAD-AR※活動を目的に、1989年創立

※RAD-AR (Risk / benefit Assessment of Drugs -Analysis & Response)

- 会員製薬企業のほか、日本医師会・日本薬剤師会・アカデミア・患者支援団体からの役員で理事会を構成
- 4つの委員会および患者向け医薬品説明書「くすりのしおり」の提供等の事業を実施
 - くすりのしおりコンコーダンス委員会
 - くすり教育・啓発委員会
 - 先進医療製品適正使用推進委員会
 - 薬剤疫学委員会




VISION

誰もが健康な生活を実現するため、信頼できる情報をもとに判断し、行動できる社会を目指す。

MISSION

信頼できる情報を作ります、広めます、繋がります。
信頼できる情報の見分け方、作り方を広めます。

- 患者さんへの服薬説明指導書として開発
- 医療用医薬品添付文書をもとに、患者・家族にも理解しやすい表現でA4一枚程度にまとめたもの
- 製薬企業約190社が作成。くすりのしおり数に応じて管理手数料を負担。
- 薬価収載の内服剤の約85%を網羅。注射剤も作成。
- 英語版も作成
- サイトの閲覧のほか、医療系システムにも搭載して提供
- サイトの閲覧者の75%が患者・家族
- 8割がスマホからのアクセス。



RAD-AR **くすりおしお**

くすり。しおり
の

この薬を使用している方のための情報です。

製品名

ロキソニン錠60mg

第一三共株式会社

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

内服剤

2022年11月改訂

主成分 ロキソプロフェンナトリウム水和物 (Loxoprofen sodium hydrate)

剤形 ごくうすい紅色の錠剤。直径9.1mm、厚さ約3.3mm

シート記載など ロキソニン60mg、157、Loxonin 60mg、鎮痛・抗炎症・解熱剤、SANKYO157

この薬の作用と効果について

炎症を引き起こすプロスタグランジンの生成を抑え、炎症に伴う腫れや痛みをやわらげ、熱を下げます。通常、関節リウマチ・変形性関節症ほか手術後や外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎、急性上気道炎の解熱・鎮痛に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出現したことがある、心機能不全、アスピリン喘息または既往症
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする場合があります）

用法・用量（この薬の使い方）

- あなたの用法・用量は（医療担当者記入）**
- 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛、手術後・外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛：通常、成人は1回1錠（ロキソプロフェンナトリウムとして60mg）を1日3回服用します。頓用の場合は、1回1～2錠（60～120mg）を服用します。
急性上気道炎の解熱・鎮痛：通常、成人は1回1錠（ロキソプロフェンナトリウムとして60mg）を頓用します。原則として1日2回までとし、1日最大3錠（180mg）を限度とします。
年齢・症状により適宜増減されます。また、空腹時に飲むことはなるべく避けてください。いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時点で1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は、忘れた分を飲まないで、次の飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

生活上の注意

医療担当者記入欄

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、胃・腹部不快感、みぞおちの痛み、腹痛、吐き気・嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、胸やけ、口内炎、腹部膨満感、口渇、浮腫・むくみ、発疹、尋麻疹、眠気、発熱、かゆみ、顔面熱感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 顔面蒼白、呼吸困難、冷や汗 [ショック、アナフィラキシー]
- 発熱、のどの痛み、出血傾向（鼻血、歯ぐきの出血、皮下出血）
[無顆粒球症、白血球減少、溶血性貧血、再生不良性貧血、血小板減少]
- 皮膚・粘膜が赤く腫れて発疹や水ぶくれができる、発熱、全身倦怠感
[中毒性表皮壊死剥離症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症]
- 尿量減少、むくみ、食欲不振 [急性腎障害、ネフロロース症候群、間質性腎炎]
- 呼吸困難、全身のむくみ [うっ血性心不全]
- 発熱、から咳、呼吸困難 [間質性肺炎]
- 血を吐く、便に血が混じる [消化性潰瘍、消化管出血]
- みぞおちの痛み、腹痛 [消化管穿孔]
- 吐き気、腹痛、腹部膨満感 [小腸・大腸の狭窄・閉塞]
- 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [劇症肝炎、肝機能障害、黄疸]
- 発作的な息切れ、喘鳴 [喘息発作]
- 発熱、頭痛、吐き気 [無菌性髄膜炎]
- 筋肉痛、脱力感 [横紋筋融解症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外にも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

方法その他

小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望める場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

医療関係者向け添付文書

（財）日本医療情報センター（JAPIC）のデータベース「iyakuSearch」にリンクしています。専門的な情報が含まれていますので、疑問などを持たれた場合には、自分で判断せず、医師または薬剤師に必ずご相談ください。

Web印刷版

内服剤

2022年 11月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名:ロキソニン錠 60mg

主成分:ロキソプロフェンナトリウム水和物 (Loxoprofen sodium hydrate)

剤形:ごく小さい紅色の錠剤、直径 9.1mm、厚さ約 3.2mm

シート記載名:ロキソニン 80mg、157、Loxonin 80mg、鎮痛・抗炎症・解熱剤、SANKYO157



この薬の作用と効果について

炎症を引き起こすプロスタグランジンの生合成を抑え、炎症に伴う腫れや痛みをやわらげ、熱を下げます。通常、関節リウマチ・変形性関節症ほか手術後や外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎、急性上気道炎の解熱・鎮痛に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。消化性潰瘍、血液疾患、肝機能障害、腎機能障害、心機能不全、アスピリン喘息または既往歴
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）

用法・用量（この薬の使い方） （医療担当者記入）

- ・ **あなたの用法・用量は（）**
 - ・ 関節リウマチ・変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸項筋症候群、歯痛、手術後・外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛：通常、成人は1回1錠（ロキソプロフェンナトリウムとして80mg）を1日3回服用します。頓服の場合は、1回1～2錠（80～120mg）を服用します。
 - ・ 急性上気道炎の解熱・鎮痛：通常、成人は1回1錠（ロキソプロフェンナトリウムとして80mg）を服用します。
- ・ 年齢も、
- ・ 飲み方、
- ・ 飲み
- ・ 飲
- ・ 医師

生活の上

この薬を

主な副作用として、胃・腹部の不快感、めまい、頭痛、眩暈、吐き気、嘔吐、下痢、便秘、胸やけ、口内炎、腹部膨満感、口渇、浮腫、むくみ、発疹、蕁麻疹、眠気、かゆみ、顔面熱感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、（）内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 顔面蒼白、呼吸困難、冷汗や汗（ショック、アナフィラキシー）
- ・ 発熱、のどの痛み、出血傾向（鼻血、歯ぐきの出血、皮下出血）【無顆粒球症、白血球減少、溶血性貧血、再生不良性貧血、血小板減少】
- ・ 皮膚・粘膜が赤く腫れて発疹や水ぶくれができる、発熱、全身倦怠感【中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症】
- ・ 尿量減少、むくみ、食欲不振【急性腎障害、ネフローゼ症候群、間質性腎炎】
- ・ 呼吸困難、全身のむくみ【うっ血性心不全】
- ・ 発熱、かすみ、呼吸困難【間質性肺炎】
- ・ 血を吐く、便に血が混じる【消化性潰瘍、消化管出血】
- ・ みぞおちの痛み、腹痛【消化管穿孔】
- ・ 吐き気、腹痛、腹部膨満感【小腸・大腸の狭窄・閉塞】
- ・ 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や目が黄色くなる【胆肝炎、肝機能障害、黄疸】
- ・ 発作的な息切れ、喘鳴【喘息発作】
- ・ 発熱、頭痛、吐き気【無菌性髄膜炎】
- ・ 筋肉痛、脱力感【横紋筋融解症】

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または

Word版

薬剤師が加工可能

1 / 2

RAD-AR ぐすりおしおり

- 外国人対応
- 渡航者対応
- 多言語への翻訳アプリにも有用

■ 2024年12月10日現在

日本語版 15,246

英語版 10,851

カバー率 約71%



Brand name
LOXONIN TABLETS 60mg
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Revised: 11/2022

Active ingredient: Loxoprofen sodium hydrate

Dosage form: faintly reddish tablet, diameter: 9.1mm, thickness: approx.3.3mm

Imprint or print on wrapping: □キシニン 60mg, 157, Loxonin 60mg, 鎮痛・抗炎症・解熱剤, SANKYO157



Effects of this medicine

This medicine suppresses prostaglandin synthesis that causes inflammation, and acts to ease swelling/pain induced by inflammation as well as to bring down fever.

It is usually used to treat rheumatoid arthritis and osteoarthritis. It is also used to reduce pain and inflammation after surgery, wounds and tooth removal, as well as to bring down fever or ease pain induced by acute inflammation of upper respiratory tract.

 The following patients may need to be careful when using this medicine.
Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
- If you have: peptic ulcer, blood disease, liver/renal/heart dysfunction, aspirin asthma or its history.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

 Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is ((to be written by a healthcare professional))
- For the use in reducing inflammation and pain induced by rheumatoid arthritis, osteoarthritis, lumbar pain, frozen shoulder, neck-shoulder-arm syndrome, tooth pain, as well as after surgery/wounds/tooth removal: In general, for adults, take 1 tablet (60 mg of loxoprofen sodium) at a time, 3 times a day. If taken as on-demand use, take 1 to 2 tablets (60 to 120 mg) at a time.
For the use in reducing fever or pain induced by acute inflammation of upper respiratory tract: In general, for adults take 1 tablet (60 mg of loxoprofen sodium) at a time, as needed. Usually up to twice a day. Do not exceed 3 tablets (180 mg) a day.
The dose may be adjusted according to your age or symptoms. Avoid taking the medicine on an empty stomach. Strictly follow the instructions.
- If you miss a dose, take the missed dose as soon as possible. If it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time.
- If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist.

- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

Precautions while taking this medicine

For healthcare professional use only

Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include gastric/abdominal discomfort, pain in the pit of the stomach, stomachache, nausea/vomiting, loss of appetite, diarrhea, constipation, heartburn, stomatitis, abdominal bloating, thirst, edema/swelling, rash, hives, drowsiness, fever, itch, and hot feeling in face. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets . If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

- pale face, breathing difficulty, cold sweat [shock, anaphylaxis]
- fever, sore throat, bleeding tendency (nasal/gums/subcutaneous bleeding) [agranulocytosis, leukopenia, hemolytic anemia, aplastic anemia, thrombocytopenia]
- redness/swelling/rash/blister of skin/mucous membrane, fever, general malaise [toxic epidermal necrolysis, oculomucocutaneous syndrome, erythema multiforme, acute generalized exanthematous pustulosis]
- decreased urine output, edema, loss of appetite [acute renal disorder, nephrotic syndrome, interstitial nephritis]
- breathing difficulty, general edema [congestive heart failure]
- fever, dry cough, breathing difficulty [interstitial pneumonia]
- vomiting of blood, blood in stool [peptic ulcer, digestive tract bleeding]
- pain in the pit of the stomach, abdominal pain [digestive tract perforation]
- nausea, abdominal pain, abdominal bloating [constriction and obstruction of the intestinal tract]
- general malaise, loss of appetite, yellowing of the skin/white of eyes [fulminant hepatitis, liver dysfunction, jaundice]
- fitful shortness of breath, wheezing [asthma attack]
- fever, headache, nausea [aseptic meningitis]
- muscle pain, weakness [rhabdomyolysis]

The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

Storage conditions and other information

- Keep out of reach of children. Store away from direct sunlight, heat and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them. If you do not know how to discard the remainder, ask your pharmacist or medical institution. Do not give the medicine to anyone else.


 For healthcare professional use only

Day	Month	Year
-----	-------	------

For further information, talk to your doctor or pharmacist

- くすりのしおりは、多くがGoogle（Yahooも）検索で入ってきている。
- 検索アルゴリズムの変更により増減するが、サイトの閲覧数は月600万PV。
（後述の医療系システムでの閲覧数は含まれていない。）
- サイト閲覧者の75%は一般の方であり、そのほとんどが患者・家族。

くすりのしおりアクセス数の推移



医療系システムへのデータ提供数

- くすりのしおりデータをデータベース化し、医療系システムベンダーに有償提供。徐々に拡大中。
- システムベンダーからの利用料はくすりのしおりミルシルサイトの運用費用に充填。


医療者向けシステム



薬剤師のくすりのしおり活用実態
Web調査

n=324

0% 20% 40% 60%



一般向けシステム



合計 73システム

電子お薬手帳でのくすりのしおりデータの活用


RAD-AR

くすりのしおり

- くすりのしおりを利用契約をしている電子お薬手帳アプリが増えている。
- 利用者の多いアプリにすでに搭載済み。

MMD研究所のお薬手帳アプリについての調査結果
20歳～69歳の男女12,517人 赤アンダーラインは契約済みアプリ

● 利用している/利用していたお薬手帳アプリ (n=335)



MMD研究所調べ


2020年調査 https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1905.html

くすりのしおりを利用している主な電子お薬手帳

企業名	アプリ名
株式会社くすりの窓口	EPARKお薬手帳
harmo株式会社	電子お薬手帳「harmo」
株式会社ファルモ	次世代クラウド健康管理サービス「ファルモ」
ウィーメックス株式会社	ヘルスケア手帳 ※1
イントロン株式会社	あなたの調剤薬局
株式会社アインファーマシーズ	いつでもアイン薬局アプリ
株式会社スギ薬局	スギ薬局おくすり手帳アプリ
メドピア株式会社	kakari
公益社団法人日本薬剤師会	eお薬手帳
株式会社 関西メディコ	サン薬局アプリ
株式会社 ケイ・ディ・フドー	LAG薬局アプリ
株式会社 南山堂	南山堂アプリ
株式会社 エムティーアイ	CARADAお薬手帳
株式会社 新生堂薬局	新生堂お薬手帳
株式会社 アイセイ薬局	おくすりPASS ※1
インフォテクノ株式会社	HeaLis+ ※1
総合メディカル株式会社	ヘルスケアアプリ「タヨリス」 ※1
株式会社カケハシ	おくすり連絡帳

※1 「くすりのしおり」サイトへのリンクなどを使用しているシステム

- 「くすりのしおり®」サイトに信頼できる各種患者向け情報を連携するシステムを開発し、プラットフォーム型のサイトとして2022年4月に公開



(注) 国立がん研究センターがん情報サービス
日本医療機能評価機構による診療ガイドライン集Minds
国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター
慶應義塾大学病院医療健康情報サイトKOMPAS 等

■ 製薬企業作成の患者向け資材（いわゆる患者指導箋）をワンタップで連携

患者指導箋PDF資材

使用方法動画

疾患情報Webコンテンツ

この薬を使用している方への情報です。

製品名 強力ポステリザン（軟膏）
マルホ株式会社

くすりのしおり もっと見る 病気を調べる

印刷 Word 英語版 医療関係者向け 添付文書

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

外用剤 2023年

主成分 大腸菌死菌浮遊液 (Killed escherichia suspension)
ヒドロコルチゾン (Hydrocortisone)
剤形 淡黄色の油性軟膏剤
シート記載など

目次

この薬の作用と効果について
傷を感染から守ります。肉芽(傷が治るときに)

くすり検索 くすりのしおりとは くすり知恵袋

強力ポステリザン（軟膏）
2gチューブの使用法

患部が内側にある場合

- 1 キャップをまわすために軟膏を少し押し出します。(すべりがよくなり、挿入しやすくなります。)
- 2 肛門内に挿入しやすくするために軟膏を少し押し出します。(すべりがよくなり、挿入しやすくなります。)
- 3 ノズル部分のみ挿入し、チューブ内の軟膏が十分に押し出されるよう2〜3回圧出してください。(容器全体をいれなくて大丈夫です。)

患部が外側にある場合

穴あき部分に軟膏をそのまま患部に塗布するか、患部にのぼして患部に塗布してください。

●寒い時期や低温で保管した場合、軟膏が硬くなり、出しにくくなることがありますが、手で握ってあたためるとやわらかくなります。
●使用の際、空気が出る場合があります。

※ナレーション音声あり動画(5分版)は [こちら](#)

動画監修
医療法人社団 松愛会
松田病院 院長
松田 聡 先生

痔-LIFE | 皮膚疾患情報 | マルホ...
maruho.co.jp

患者さん・一般の皆さまTOP

痔-LIFE 痔に悩む方にお届けする、痔の総合情報サイト

痔の基礎知識 痔の危険度チェック 診察の流れと準備 アンケート調査結果 痔のQ&A


痔を専門とする医師を探そう
日本臨床肛門病学会

痔の基礎知識 痔の原因やタイプ、治療の方法などを紹介
痔の危険度チェック あなたの痔は大丈夫？簡単にチェック！
診察の流れと準備 診察の流れや受診前に準備することなどを紹介
アンケート調査結果 痔になったことがある女性300人に聞きました
痔のQ&A 痔に関する、よくある質問を掲載しています
用語集 痔を理解するために必要な用語について解説


冊子ダウンロード 痔-LIFEについて サイトマップ

※本サイトに掲載しておりますコンテンツにつきまして、ご監修及びご出演いただきました医療従事者の皆様のご所属・ご職位は公開当時のものとなります。


患者向け情報掲載状況（2024年11月末現在）



■ 76社が1つ以上の資材を掲載済み
（しおり掲載会社の40.6%）



■ 1,748件の資材が3,228件のくすりのしおりに連携済み
（全しおりの21.3%）



薬歴管理サービスでの利用

- 2024年4月、患者向け資材を搭載した最初のシステムが稼働

次世代コミュニケーションサービス
AnyCOMPASS

保険薬局に今求められる、
患者様とのコミュニケーションや
業務効率化を実現。

2023年6月
サービス
開始！

クラウド版 電子薬歴サービス

資料ダウンロード → お問い合わせ →

※「AnyCOMPASS」は、三菱電機ITソリューションズ株式会社の登録商標です

剤形写真をタップすると
次ページのようにくすりの
のしおりが閲覧できる。

画面は電子薬歴サービスのメイン画面になります。今回処方された薬品が左に並んでおり、その薬品が右側「くすりのしおり」枠にサムネイル表示されています。

タップで薬品を選択すると「くすりのしおり」の内容が表示されます。(次ページ)

薬歴管理サービスでの利用

投薬指導

Any COMPASS 三郷調剤薬局 (915016薬局) 薬剤師 試験 情報検索

製品名
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」
第一三共工業株式会社

くすりのしおり もっと見る 検索を知る

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく減らすために、薬を正しく使うことが大切です。

内服剤

主成分 ロスバスタチンカルシウム [Rosuvastatin calcium]

剤形 うすい赤みの黄色からくすんだ赤みの黄色の錠剤

シート記載など (表) ロスバスタチン5mg「DSEP」、第一三共工業株式会社

この薬の作用と効果について

肝臓でのコレステロール合成に関与するHMG-CoA還元酵素を選択的・競合的に阻害し、コレステロールの産生を抑制します。コレステロールが低下し、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症の治療に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー反応が出たことがある方
- 妊娠、妊娠している可能性がある。または授乳中の方
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もあります）

詳しく知りたい方は、医療関係者向けの「添付文書」を、こちらからご覧ください。

用法・用量（この薬の使い方）

- あなたの田舎・田舎

タップで「もっと見る」のしおりの資料が表示（6ページ）

前画面で「ロスバスタチン錠5mg「DSEP」」を選択した後の画面です。
「くすりのしおり」の内容が表示されます。
表示内容はWeb版「くすりのしおり」と同内容であることを確認しております。

投薬指導

2348... MD50LSV/Downloads/2348.pdf

Copilotに質問する

ロスバスタチン錠2.5mg/5mg「DSEP」
ロスバスタチンOD錠2.5mg/5mg「DSEP」
を服用される患者さんとご家族の方へ

重症筋無力症について

お薬を服用していて次のような症状がみられましたら、「重症筋無力症」の可能性もあります。このような症状がみられましたら、お薬の服用を中止して、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

注意していただきたい初期症状

- まぶたが下がって開かない
- 物が二重に見えたり、物の位置がずれて見える
- むせやすい、飲み込みにくい
- 物を持ち続けることができない


重症筋無力症とは

すると「くすりのしおり」が表示されます。

- くすりのしおりミルシルサイトに掲載された患者向け資材を、すでに活用いただいた薬剤師からは具体的な活用事例も報告されている。

- 服薬指導端末のデスクトップにリンクURLを設定しておき、吸入薬等の指導の際に参考資料を印刷できるようにしておく
- メーカーの適切な資材があるので、患者様のニーズに合わせてプリントアウトして服薬指導時に利用した
- 手元にはない資料があったので、〇〇〇病についての生活上の工夫の資料を印刷した
- 服薬指導のために「病気を知る」を薬剤師の知識確認に活用した
- メーカー資材が手元がないときに、印刷で対応するとき便利
- 印刷した資材等を示しながら例えばRMPにある注意すべき副作用等を丁寧に説明した

- くすりのしおりを閲覧した一般の方のうち、20%が患者向け資材の掲載タブをクリック・タップして資材を見ており、そのうちの**84%がその情報が参考になった**としている。



ミルシルサイトでの簡易アンケート
タブに気づいて開いた方97名の回答結果
(掲載されている情報は参考になりましたか?)

くすりのしおりミルシルサイトでの情報提供の工夫

- 調剤報酬の加算点数の設定を受け、患者向けRMP資材のニーズが高まっている。
- くすりのしおりミルシルサイトでは患者向けRMP資材があるかどうかで検索可能。
- RMP資材にはマークをつけている。
- オンライン服薬指導時にもくすりのしおりからすぐに共有可能。

検索窓で、RMP資材のあるもの
を選択できる。

病院・クリニックで処方される医療用医薬品を検索できます。

掲載数15,246

製品名で検索
キーワードを入力してください

製品名 主成分 剤形・色 シート記載・記号 フリーワード で検索

企業名で絞り込む
ファイザー株式会社

英語版の有無で絞り込む
すべて

剤形区分で絞り込む
すべての剤形

薬効分類で絞り込む
すべての薬効分類

患者向け資材・RMP資材の有無で絞り込む
RMP資材があるもの
すべて
患者向け資材があるもの
RMP資材があるもの

条件で検索

くすりのしおり by RMP-AR English

お知らせ
RMP資材の有無で絞り込む機能が付きました。
※RMP：厚生労働省の指導で作成された資材

この薬を使用している方のための情報です。

製品名
イブランスカプセル25mg
ファイザー株式会社

くすりのしおり もっと見る 病気になる

くすり情報
冊子類 RMP

乳がん治療薬「イブランスカプセル及び錠25mg125mg」を服用される患者さんとご家族の皆様へ

この資材は本剤を服用する患者さん向けに作成されている資材です。わからないことがあれば、医師、薬剤師に必ず相談し、説明を受…[すべて表示](#)

- ・ わからない点は医師、薬剤師に相談してください。
- ・ 資材は製薬企業が作成したものです。ただし、[協議会](#) はくすりの適正使用協議会が作成した資材です。
- ・ [RMP](#) は厚生労働省の指導で作成された資材です。
- ・ 更新されますので、ダウンロードした古いデータを参照しないようご注意ください。

外部の信頼できるサイトを紹介

- くすりのしおりの下部にある「くすり知恵袋」から、外部の信頼できる医療情報サイトに飛べる。



(注)上記サイトの他、以下のサイトを紹介
日本医療機能評価機構による診療ガイドライン集Minds
eJIM 情報の見極め方
e-ヘルスネット

- 医療の現場にも「やさしい日本語」の導入が進んでおり、外国人、高齢者への対応を考慮して、くすりのしおりにおいても「やさしい日本語」の導入の検討を進めている。

- 難しい医学用語、言葉を一般的な言い方に置き換える。
- 長い文章は避け、分けて記載する。シンプルな説明にする。
- 結論を先に記載する。

作成ルールの事例（定型文部分は未検討）

改定前	改定後
アレルギー症状の原因となる物質（ヒスタミンなど）の体内での産生や放出を抑え、また、このような物質のはたらきを妨げることにより皮膚や鼻のアレルギー症状を消失もしくは和らげます。 通常、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う痒みの治療に用いられます。	鼻や皮膚のアレルギー症状をおさえます。通常、アレルギー性鼻炎、じん麻疹、皮膚疾患に伴うかゆみの治療に用いられます。
飲酒により精神症状、激しい腹痛、嘔吐、潮紅があらわれることがあるので、使用中は飲酒を避けてください。	この薬を塗った後は、お酒を飲まないでください。お酒を飲むと、精神症状、激しい腹の痛み、吐く、皮膚の赤み（潮紅）があらわれることがあります。

- くすりの適正使用協議会では、患者さんに副作用の第一発見者になってもらうため、特にハイリスク薬については、副作用の初期自覚症状についての情報を適切に届けることが重要と考えています。
- くすりのしおりの以下のような強みを生かして、今後とも、薬剤師の服薬指導を支援するとともに、患者にも常に最新の情報を届けていきます。
 - サイトの閲覧は、月に数百万人
 - 電子お薬手帳、電子カルテ、薬歴管理システムなどにも多数搭載。
 - 製薬企業作成のよりわかりやすい患者指導箋、疾患情報等を連携して提供（患者向けRMP資材や動画なども）
 - 英語版も提供
 - 「やさしい日本語」を導入した、わかりやすい資材の作成を検討中