

別紙 1 2

【薬効分類】 2 1 2 不整脈用剤

【医薬品名】 キニジン硫酸塩水和物

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行	改訂案								
<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）</p> <p>アミオダロン塩酸塩（注射）、バルデナフィル塩酸塩水和物、エリグルスタット酒石酸塩、シポニモド フマル酸、フィンゴリモド塩酸塩、トレミフェンクエン酸塩、ポリコナゾール、ポサコナゾール、モキシフロキサシン塩酸塩、ラスクフロキサシン塩酸塩（注射）、リトナビル、ニルマトレルビル・リトナビル、エンシトレルビル フマル酸、イトラコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ミコナゾール、メフロキン塩酸塩を投与中の患者</p>	<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）</p> <p>アミオダロン塩酸塩（注射）、バルデナフィル塩酸塩水和物、エリグルスタット酒石酸塩、シポニモド フマル酸、フィンゴリモド塩酸塩、トレミフェンクエン酸塩、<u>セリチニブ</u>、ポリコナゾール、ポサコナゾール、モキシフロキサシン塩酸塩、ラスクフロキサシン塩酸塩（注射）、リトナビル、ニルマトレルビル・リトナビル、エンシトレルビル フマル酸、イトラコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ミコナゾール、メフロキン塩酸塩を投与中の患者</p>								
<p>10. 相互作用</p> <p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p>	<p>10. 相互作用</p> <p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p>								
<p>（新設）</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1128 1149 1292 1193">薬剤名等</th> <th data-bbox="1303 1149 1653 1193">臨床症状・措置方法</th> <th data-bbox="1655 1149 2002 1193">機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1128 1195 1292 1326"><u>セリチニブ</u></td> <td data-bbox="1303 1195 1653 1326"><u>QT 延長等があらわれるおそれがある。</u></td> <td data-bbox="1655 1195 2002 1326"><u>左記薬剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4)阻害作用により、本剤の代謝が阻害さ</u></td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	<u>セリチニブ</u>	<u>QT 延長等があらわれるおそれがある。</u>	<u>左記薬剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4)阻害作用により、本剤の代謝が阻害さ</u>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子							
<u>セリチニブ</u>	<u>QT 延長等があらわれるおそれがある。</u>	<u>左記薬剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4)阻害作用により、本剤の代謝が阻害さ</u>							

			<u>れ、血中濃度が上昇する</u> <u>おそれがある。</u>
--	--	--	--------------------------------------