

別紙 4 2

【薬効分類】 6 2 5 抗ウイルス剤

【医薬品名】 リルピビリン

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行	改訂案							
<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）                      リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイン、デキサメタゾン（全身投与）（単回投与を除く）、セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品を投与中の患者</p> <p>10. 相互作用</p> <p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p> <p>（新設）</p>	<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）                      リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイン、<u>アパルタミド、エンザルタミド</u>、<u>デキサメタゾン</u>（全身投与）（単回投与を除く）、セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品を投与中の患者</p> <p>10. 相互作用</p> <p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1106 1007 1346 1050">薬剤名等</th> <th data-bbox="1346 1007 1688 1050">臨床症状・措置方法</th> <th data-bbox="1688 1007 2004 1050">機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1106 1050 1346 1206"> <u>アパルタミド</u>  <u>エンザルタミド</u> </td> <td data-bbox="1346 1050 1688 1206"> <u>本剤の血中濃度が低下し、本剤の効果が減弱するおそれがある。</u> </td> <td data-bbox="1688 1050 2004 1206"> <u>これらの薬剤のCYP3A誘導作用により、本剤の代謝が促進される。</u> </td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	<u>アパルタミド</u> <u>エンザルタミド</u>	<u>本剤の血中濃度が低下し、本剤の効果が減弱するおそれがある。</u>	<u>これらの薬剤のCYP3A誘導作用により、本剤の代謝が促進される。</u>
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子						
<u>アパルタミド</u> <u>エンザルタミド</u>	<u>本剤の血中濃度が低下し、本剤の効果が減弱するおそれがある。</u>	<u>これらの薬剤のCYP3A誘導作用により、本剤の代謝が促進される。</u>						