

別紙 4 3

【薬効分類】 6 2 5 抗ウイルス剤

【医薬品名】 リルピビリン塩酸塩

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行	改訂案								
<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）</p> <p>リファンピシン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、フェニトイン・フェノバルビタール、ホスフェニトイン、デキサメタゾン（全身投与）（単回投与を除く）、セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、プロトンポンプ阻害剤（オメプラゾール、ランソプラゾール、アスピリン・ランソプラゾール、ラベプラゾール、エソメプラゾール、ボノプラザンフマル酸塩、アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩）を投与中の患者</p>	<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）</p> <p>リファンピシン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、フェニトイン・フェノバルビタール、ホスフェニトイン、<u>アパルタミド、エンザルタミド</u>、デキサメタゾン（全身投与）（単回投与を除く）、セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、プロトンポンプ阻害剤（オメプラゾール、ランソプラゾール、アスピリン・ランソプラゾール、ラベプラゾール、エソメプラゾール、ボノプラザンフマル酸塩、アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩）を投与中の患者</p>								
<p>10. 相互作用</p>	<p>10. 相互作用</p>								
<p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p>	<p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p>								
<p>（新設）</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>アパルタミド</u></td> <td><u>本剤の血中濃度が低下</u></td> <td><u>これらの薬剤のCYP3A</u></td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	<u>アパルタミド</u>	<u>本剤の血中濃度が低下</u>	<u>これらの薬剤のCYP3A</u>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子							
<u>アパルタミド</u>	<u>本剤の血中濃度が低下</u>	<u>これらの薬剤のCYP3A</u>							
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><u>アパルタミド</u></td> <td><u>本剤の血中濃度が低下</u></td> <td><u>これらの薬剤のCYP3A</u></td> </tr> </tbody> </table>	<u>アパルタミド</u>	<u>本剤の血中濃度が低下</u>	<u>これらの薬剤のCYP3A</u>					
<u>アパルタミド</u>	<u>本剤の血中濃度が低下</u>	<u>これらの薬剤のCYP3A</u>							

	エンザルタミド	し、本剤の効果が減弱するおそれがある。	誘導作用により、本剤の代謝が促進される。
--	---------	---------------------	----------------------