

# タブネオス®カプセル10mgを服用される 患者様とご家族の皆様へ

## 重篤な肝機能障害の発現に注意してください

肝機能障害は本剤の服用開始から3か月以内に多く発現しています。

**重症化を防ぐには早期発見が重要です。**

下記の症状が少しでも現れた場合は、**我慢せず、すぐに医療機関を受診してください。**

受診時には、本剤を服用中であること・他の服用薬・症状の種類と程度を**医師・薬剤師にお伝えください。**

## 肝機能障害に伴う症状の例

全身症状	<ul style="list-style-type: none"><li>・倦怠感、発熱</li><li>・白目や皮膚の色が黄色くなる</li><li>・尿の色が茶色っぽくなる</li><li>・便の色が白っぽくなる</li></ul>
消化器症状	<ul style="list-style-type: none"><li>・食欲不振</li><li>・腹痛</li><li>・吐き気、おう吐</li></ul>
皮膚症状	<ul style="list-style-type: none"><li>・発疹</li><li>・かゆみ</li></ul>

キッセイ薬品工業株式会社

問い合わせ先：くすり相談センター フリーダイヤル0120-007-622

受付時間※：9時～17時40分（土日祝日・当社休日を除く）

※上記時間外は留守番電話での受付となります